

- Arundinaria**
fastuosa, 875 (立派ナ)
graminea, 879 (禾本状ノ, 穀粒ノ)
Hindsii, 880 (ひんづ氏ノ)
var. *graminea*, 879 (禾本状ノ, 穀粒ノ)
hirta, 832 (短剛毛アル)
var. *aristata*, (832) (芒アル, 髭アル)
japonica, 876 (日本ノ)
kuriensis (千島群島産ノ)
var. *paniculata*, 877 (圓錐花穂ノ)
Laydekeri, 879 (らいでける氏ノ)
Matsumurae, 875 (松村任三氏ノ)
Metake, 876 (めだけ)
Narihira, 875 (なりひら竹)
nipponica, 877 (本州産ノ)
purpurascens, 876 (淡紅紫色ノ)
ramosa, 878 (出枝ノ, 枝多キ)
Simoni, 878 (しもん氏ノ)
var. *Chino*, 878 (しのだけ)
vaginata, 879 (葉鞘アル)
variabilis (斑色アル, 斑紋アル)
f. *glabra*, 879 (無毛ノ)
Arundinella (属名 *Arundo* の縮小形)
anomala, 832 (次序ナキ, 異常ノ)
Arundo (あし〔蘆〕)
bifaria, 858 (二綴列ノ)
Donax, 858 (振動)
var. *versicolor*, (858) (斑色ノ, 變色ノ)
Epigeios, 852 (地上ノ)
Langsdorffii, 851 (らんぐすどるふ氏ノ)
littorea, 852 (海岸ノ)
Phragmites, 858 (生離ノ)
pseudo-Phragmites, 852 (偽ノ *Phragmites*)
Asarum (枝ノ無イ毛氈)
albivenium, 635 (白キ支脈アル)
asaroides, 635 (かんあふひ属ニ似タ)
Blumei, 635 (ぶるーむ氏ノ)
caulescens, 636 (有莖ノ)
nipponicum, 635 (日本内地産ノ)
Sieboldi, 636 (še-hôrdo氏ノ)
Asclepiadaceae, 201
Asclepias (ぎりしやノ醫師名)
curassavica, 203 (西印度きゅらそー島)
Ascomycetes, 1031
Asiasarum (亞細亞ノ *Asarum*)
Sieboldi, 636 (še-hôrdo氏ノ)
Asparagus (ぎりしや名 強ク裂ク)
cochininchinensis, 735 (交趾支那産ノ)
lucidus, 735 (強キ光澤アル)
officinalis (薬用ノ)
var. *altilis*, 736 (肥厚ノ)
pygmaeus, 735 (矮小ナル)
schoberioides, 736 (あかざ科ノ *Schoberia* ニ似タ)
var. *subsetacea*, (736) (稍剛毛状ノ)
Asperococcaceae, 1059
Asperula (asper [粗糙]ノ縮小形)
odorata, 113 (臭氣アル, 芳香アル)

- Aspidistra** (小サイ植)
elatior, 730 (ヨリ高キ)
Aspidium (小植)
aculeatum (針アル)
var. *japonicum*, 943 (日本ノ)
amabile, 944 (愛スベキ)
angustifrons, 948 (狹キ葉ノ)
aristatum, 944 (芒アル, 髭アル)
callopsis, 956 (硬皮状ノ, 美眼ノ)
caryotideum, 947 (くじやくやし属ニ似タ)
craspedosorum, 945 ... (園マレタ囊堆ノ)
cystolepidotum, 953 (囊状鱗片アル)
decorative-pinnatum, 947 (沿下シテ羽状ノ)
dilatatum, 951 (擴張ノ)
erythrosorum, 951 (赤色ノ囊堆アル)
var. *cystolepidotum*, 953 ... (囊状ノ鱗片アル)
falcatum, 947 (鎌形ノ)
var. *caryotideum*, 947 (くじやくやし属ニ似タ)
var. *Fortunei*, 946 (ふおーちゅん氏ノ)
Filix-mas, 954 (雄した)
glanduligerum, 948 (腺アル)
hirtipes, 957 (短剛毛柄ノ)
lacerum, 953 (不齊分裂ノ)
laserpitifolium, 946 (繖形科ノ *Laserpitium* ノ如キ葉ノ)
laxum, 949 (疎在ノ)
lepidocaulon, 945 (鱗片アル莖ノ)
Miquelianum, 955 (みける氏ノ)
muticum, 956 (凸起ナキ, 刺針ナキ)
oehotes, 956 (硬イ縁アル)
Okuboanum, 936 (大久保三郎氏ノ)
oligophlebiun, 949 (少數ノ脈絡アル)
polyblepharon, 944 (多クノ縁毛アル)
polylepis, 954 (多クノ鱗片アル)
prolificum, 951 (枝ノ先ニ子供ヲ持ツタ)
Sabaei, 954 (佐波氏ノ)
sanctum, 939 (神聖ナル)
sophorooides, 950 (くらら属 *Sophora* ニ似タ)
spinulosum (小刺多キ, 稍刺アル)
var. *dilatatum*, 951 (擴張ノ)
subtripinnatum, 952 (稍三羽状ノ)
thelypteris, 950 (雌した)
tokyoense, 957 (東京産ノ)
transitorium, 957 (間種ノ)
triperon, 945 (三翼ノ, 三翅ノ)
tsus-simense, 944 (對島ニ産スル)
tuberous, 943 (塊莖状ノ)
varium, 950 ... (種々ノ形[或ハ色]アル)
Asplenium (脾臟ノ無イ)
achilleifolium, 930 (のこぎりさう属ノ葉ノ)
acrosticoides, 938 (みみもちしだ属ニ類スル)
antiquum, 932 (古キ)
Blakistoni, 931 (ぶらきすとん氏ノ)

- Asplenium**
Conili, 934 (こにる氏ノ)
dareoidea, 931 (しのぶ属ニ似タ)
davallioides, 931 (しのぶ属ニ似タ)
Fauriei, 932 (ふおーりー氏ノ)
incisum, 928 (刻裂ノ)
japonicum, 933 (日本ノ)
lusus Conili, 934 (こにる氏ノ)
lanceum, 935 (槍身形ノ, 披針形ノ)
melanolepis, 938 (黒イ鱗片ノ)
mesosorum, 937 (中央ニ囊堆ノアル)
niponicum, 936 (日本内地産ノ)
normale, 929 (尋常ノ, 模範ノ)
oligophlebiun, 932 ... (少數ノ脈絡アル)
pekinense, 931 (支那北京産ノ)
prolongatum, 930 (延長セル)
rutaefolium, 930 (へんるうだ属ノ如キ葉ノ)
Sarelii, 931 (される氏ノ)
Saulii, 931 (そーる氏ノ)
scolopendrium, 933 (こたにわたり様ノ)
shikokianum, 930 (四國ノ)
squamigerum, 934 (鱗片ヲ有スル)
Textori, 935 (てつくすとる氏ノ)
thelypteroides, 938 (*Thelypteris* 属ニ似タ)
Trichomanes, 932 (細クテ薄イ)
unilaterale, 929 (片側ノ)
Vidalii, 937 (びだる氏ノ)
Wichurae, 935 (ういちゅる氏ノ)
Wilfordii, 931 (ういるふおーど氏ノ)
Wrightii, 930 (らいと氏ノ)
var. *shikokianum*, 930 (四國ノ)
yokoscense, 937 (横須賀産ノ)
Yoshinagae, 929 (吉永虎馬氏ノ)
Asprella (asper [粗面]ノ縮小形)
japonica, 873 (日本ノ)
sibirica (レベリヤノ)
var. *longearistata*, 872 (長イ芒アル)
Aster (アスター属ノ)
ageratoides (くわくからあざみニ類スル)
var. *amplexicaulis*, 70 (抱莖ノ)
subsp. *amplexicaulis*, 70 ... (抱莖ノ)
altaicus, 74 (支那あるたい山ノ)
Asa-Grayi, 74 (えいさぐれー氏ノ)
dimorphophyllum, 73 (二形葉ノ)
var. *divisus*, (73) (全裂ノ)
fastigiatus, 71 (東ニナツテ直立シタ)
Glehni, 73 (ぐれーん氏ノ)
hispidus, 74 (剛毛アル)
indicus, 69 (印度ノ)
japonicus, 73 (日本ノ)
Maackii, 72 (まーつく氏ノ)
pinnatifidus, 69 (羽状尖裂ノ)
rugulosus, 71 (稍皺縮ノ)
Savatieri, 72 (さばちえー氏ノ)
var. *pygmaea*, 72 (矮小ナル)
scaber, 70 (糙澁ノ)
spathulifolius, 75 (鎧形葉ノ)
subulatus, 75 (鍼形ノ)
- tataricus*, 71 (中央あじあノ)
trinervius (三脈ノ)
var. *adustus*, 70 (焦緑アル)
var. *congestus*, 69 (集積ノ)
var. *semiamplexicaulis*, 70 (半抱莖ノ)
Tripolium, 75 (アフレ利加とりほり地方ノ)
Astilbe (アスチルベノ)
chinensis (支那産ノ)
var. *japonica*, 496 (日本ノ)
japonica, 496 (日本ノ)
microphylla, 496 (小葉ノ)
Thunbergii, 496 (つんべるぐ氏ノ)
Astragalus (アストラガルスノ)
adsurgens, 421 (傾上ノ, 斜上ノ)
membranaceus (膜質ノ, 膜様ノ)
var. *obtusus*, 422 (鈍形ノ)
reflexistipulatus, 421 (背曲托葉ノ)
secundus, 422 (偏側生ノ, 第二ノ, 適宜ノ, 愛情アル)
sinicus, 422 (支那ノ)
Astreus (アストレスノ)
hygrometricus, 1013 (濕氣ノ爲ニ運動スル, 吸濕性ノ)
Atherurus (アザラスノ尾)
tripartitus, 776, 777 (三深裂ノ)
Athyrium (アシタツムニカエノ)
acrostichoides, 938 (みみもちしだ属ニ似タ)
decurrenti-alatum, 936 (沿下シタ翼アル)
Filix-foemina (雌した)
var. *melanolepis*, 938 (黒イ鱗片ノ)
var. *nigropaleaceum*, 938 (黒色ノ鱗片アル)
melanolepis, 938 (黒イ鱗片ノ)
mesosorum, 937 (中央ニ囊堆ノアル)
niponicum, 936 (日本内地産ノ)
Okuboanum, 936 (大久保三郎氏ノ)
thelypteroides, 938 (*Thelypteris* 属ニ似タ)
Vidalii, 937 (びだる氏ノ)
yokoscense, 937 (横須賀産ノ)
Atractylis (アトラクティリスノ)
ovata, 24 (卵形ノ)
Atragene (アトラジネノ)
japonica, 562 (日本ノ)
ochotensis, 552 (おほつく地方産ノ)
Atriplex (アトリペックスノ)
Gmelini, 612 (ぐめりん氏ノ)
tatarica, 611 (韃靼ノ, 中央あじあノ)
Aucuba (アコバノ)
japonica, 263 (日本ノ)
Aulacomitrium (溝アル帽子)
humilinum, 984 (低イ?)
Auricularia (アウリカルニアノ)
auricularia-judae, 1030 (ゆだや人ノ耳)
Auriculariaceae, 1030
Auriculariinae, 1030
Autobasidiomycetes, 1013
Avena (鳥)