

- Brachyelytrum
 - erectum (直立ノ)
 - var. japonicum, 844 (日本ノ)
 - japonicum, 844 (日本ノ)
- Brachypodium (短イ小足)
- japonicum, 870 (日本ノ)
- miserum, 870 (衰レナル, 貧弱ノ)
- sylvaticum, 870 (森林生ノ)
- Brachythecium (短イ函)
- populeum, 981 (はこやなぎ屬 *Populus* ノ如キ)
- Brasenia (*Brasenia* 氏)
- peltata, 579 (楕状ノ)
- Schreberi, 579 (しゆれーべる氏ノ)
- Brassica (らてん名「料理スル」, けると語「きやべつ」)
- campestris (原野生ノ)
- subsp. Napus (かぶら)
- var. nippo-oleifera, 520 (日本ノ *oleifera*)
- subsp. Rapa, 520 (かぶ)
- cernua, 520 (點頭ノ)
- juncea, 521 (あ屬「*Juncus*」ノ如キ)
- var. Chirimenna, (521) (縮緬菜)
- oleracea (食用蔬菜ノ)
- var. capitata, 521 (頭状ノ)
- Rapa, 520 (かぶ)
- Briza (ウナヅク, 居ネムル)
- maxima, 857 (最も大ナル)
- minor, 857 (ヨリ小ナル, ヨリ少ナキ)
- Bromeliaceae, 770
- Bromelineae, 770
- Bromus (からすむぎ, 秣)
- bifidus, 856 (二尖裂ノ)
- japonicus, 868 (日本ノ)
- pauciflorus, 868 (少数花ノ)
- unioloides, 868 (禾本科ノ *Uniola* ニ似タ)
- Broussonetia (ぶるつそね氏)
- Kazinoki, 650 (かぢのき)
- papyrifera, 651 (紙ヲ生ズル)
- Sieboldii, 650 (しーぼると氏ノ)
- Brylkinia (*Brylkin* 氏)
- caudata, 863 (尾アル, 尾状ノ)
- Bryophyta, 977
- Bryopsidaceae, 1065
- Bryopsis (こけニ似タモノ)
- corticulans, (1065) (樹皮ノ様ニ厚クナツタ)
- hypnoides, (1065) (しとねごけニ類スル)
- plumosa, 1065 (羽毛状ノ)
- Bryoxiphium (こけノ刀)
- Savatieri, 991 (さばちえ氏ノ)
- Bryum (こけ)
- argenteum, 987 (銀白色ノ)
- Buckleya (*S. B. Buckley* 氏)
- Joan, 638 (宇田川榕庵氏)
- lanceolata, 638 (披針形ノ)
- Quadriala, 638 (四ツノ翼)
- Buddleja (*R. A. Buddle* 氏)
- insignis, 216 (著名ナル)

- japonica, 216 (日本ノ)
- Buergeria (びゆるげる氏)
- stellata, 540 (星芒状ノ)
- Bulbophyllum (鱗莖アル葉)
- Drymoglossum, 682 (森ノ舌)
- inconspicuum, 683 (不明ノ, 甚ダ小サキ)
- Bulbostylis (鱗莖状ノ花柱)
- barbata, 803 (鬚アル, 細刺尖アル)
- capillaris (細毛状ノ)
- var. capitata, 803 (頭状ノ)
- var. trifida, 803 (三尖裂ノ)
- Bupleurum (牡牛ノ肋骨)
- falcatum, 278 (鎌形ノ)
- multinerve (多脈ノ)
- var. minor, 279 (ヨリ小ナル)
- nipponicum, 279 (本州産ノ)
- sachalinense, 279 (樺太産ノ)
- Burmanna (*J. Burmann* 氏)
- cryptopetala, 706 (隠レタ花瓣ノ)
- Itoana, 707 (伊藤篤太郎氏ノ?)
- japonica, 706 (日本ノ)
- Burmanniaceae, 706
- Burmanniaceae, 706
- Butomineae, 882
- Buttonwood, (475)
- Buxaceae, 373
- Buxbaumia (ぶつくすぼーむ氏)
- Minakatae, 980 (南方氏ノ)
- Buxineae, 373
- Buxus (らてん名, 密ニ詰ツテキル, 箱)
- japonica, 373 (日本ノ)
- microphylla, 373 (小葉ノ)
- var. japonica, 373 (日本ノ)
- var. suffruticosa, 373 (亜灌木ノ)
- f. minutissima, (373) (最も微小ナ)
- f. riparia, (373) (河岸生ノ)
- f. tenuis, (373) (薄質ノ, 細長キ)
- sempervirens (常緑ノ)
- b. suffruticosa, 373 (亜灌木ノ)

C

- Cabbage, (521)
- Cacalia (ぎりしあ名「悪ノ甚シ」ノ意)
- adenostyloides, 31 ... (*Adenostylis* 屬ニ似タ)
- auriculata (耳形ノ)
- var. kamtschatica, 32 (かむちやつか地方ノ)
- bulbifera, 35 (鱗莖ヲ有スル)
- delphiniifolia, 33 (ひえんさう屬ノ如キ葉ノ)
- farfaraefolia, 31 (ふきたんほほ[款多]ノ如キ葉ノ)
- var. bulbifera, 35 (鱗莖ヲ有スル)
- hastata (戟形ノ)
- var. glabra, 35 (無毛ノ)
- linumae, 34 (飯沼悠齋氏ノ)
- Krameri, 32 (くらめる氏ノ)

- Cacalia
 - Makineana, 34 (牧野富太郎氏ノ)
 - niko-montana, 32 (日光ノ山地ノ)
 - palmata, 33 (掌状ノ)
 - peltifolia, 33 (楕形葉ノ)
 - shikokiana, 34 (四國ノ)
 - syneilesis, 33 (*Syneiles* 屬ニ類スル?)
 - tebakoensis, 34 (手筈山[四國]ノ)
- Cactaceae, 306
- Caesalpinia (*Caesalpinus* 氏)
- japonica, 431 (日本ノ)
- Sappan, (433) (まれ一名, *sapang*)
- sepiaria, (431) (藩籬ヲナセル)
- var. japonica, 431 (日本ノ)
- Caladium (美シイ?)
- esculentum, 777 (食用トナルベキ)
- Calamagrostis (あしノ屬名 *Agrostis*)
- arundinacea (蘆竹状ノ)
- var. genuina, 850 (真正ノ, 模範ノ)
- var. sciuroides, 850 (栗鼠ノ尾ノ如キ)
- Epigeios, 852 (地上ノ)
- hakonensis, 851 (箱根産ノ)
- Langsdorffii, 851 (らんぐすどるふ氏ノ)
- littorea, 852 (海岸ノ)
- Onoei, 852 (尾上氏ノ)
- pseudo-Phragmites, 852 (偽ノ *phragmites*)
- purpurascens, 851 (淡紅紫色ノ)
- sachalinensis (樺太産ノ)
- var. hakonensis, 851 (箱根産ノ)
- sciuroides, 850 (栗鼠ノ尾ノ如キ)
- urelytra, 851 (語原不明)
- villosa (長軟毛アル)
- var. Langsdorffii, 851 (らんぐすどるふ氏ノ)
- Calamintha (ヨイはくか)
- multicaulis, 170 (多数莖ノ)
- Calanthe (美シイ花)
- aristulifera, 686 (小芒アル)
- discolor, 685 (異色ノ, 不同色ノ)
- var. bicolor, 685 (二色ノ)
- kirishimensis, 686 (霧島産ノ)
- reflexa, 685 (背曲セル)
- Caldesia (語原不明)
- reniformis, 885 (腎臟形ノ)
- Calendula (月ノ第一日)
- arvensis, 24 (畑ニ生エル)
- officinalis, 25 (薬用ノ)
- Caliciaceae, 1003
- Calicium (小杯)
- trabinellum, 1003 (語原不明)
- Calla (美シイ)
- aethiopica, 777 (えちおびヤノ)
- Callianthemum (美シイ花)
- hondoense, (573) (本州産ノ)
- Miyabeianum, 573 (宮部金吾氏ノ)
- Callicarpa (美シイ果實)
- dichotoma, 187 (兩歧ノ)
- gracilis, 187 (細長ノ, 纖長ナル)
- japonica, 187 (日本ノ)
- mollis, 188 (軟キ, 軟毛アル)

- purpurea, 187 (紅紫色ノ)
- Callistephus (美シキ冠)
- chinensis, 66 (支那ノ)
- Callitrichaceae, 374
- Callitriche (美シイ毛)
- fallax, 374 (偽ノ, マギレル)
- japonica, 374 (日本ノ)
- Callitrichineae, 374
- Callophyllis (美シイ葉)
- crispata, 1041 (皺曲セル)
- japonica, (1041) (日本ノ)
- palmata, (1041) (掌状ノ)
- Callymeniaceae, 1041
- Calobryum (美シイこけ)
- mnioides, 997 (ちやうちんごけ *Mnium* ニ似タ)
- Calostomataceae, 1013
- Caltha (らてん名, 臺附キ杯)
- membranacea (膜質ノ, 膜様ノ)
- f. decumbens, 574 (傾臥ノ)
- f. erecta, 575 (直立ノ)
- sibirica (しべりヤノ)
- f. erecta, 575 (直立ノ)
- var. decumbens, 574 (傾臥ノ)
- Calvatia (裸?)
- craniformis, 1014 (頭蓋ノ形ヲシタ)
- nipponica, 1014 (本州産ノ)
- Calycanthaceae, 538
- Calycanthus (萼ノ花)
- praecox, 538 (早期ノ)
- Calycopteris (萼ノ翼)
- Joan, 638 (宇田川榕庵氏)
- Calypso (ぎりしヤノ女神)
- bullosa (小胞状ノ, 泡状ノ, 小胞アル)
- var. japonica, 687 (日本ノ)
- Calyplostigma (頭巾アル柱頭)
- Maximowiczii, 97 (まきしもみつち氏ノ)
- Middendorffiana, 98 (みつでんとるふ氏ノ)
- Calystegia (萼ガ蓋ハレテキル)
- hederacea, 200 (きづた屬ノ様ナ)
- japonica, 200 (日本ノ)
- Soldanella, 200 (屬名[小サイ貨幣])
- Camellia (*G. J. Camellus* 氏)
- japonica, 328 (日本ノ)
- reticulata, 329 (網状ノ)
- Sasanqua, 329 (さざんくわ)
- Campanula (小鐘)
- dasyantha, 85 (粗長毛アル花ノ)
- glomerata, 85 (集團ノ)
- lasiocarpa, 85 (長軟毛果ノ)
- medium, 86 (中間ノ)
- pilosa (毛アル)
- var. dasyantha, 85 (粗長毛アル花ノ)
- punctata, 84 (細點アル)
- Campanulaceae, 80
- Campanulatae, 1
- Campanumaea (鐘)
- japonica, 81 (日本ノ)
- javanica (じやば島ノ)