

はりがねおちばたけ

*Marasmius siccus Schw.*

秋季ニ多ク、山野・庭園等潤葉樹ノ落葉多キ所ニ生ズ。蓋ハ徑1-3cm許、棒色或ハ淡赭褐色ニシテ、蓋ノ肉極メテ薄ク、欄ノ數少ク、蝙蝠傘ノ如キ觀アル小菌ナリ。莖ハ細ク、黑色強韌ニシテ針金ノ如シ。乾燥シタル後モ能ク其形態ヲ保ツ。



まつたけ科

第 3070 圖

あるたけ

一名 なつあるたけ

*Russula virescens (Schaeff.) Fr.*

夏季又ハ初秋、山野ニ生ズル食用茸ニシテ、莖・欄共ニ純白、蓋ノ表皮ノミ綠色ナリ。蓋ノ表皮ニ龜裂ヲ生ジテ、相分離シタルママ、蓋上ニ固着シテ存スルコト多シ。蓋ノ色ニ因ミテ藍茸ノ名アリ。中國地方ニテはつたけヲあるたけト稱シ、夫ニ對シ本菌ヲなつあるたけト稱セリ。



まつたけ科

第 3071 圖

はつたけ

一名 あゐたけ

*Lactarius Hatsudake Tanaka*

初秋ノ候、多ク小松原ノ芝地ニ生ズ。蓋ハ徑5-10cm許、漏斗狀ヲ成シ、潤ヘル時ハ多少粘性ヲ帶ブ、表面ニ數個ノ淡キ同心環紋ヲ現ハセリ。全體淡赤褐色ヲ呈シ、質脆クシテ、傷ツキタル所ハ綠青色ニ變ズ。故ニ中國地方ニテハ本菌ヲ一般ニ藍茸ト呼ベリ。一般ニ食用ニ供シ、頗ル美味ナリ。



まつたけ科

からはつたけ

*Lactarius torminosus (Schaeff.) Fr.*

秋季、山林ニ生ジ、全體脆質。蓋ハ中央部凹メリ。莖ハ中空。大體ニ於テはつたけニ似テ稍淡紅色ヲ帶ビ、蓋ニ同心環紋アリ。傷ツキタル所ヨリ淡黄色ノ乳汁ヲ分泌ス。辛味強烈。毒菌トシテ取扱ハル。本菌ヲ之ニ酷似セル食菌アカはつたけト區別センニハ、本菌ガ蓋ノ周邊綿毛狀ナルト、味辛烈ナル乳汁ヲ有スルコト、並ニ傷ツキタル部分ガ綠色トナラザルコトニ注意スベシ。



まつたけ科

第 3072 圖

つちかぶり

一名 ぢわり

*Lactarius piperatus (Scop.) Fr.*

秋季、山地・平野等ニ生ジ、色白ク、形漏斗狀ニシテ、莖ハ比較的短シ。土ヲ被リテ發生セルコト多ケレバ、つちかぶりノ名アリ。質脆ク、何レノ部分ヲ傷ツクルモ、辛味アル白色ノ乳汁ヲ分泌ス。辛味強烈ナルヲ以テ、古來世界各國共ニ毒菌視シ居レドモ、我邦ニテハ本菌ヲ永ク水ニ浸シ置キタル後、煮テ食用トスルモノアリ。同屬別種ナルしろもみたけハ山中樞林ニ生ズル本菌類似ノ食用菌ナリ。




まつたけ科

第 3073 圖

ささくれひとよだけ

*Coprinus comatus (Fl. Dan.) Fr.*

夏秋ノ候、畑地・庭園等概シテ草木ノ多カラザル所ニ最モ普通ニ生ズ。蓋ハ表面ニ鱗皮ヲ有シ、開キタル後欄ト共ニ周縁ヨリ溶ケテ、黒汁ヲ滴下ス。孢子ハ黑色。莖ハ白ク管狀ニシテ長ク、脱離シ易キ鏢アリ。莖ノ下端ニ囊狀ノ脚苞アリ。食用トナシ得。短時間ニシテ生長シ、一兩日ニシテ溶ケ去ルヲ以テ同屬、他種ト共ニ一夜茸ノ總稱アリ。



まつたけ科