


第 3087 圖

ははきたけ科



第 3088 圖

いぼたけ科



第 3089 圖

きくらげ科



## ことちははきたけ

*Clavaria pyxidata* (Pers.) Fr.

秋季、山地・森林中ノ地上ニ生ズ。圖ニ示  
スガ如ク、細ク岐レタル樹枝状ニシテ、  
ははきたけノ如キ太キ主莖ヲ有セズ。白  
色ニシテ柔軟ナリ。二又ニ分岐セル部分  
及ビ小枝ノ末端部ハ琴柱ニ髻髻タリ。故  
ニ琴柱筍茸ノ名アリ。食用トナシ得。

## くろうすたけ

一名 くろらっぱたけ

*Craterellus cornucopioides* Pers.

秋季、林野ニ生ズ。灰黒色ノ菌ニシテ高  
サ 5-10cm 許、喇叭状ヲ成シ、蓋・莖ノ  
境無シ。肉薄ク革ノ如キ觀アリ。縦裂シ  
易シ。外側ハ淡紫色ヲ帯ビ、淺キ縦皺ヲ  
認ムルノミニシテ平滑ナリ。

## きくらげ

*Auricularia auricula-judae*  
(L.) Schroet.

秋季、にはとこ・くは其他諸種ノ枯木ニ多  
數發生ス。直徑通常 5-9cm 許、形状色澤  
人ノ耳ニ似タリ。内面ハ暗褐色ヲ呈シ平  
滑ナレドモ、外面ハ淡褐色ニシテ柔軟ナ  
ル灰色ノ短毛ヲ密生ス。質水母ニ似タレ  
バ、我邦ニテハ古來之ヲきくらげト稱ス  
レドモ、支那及ビ歐米諸國ニテハ耳ニ因  
ミタル名ヲ以テ呼稱トセリ。生ナルヲ直  
チニ煮テ用ヒ、又ハ干シテ貯ヘ食用ニ供  
ス。

## まめざやたけ

*Xylaria polymorpha* (Pers.) Grev.

山野ニ腐朽シツツアル樹木・木材等ノ上  
ニ生ズ。細キ柄ヨリ膨レテ長ク伸ビ上リ  
タル、黒色ノ硬質菌ニシテ、形態多様ナ  
リ。厚キ皮ヲ有シ、内部ハ白ク、中空ナ  
ルカ又ハ軟ク填充ス。断面ニ就テ觀ルニ  
厚キ皮中ニ埋没シテ並列セル被子器アリ  
テ、外ニ向ツテ開口セリ。故ニ菌體表面  
ニハ無數ノ細孔ヲ見ル。

## せみたけ

*Cordyceps sobolifera* (Hill.) Sacc.

夏季、蟬ノ蛹ニ寄生ス。冬蟲夏草ノ一  
シテ、蟲體ヨリ棍棒状又ハ鹿角状ノ莖ヲ  
抽キ、其先端稍々脹レテ子實層ヲ造ル。  
本邦ニハ多キモ、外國ニテハ其發生極メ  
テ稀ナリ。支那ノ所謂冬蟲夏草ノ普通種  
ハ、是レト同屬異種ナル學名 *C. chinensis*,  
ナルモノニシテ、鱗翅類ノ幼蟲ニ生  
ズ。冬蟲夏草ハ又夏蟲冬草トモ云フ。

## みみかきたけ

一名 かめむしたけ

*Cordyceps nutans* Pat.

山林中落葉多キ地上ニ生ズ。所謂冬蟲夏  
草ノ一ニシテ、くさがめノ屍ニ寄生シ、  
主ニ腹面ノ胸部ヨリ針金ノ如ク細クシ  
テ、下部黒キ莖ヲ生ジ、其先端ニ曲リテ  
附着セル子實部ヲ有ス。子實部ハ長橢圓  
形ニシテ淡黄褐色ナリ。

第 3090 圖

まめざやたけ科



第 3091 圖

にくざきん科



第 3092 圖

にくざきん科

