


第 3117 圖

かぎいばらのり

*Hypnea japonica Tanaka.*

此種ハほんだはら類ノ體上ニ附着シテ之ニカラマリ、又枝同志互ニ附着シテ錯綜セル團塊ヲ形成スルモノナリ。體ハ線狀、徑1.5-3mm許、不規則ニ又狀・羽狀・互生等ニ分岐シ、枝ノ先端ハ屢々鈎狀ニ屈曲シ、ソレヲ以テ他物ニ纏ハル。生時水中ニ於テ青白キ閃光ヲ發ス。膜質又ハ軟骨質ニシテ屢々黃褐色ヲ呈ス。本州中部以南ニ産ス。

かぎいばらのり科



第 3118 圖

とさかのり (雞冠菜)

*Meristotheca papulosa*

*J. Agardh.*

體ハ20-30cm高く、又ハソレ以上ニ及ビ、小盤狀ノ基部ヨリ立ち、扁平、少シク厚キ膜狀ニシテ不規則ナル又狀又ハ稍掌狀等ニ分岐シ、幅1-5cmアリ、時ニ更ニ厚ク肉質ト成レルモノモアリ。多クハ全邊、兩面ハ平滑ナレドモ後屢々兩縁ヨリ小枝ヲ、又表面ヨリ短キ突起等ヲ出スコトアリ。又屢々表面ニハ褐色ノ斑紋ヲ示ス。色ハ鮮紅色、美麗ナリ。囊果ハ半球狀ニシテ體ノ兩縁ニ、又小枝・突起等ノ縁ニ生ズ。暖海ノ産ニシテ房總邊ヨリ以南ノ干潮線下ニ生ズ。食用ニ供セラル。

とさかのり科



第 3119 圖

きりんさい

一名 りうきうつのまた

*Euclima muricatum f. depauperata Weber van Bosse.*

體ハ高サ10-20cm許、略圓柱狀ニシテ2-3mmノ太サヲ有シ、又狀・互生・對生等ニ頗ル不規則ニ分岐シテ錯綜シ、又ハ岩礁等ニ附着ス。體ノ表面ヨリハ小疣狀ノ突起ヲ出シ、此等ノ突起ハ半球狀又ハ圓錐形等ヲ成シ、密ニ存スルコトト疎ナルコトトアリ。囊果ハ小球狀ヲ成シテ疣狀突起ト共ニ生ズ。多ク暗紫色ニシテ質ハ軟骨様、乾燥後ハ頗ル硬クナル。南海ニ産シ、干満線間及ビソレヨリ深所ニ生ズ。食用ニ供シ、又ハ寒天製造ノ材料トス。

とさかのり科




ひろはのとさかもどき

*Callophyllis crispata Okamura.*

體ハ小盤狀根ノ上ニ立チ、高サ10-20cm、基部ハ短キ圓柱狀ノ莖ヲ成セドモ直ニ上同方楔形ニ廣ガリテ扁平葉狀トナル。數回又狀又ハ稍掌狀等ニ分岐シ、各裂片ノ幅ハ1-3cm許アリ、全邊ナレドモ囊果ヲ生ズルモノニテハ邊縁ニ小サキ皺ヲ示シ、囊果モ亦此ノ邊縁附近ニ生ズ。膜質ニシテ血紅色ヲ呈シ、乾燥後ハ紙ニ附着ス。本州中部ニ普通ニシテ干潮線下ニ生ズ。本種ニ似テ質稍薄ク、囊果ハ體ノ表面ニ散在スルモノアリ、やつでがたとさかもどき(*C. palmata Yam.*)ト稱ス。又體ノ裂片幅狭ク、邊縁ニ所々雞冠ノ如キ齒狀缺刻アル種類アリ、之ヲほそばのとさかもどき(*C. japonica Okam.*)ト云フ。

第 3120 圖



つかさのり科

ふくろふのり


一名 ふのり・ぶつ・ふくろのり

*Gloiopeltis furcata*

*Postels et Ruprecht.*

基部ハ地上ニ廣ガリテ所謂"座"ヲ成ス。體ハ高サ3-15cm、管狀、中空、直徑2-5mm許。線返シ又狀・三又狀又ハ不規則ニ分岐シ、分岐點竝ニ體ノ所々ハ縊ル。枝ノ先端ハ尖リ、又ハ鈍圓等種々ニシテ、枝ノ分岐法、形狀等モ甚ダ變化シ易シ。節色又ハ小豆色ヲ成シ、時ニ黄色トナルモノアリ。質ハこむ膜ノ如ク彈性アリ。囊果ハ小球狀ニシテ體上ニ密生ス。各地ニ産シ、干満線間ノ上部ニ、特ニ北地ニ於テハ満潮線邊ニ簇生ス。糊料トシ、又ハ食用トス。本種ニ似テ暖海ニ産スルほんふのり(*G. tenax J. Ag.*)ハ同ジク糊料トシテ賞用セラルルモ本種ヨリハ質厚ク、大部分實質、且ツ體ハ屢々扁壓セラルルヲ以テ區別スルヲ得。

第 3121 圖



ふのり科

第 3122 圖

こめのり

*Carpopeltis flabellata*

(*Holmes*) *Okamura.*

體ハ叢生シ5cm内外ノ高サヲ有シ、扁壓、下部ハ細キ楔形ノ莖トナリ、上部ハ線返シ又狀ニ分岐シ扇狀ニ廣ガル、幅3-7mmアリ。先端ハ概ネ鈍圓、囊果竝ニ四分胞子囊群ハ枝ノ先端下ニ生ズ。紫紅色ヲ呈シ、軟カキ軟骨質ヲ成ス。房總邊ヨリ以南ニ産シ、干満線間ノ上部ニ生ズ。本種ハ同屬ノまつのり(*C. affinis Okam.*)ト酷似シ、時ニ區別ノ困難ナル事アリ。然レドモまつのりハ本種ニ比シ概シテ體ノ幅狭ク、基部ハ常ニ線狀ニシテ圓柱狀ノ莖部ヲ有スル事ニヨリ區別スルコトヲ得ベシ。

むかでのり科

