

ひとつまつ

*Carpopeltis divaricata Okamura.*

體ハ高サ 10cm 内外、扁平ニシテ幅 3-5mm アリ。數回正シク又狀ニ分岐シ、腋ハ廣開ス。先端鈍頭ヲ成シ、全邊ナリ。質厚ク、硬キ軟骨質ニシテ紫紅色ナルモ屢々黄色ヲ帶ブ。四分孢子囊竝ニ囊果ハ長橢圓形ノ斑ニ集マリ、枝ノ頂端下ニ生ズ。本州中部邊ニ産シ、干滿線間ニ生ズ。本種ノ近似種トシテとさかまつ (*C. crispata Okam.*) ナルモノアリ。多數叢生シ、且ツ莖ハ短ク、體ハ振レルヲ以テ本種ヨリ區別サルレドモ、恐ラク本種ノ一形ニ過ギザルベシ。



むかでのり科

第 3124 圖

きんとき

*Carpopeltis angusta Okamura.*

體ハ小盤狀根ヨリ叢生シ、高サ 20cm 内外、扁壓セル線狀ニシテ幅 2-3mm アリ。又狀又ハ稍羽狀等不規則ニ分岐シ、各所ニ於テ不規則ニ縊レ、輕ク關節セルガ如クナル。又基部ノ附近ニ於テハ中肋ノ如キ厚ミアリ。四分孢子囊竝ニ囊果ハ枝ノ兩縁ニ生ズル圓形ノ小枝上ニ生ズ。質硬ク軟骨質ヲ呈シ、血赤色ヲ成ス、然レドモ時ニ淡クナレリ。房總邊ヨリ以南ニ普シ。干潮線附近ニ生ズ。



むかでのり科

第 3125 圖

たんばのり

一名 おほばつのまた・ほぐろ

*Grateloupia elliptica Holmes.*

體ハ高サ 15-40cm 許、厚キ革狀ニシテ葉ノ如ク廣ガリ、又狀ニ掌狀其他不規則ニ分ル。基部ハ莖ヲ以テ立ツニ非ズシテ體ノ下部ノ裏面ヲ以テ地物ニ附着ス、ヨリテ體ノ下部ハ斜上スルコトトナル。縁ハ全邊ニシテ葉面平滑ナリ。四分孢子囊竝ニ囊果ハ體ノ全面ニ散布ス。色ハ濃キ紫紅色ナルレドモ時ニ黄色又ハ綠色ガカル。本州中部邊ニ普通ニシテ干滿線間又ハ幾分深處ニ生ズ。糊料トシテ利用セラル。



むかでのり科


きゃうのひも

一名 ひものり・はさつべい・みのぢのり

*Grateloupia Okamurai Yamada.*

體ハ高サ 20-30cm、時ニ 50cm ニ達シ、披針形又ハ笹ノ葉形、幅 1.5-6cm 許アリ。基部ハ短カキ圓柱狀ノ莖ヲ成シ、莖ヨリ上ハ扁平トナリ、屢々疎ニ又狀ニ分レ、所々縊ルコトアリ、特ニ分岐點ニ於テ著シ。成長セルモノハ體ノ表面及兩縁ヨリ小サキ副枝ヲ多數發出ス。暗紫紅色又ハ多小鈍色ヲ呈シ、乾燥セル體ノ表面ハ光澤強シ。北海道南部ヨリ九州ニ至ル海ニ産シ、干滿線間ニ生ズ。

第 3126 圖



むかでのり科

むかでのり

*Grateloupia filicina C. Agardh.*

體ハ外形甚ダシク變化スレドモ模範的ナルモノハ扁平線狀ニシテ高サ 20-30cm、幅 2-3mm 許ニシテ中軸ノ兩縁ヨリ羽狀ノ小枝ヲ密ニ發ス。小枝ハ廣開シ、多クハ單條ナルレドモ再ビ分岐スルコトアリ。又小枝ハ基部附近並ニ中軸ノ先端附近ニハ之ヲ缺ク。紫紅色ニシテ柔軟稍粘滑ナリ。各地ニ普ク、干滿線間ニ生ズ。枝ノ基部縊レ、老成後體ノ基部中空ト成ルモノアリ、之ヲうづろむかで (*f. porracea Okam.*) ト稱ス。又本種ニ酷似スルモノニシテ體ノ幅少シク本種ヨリモ廣ク且ツ枝ノ基部縊レ、*G. prolongata J. Ag.* ト稱スルモノアリ、然レドモ此ノ兩者ハ屢々殆ド區別困難ナリ。

第 3127 圖




むかでのり科

第 3128 圖

おほむかでのり

*Halymenia acuminata (Holmes) J. Agardh.*

體ハ小盤狀根ノ上ニ立チ、高サ 30-50cm、基部附近ハ扁圓ニシテ莖ヲ成シ、上部ハ廣キ披針形ノ葉狀ニ廣ガリ、幅 3-6cm 許ヲ普通トシ、ソノ兩縁ヨリ羽狀ニ小枝ヲ發ス。此等ノ小枝ハ多キコト、少キコトアリテ一定セズ。質ハ稍厚キ膜質ニシテ柔軟、乾燥後紙ニ附着ス。美シキ赤色ヲ呈ス。房總邊ヨリ以南ニ産シ、干潮線附近以下ニ生ズ。



むかでのり科