

第 3147 圖

ひばまた科



おほばもく

一名 がらも・ささばもく

Sargassum Ringoldianum Harvey. 本種ハ形状一體ニ大柄ナルヲ以テ著シ。即チ根ハ圓錐形ニシテ直径5-8cmアリ。莖ハ長サ10-15cm許、下部圓柱狀ナレドモ、上部ニ至レバ扁平ニシテ中央部厚クナル。葉ハ甚ダ大ニシテ厚ク篋状ヲ成シ、長サ15-20cm、幅3-5mmアリ、全邊ニシテ先端圓シ。氣胞ハ長橢圓形ニシテ大キク、長サ2cmヲ超ユルモノアリ、少シク扁平トナリ、頂端ニハ小葉ヲ存シ、邊緣ニ翼狀片ヲ附クルコトアリ。生殖器托モ大形ニシテ扁平、卵形乃至長橢圓形ノ輪廓ヲ有シ、總狀又ハ複總狀ニ列シ、各生殖器托ニハ苞ヲ存セズ。干潮線下ニ生ジ、各地ニ産ス。生時ハ暗褐色ニシテ乾燥後ハ著シク黒變ス。

第 3148 圖

ひばまた科



よれもく

Sargassum tortile C. Agardh.

根ハ圓錐狀ニシテ通常短キ圓柱狀ノ莖ヲ發シ、此莖ハ間モナク分歧シテ扁壓且ツ稜ヲ有スル主枝トナル。體ノ長サ1-2mニ達ス。下部ノ葉ハ比較的厚ク、卵形・長橢圓形等ヲ成シ、強ク下方ニ反ル。上部ノ葉ハ總體ニ細長ク、鈍キ鋸齒ヲ有ス。時ニハ著シク細クシテ殆ド線狀ヲ成ス。氣胞ハ球形乃至紡錘形ニシテ、體ノ下部ニテハ大ニ、上部ニテハ小トナリ、頂端ニ小葉又ハ小突起ヲ具フ。大ナルハ直径15mmニ達ス。生殖器托ハ扁壓篋形ニシテ總狀ニ排列サレ、各々ハ苞ヲ具フ。干潮線下ノ岩上ニ生ジ、中部日本以南ニ普通ナリ。生時暗褐色、乾燥後黒變ス。

第 3149 圖

ひばまた科



のこぎりもく

Sargassum serratifolium

C. Agardh.

本種ハ前掲よれもくと極テ好ク似タリ。然レドモ葉ニハ通常圖ニ示セルガ如キ二重ノ鋸齒ヲ有スルコト屢々アリ、且ツ體ノ上部ノ葉モ一般ニよれもく程細クナルコト多カラズ。分布状態モ略よれもくと同ジ。此等ノ種ニ似タルモノニおほばのこぎりもく(S. giganteifolium Yamada)アリ。本州中部太平洋岸ニ産ス。然レドモ此種ハ體色生時黄褐色ニシテ葉更ニ大ニ、生殖器托ハ秋期ニ生ジ、のこぎりもく及よれもくの體色生時暗褐色ニシテ生殖器托ノ春期ヨリ夏期ニ生ズルモノト區別スルコトヲ得。


あかもく

Sargassum Horneri C. Agardh.

體ハ大キク4mニ達シ、黄褐色ヲ呈ス。根ハ假盤狀、即チ莖ノ基部ニ輪生スル指狀根ノ互ニ融著シテ小盤ヲ形成セルガ如キ様ヲ成シ、縦ノ線條ヲ有ス。莖ハ圓柱狀ニシテ各方面ニ枝ヲ發ス。葉ハ鋸齒深ク切込ミ、裂片羽狀ヲ成ス。幼者ノ葉ニ於テハ裂片ノ幅廣キモ、古キモノ及ビ體ノ上部ニ於テハ裂片細クシテ線狀トナル。氣胞ハ圓柱狀又ハ紡錘形ヲ成シ、頂ニ小葉ヲ冠ス。生殖器托ハ圓柱狀、先端細ク尖リ、著シク長クナリ、4cmニ達スルコトアリ。北海道南部ヨリ臺灣ニ至ルマデ之ヲ産シ、干潮線下ニ生ズ。

第 3150 圖

ひばまた科



ほんだはら

一名 ほだはら・じんばさう

Sargassum fulvellum J. Agardh.

體ハ質軟カク、長サ1-4m位アリ。根ハあかもくニ見ル如キ假盤狀根ヲ成ス。莖ハ單條稜角アリ、往々輕ク振レ、各方面ニ枝ヲ發ス。葉ハ基部ノモノハ大キク、篋形又ハ披針形、全邊又ハ鋸齒ヲ具ヘ、上部ノモノハ小サク、共ニ中肋ヲ缺ク。氣胞ハ橢圓形又ハ倒卵形、頂端丸キカ又ハ微突頭ヲ有スルカ又ハ小葉ヲ冠ス。生殖器托ハ長キ圓錐形ヲ成シ、小枝ノ上ニ總狀ヲ成シテ生ズ。東北ヨリ九州ニ至ルマデ之ヲ産シ、干潮線附近竝ニソレヨリ深所ニ生ズ。

第 3151 圖

ひばまた科



いそもく

Sargassum hemiphyllum

C. Agardh.

體ハ比較的纖細ニシテ高サ約40-50cmアリ。根ハ纖維狀ニシテ岩上ヲ匍匐ス。葉ハ多ク左右不均齊ニシテ長刀狀ヲ成シ、外側ノ縁ニハ屢々小鋸齒アリ。上部ノ葉ハ多ク線狀ヲ成ス。氣胞ハ倒卵形乃至橢圓形ニシテ頂端丸キカ又ハ少シク尖レリ。生殖器托ハ枝ノ上部ニ總狀ヲ成シ、小柄ヲ有シテ苞ノ腋ニ生ジ、屢々氣胞ト混生ス。本州中部以南邊ニ産シ、多ク干満線間ニ生ズ。

第 3152 圖

ひばまた科

