

第382圖

むしとりすみれ

Pinguicula vulgaris L.

高山ニ生ズル多年生草本。葉ハ數片根生シテ相擴ガリ、長橢圓形ニシテ鈍頭ヲ有シ、全邊ナリ。葉質軟ニシテ脆ク、淡綠色ニシテ、葉面ニ無數ノ小腺毛ヲ生ジ、粘液ヲ分泌シ微蟲來レバ之レヲ粘殺ス。夏日葉中ヨリ一箇若クハ二三ノ花莖ヲ抽キ、頂ニ鮮紫色ノ一花ヲ開キ傍ニ向フ。萼ハ五深裂。花冠ハ五裂シテ唇形ヲ成シ、上唇短ク、花後ニ漸殺セル長キ距アリ。二雄蕊、一雌蕊アリ、花柱短ク柱頭廣大ナリ。蒴果ハ球形ニシテ二裂ス。食蟲植物ノ一ニシテ、日本ニテ第一ノ發見地ハ信州淺間山ナリ。



たぬきも科

第383圖

かうしんさう

Pinguicula ramosa Miyoshi.

我邦中部地高山ノ岩壁ニ生ズ。むしとりすみれヨリハ小形ナル多年生草本ニシテ、葉ハ橢圓形ニシテ葉柄アリ、表面ニ無數ノ細腺毛アリテ粘液ヲ分泌シ來蟲ヲ粘殺ス。夏日葉中ヨリ普通分歧セル花莖ヲ出ダシ、淡紫色ノ唇形花ヲ着ケ傍ニ向テ開ク。花冠ハ下唇ノ中片長ク、距ハ大ナリ。二雄蕊、一雌蕊アリ。花後、花梗上方ニ向テ延ビ、果實ヲ上方ノ岩壁ニ觸接開裂セシメ種子ヲ散ラス。和名ハ庚申草ノ意ニシテ初メ之レヲ野州庚申山ニ發見シ三好學博士之レヲ研究シ學名ト和名トヲ此レニ命ジタリ。



たぬきも科

第384圖

いはぎりさう

Oreocharis primuloides Benth. et Hook. fil.

多年生草本ニシテ、崖面ニ生ジ、全草軟毛ヲ密布ス。葉ハ長柄ヲ有シテ根生シ、質厚ク淡綠色ヲ呈シ、葉面廣卵形ニシテ底部ハ心臟形或ハ圓形ヲ成シ、邊緣ニ重鈍鋸齒ヲ具フ。花梗ハ12-15cm許ニシテ葉ヨリ高く、夏時頂ニ紫色ノ數花ヲ繖形ニ出ダシテ稍下垂ス。花冠ハ唇形様ノ五裂セル漏斗狀ニシテ濃紫色斑ヲ有ス。四雄蕊ヲ有シ二箇ハ不熟。蒴果ハ狹長。其葉桐葉ノ氣分アリ且本草岩ニ生ズルヨリ此和名アリ。



いはたばこ科

いはたばこ

Conandron ramondioides Sieb. et Zucc.

山中樹陰ノ岩壁ニ多ク生ズル多年生草本ニシテ株上ニ褐毛密生ス。葉ハ一根ヨリ通常二片ヲ出シ、通常葉柄アリ、橢圓狀卵形ヲ成シ、邊緣ニ不齊ノ齒アリ、厚軟ニシテ皺面ヲ成シ光澤アリ。冬中ハ新葉緊密ニ皺縮シテ小塊狀ヲ呈シ株上ニ坐シ、春時漸ク舒長ス。夏日、葉間ニ一ニ二ノ花莖ヲ抽クコト6-12cm許、上部ニ繖形ヲ成シテ有梗ノ數花ヲ開キ紫色ニシテ愛スベシ。花冠ハ五裂シ筒部短ク湯氣ノ臭アリ。五雄蕊アリ。果實ハ細長キ蒴ニシテ宿存萼ヲ伴フ。胃腸ノ藥トシテ煎服セル。漢名 苦苣苣(誤用)



いはたばこ科

第385圖

ししんらん (石吊蘭)

Lysionotus pauciflora Maxim.

本邦西南暖地ニ産シ大樹ノ幹ニ着生スル多年生ノ木質草本ナリ。莖ハ匍匐シ、褐色ニシテ疎ニ長サ20-30cm許ノ枝ヲ分チ、葉ハ略輪生シ、葉柄アル披針形ニシテ、邊緣ニ粗齒アリ、質厚クシテ毛ナシ。夏時花ヲ莖頂葉腋ニ出ダシ、花梗ヲ有シ、萼深ク五裂シ、花冠大ニシテ筒ヲ成シ、淡紅色ヲ呈シ、邊緣五裂ス。中ニ二強雄蕊アリ。花後長キ蒴ヲ結ブ。



いはたばこ科

第386圖

おほいはぎりさう

一名 ぐろきしにや
Sinningia speciosa Benth. et Hook. fil.
(=*Gloxinia speciosa Lodd.*)

ぶらじル原産ノ多年生草本。殆ト本莖ナク、葉ハ根生シ、有柄卵形ニシテ、邊ニ鈍鋸齒アリ。葉中ニ高サ10-15cm許ノ花莖ヲ抽キ、頂ニ各一花ヲ有シ、側ニ向テ開ク。温室内ニテハ初夏ノ候ニ開クヲ見ル。花冠ハ膨大シ、紫色其他種々ノ色アリ、略鐘狀ヲ成シテ、邊緣相開キ、淺ク五裂ス。五雄蕊、一雌蕊アリ。觀賞花トシテ温室ニ栽培セル。



いはたばこ科