


第448圖

おほばみぞほづき

Mimulus sessilifolius Maxim.

深山ニ生ジ、樹陰ノ湿地ニ見ル多年生草本ニシテ高サ20-30cm許、莖ハ直立シ、枝ヲ分タズ。葉ハ無柄ニシテ對生シ、長卵形乃至廣卵形ニシテ尖リ、邊緣ニ尖鋸齒アリテ葉ノ主脈著シ。夏日、梢上葉腋ニ單花梗ヲ抽キ、梗頂ニ黃花ヲ着ク。萼ハ筒ヲ成シテ五稜アリ、筒口五裂ス。花冠ハ萼ヨリ超出シテ五裂シ、略唇形ヲ成シ、下ハ筒ヲ成ス。二強雄蕊、一雌蕊アリ。蒴果ハ宿存セル萼内ニ在リ。



ごまのはぐさ科

第449圖

きり

Paulownia tomentosa Kanitz.

各地ニ廣ク栽植セララル落葉喬木。高サ10m許ニ達ス。葉ハ闊大ニシテ廣卵形ヲ成シ、長柄ヲ具ヘテ對生シ、葉底心臟形ヲ呈シ、全邊或ハ三-五尖起ヲ成シ、粘毛多シ。初夏大形ノ圓錐花穂ヲ成シテ、紫花ヲ開ク。萼ハ五裂シ、厚クシテ黃褐色ノ密毛ヲ被フリ、宿存ス。花冠ハ大形ノ唇形ヲ成シテ下唇闊ク、内面ニ黃染アリ。二強雄蕊、一雌蕊ヲ具フ。蒴果ハ大ニシテ二室ヲ成シ、堅キ二殼片ニ開裂シ、果内ニ翼アル多種子ヲ藏ス。材ハ廣ク重用セラレ箆筒・家具・樂器類・下駄等ヲ造ル。原產地ハ或ハ朝鮮竹島ナラント云フ。此樹伐レバ生長早シ、故ニ此和名アリ。漢名白桐(誤用)



ごまのはぐさ科

第450圖

いはぶくろ

一名 たるまいさう

Pentstemon frutescens Lamb.

高山ニ自生スル多年生草本ニシテ地下莖ヲ引キテ繁殖ス。高サ10cm内外ニシテ莖ハ稍太ク短シ。葉ハ無柄、莖ニ對生シテ密接シ、長橢圓形ニシテ尖リ、邊緣ニ鋸齒ヲ有シ、質厚シ。夏時、梢頭ニ相集リテ紫色ノ唇形花ヲ開ク。萼五裂シテ宿存シ、花冠ハ下部筒ヲ成ス。二強雄蕊、一雌蕊アリ。和名ハ岩囊ノ意ニテ此種岩間ニ生ジ、花冠囊狀ヲ成ス故此稱アリ。又樽前草ハ北海道、膽振樽前ノ地名ニ基ヅク。



ごまのはぐさ科

やまひなのうすつぼ Scrophularia duplicato-serrata Makino.

(=S. alata A. Gray var. duplicato-serrata Miq.)

中部以西ノ山地ニ生ズル多年生草本ニシテ性陰濕ヲ好ミ、溪側ニ多シ。全草瘠弱ニシテ、木質化セル根莖淺ク地下ニ蟠居ス。莖ハ立チテ高サ30-50cm、上部ニ分枝ス。葉ハ柄アリテ對生シ、卵狀橢圓形或ハ卵形ニシテ質薄ク、先端尖リ底部ハ淺心臟形ヲ成シ邊緣ニ齒牙狀ノ重鋸齒ヲ刻ム。八月莖頂ニ疎ナル圓錐花序ヲ成シ、花梗ヲ開出シ疎ニ花ヲ着ク。萼ハ五尖裂、裂片鈍頭。花冠ハ長サ1cmニ滿タズ、筒部ハ壺狀ニシテ、舷部ハ唇形ヲ成シ圓形ノ五裂片ト成リ、其上唇ノ二裂片ハ大ニシテ直立シ、下唇三裂片ノ兩側片ハ立チ最下一裂片ハ反屈ス。二長二短ノ四雄蕊ト一假雄蕊トアリ。子房上ノ花柱ハ鈍狀截形ノ筒狀ヲ成ス。花後廣卵形ニシテ尖レル蒴ヲ結ビ下ニ宿存萼ヲ伴ヒ二殼片ニ開裂シテ細種子ヲ出ス。從來之レヲひなのうすつぼトスレドモ今之レヲ訂正シ、おほひなのうすつぼトス。和名山雛ノ白壺ハ山ニ在ル雛ノ白壺ノ意ニシテ、其產處ト花容トニ由テ名ケシナリ。漢名山玄參(誤用)。



ごまのはぐさ科

第451圖

ひなのうすつぼ

一名 おほひなのうすつぼ

Scrophularia kakudensis Franch.

山野ニ生ズル多年生草本。根ハ集合塊根ヲ成シ、莖ハ高サ1m内外ニ達シテ直立シ、方形ニシテ通常紫色ヲ帶ブ。葉ハ對生シテ柄アリ。長卵形ニシテ邊ニ鋸齒アリ。夏秋ノ候、莖梢ニ枝ヲ分チテ大ナル圓錐花穂ヲ成シ、暗紫色ノ小花ヲ着ク。萼ハ短クシテ五裂シ、花冠ハ花筒短ク邊緣五裂シテ唇形ヲ成シ、下唇ハ反曲ス。雄蕊先熟ノ二強雄蕊ヲ有シ、一雌蕊アリテ花柱ハ遂ニ花喉ニ出ヅ。蒴果ハ卵形ニシテ二殼片ニ開裂シ、細種子ヲ出ス。和名山雛ノ白壺ニシテ小形ナル白狀ノ壺ノ意、其花容ニ由テ名ケシナリ。



ごまのはぐさ科

第452圖

ごまのはぐさ (玄參)

Scrophularia Oldhami Oliv.

山野ニ生ズル多年生草本。莖ハ直立シテ1.5m内外ニ達シ、方形ナリ。葉ハ有柄ニシテ對生シ、長サ7cm許、長卵形ニシテ末尖リ、邊緣ニ鋸齒アリ。夏時、莖末ニ直立セル狭キ長花穂ヲ成シ、多數ノ小形黃綠花ヲ綴ル。萼ハ五裂シ、花冠ハ筒部壺狀ヲ呈シ、舷部ハ唇形ヲ成シ、下唇ハ反曲ス。二強雄蕊、一雌蕊アリ。蒴果ハ卵形。和名胡麻ノ葉草ハ葉形ニ基ヅク。根ヲ藥用ニ供ス。



ごまのはぐさ科