

第 46 圖

きく科



やまぼくち

Synurus palmato-pinnatifolia
Kitam.

山野ノ陽地ニ生ズル多年生草本。根出葉ハ長柄ヲ有シ稍ごばうノ葉ニ似テ缺刻尖起ヲ成ス。時ニ深裂シテ、殆ド掌状ヲ呈スルモノアリ。上面ハ綠色ニシテ下面ニ白色ノ綿毛ヲ密布ス。莖ハ高サ 1m 内外、細長ナル枝ヲ分チテ狭橢圓形葉ヲ互生ス。秋日、卵狀球形ノ頭狀花點頭シテ側ニ向ヒ、管狀花ハ白色時ニ紅紫色ナリ。總苞片ハ針形ナリ。

第 47 圖

きく科



をやまぼくち

Synurus pungens Kitam.

山野ニ生ズル多年生草本。高サ 90cm 内外、莖直立シ、通常梢ニ短キ枝ヲ分ツ。葉ハ下面ニ白色ノ綿毛ヲ布ク。根出葉ハ大ニシテ長柄ヲ有シ、三角狀卵形ヲ呈シ、ごばう葉ノ態アリ。莖葉ハ形小ニシテ、互生シ、橢圓形ヲ呈シ、梢葉ハ葉柄ナシ。秋時暗紫色頭狀花ヲ着ク。其形寧ロ大ニシテ、多數ノ管狀花ヨリ成リ、總苞ハ鱗片廣クシテ尖リ、質硬シ。嫩葉ヲ採リ餅ニ入レテ食ス。やまごばうノ方言アリ。

第 48 圖

きく科



はばやまぼくち

Synurus excelsus Kitam.
(= *Serratula excelsa* Makino.)

山野向陽ノ地或ハ林下ノ地ニ生ズル多年生草本。高サ 1-2m 許。全株白色ノ臥毛ヲ布ク。莖ハ高ク聳立シ剛直、紫褐色ニシテ稜アリ、獨リ上部ニ於テ分枝シ、枝ハ直立ス。根葉ハ長柄ヲ具ヘ三角狀鋸形ニシテ邊緣ニ大ナル齒牙狀缺刻ヲ成シ、更ニ刺狀ノ鋸齒ヲ有シ、裏面ハ綿毛ヲ密布シテ甚ダ白ク、底部耳片ノ先端ハ常ニ銳頭ナルハをやまぼくちトノ區別點ナリ、莖葉ハ數箇、疎ニ互生シ、上部ノ者ハ卵狀橢圓形ト成リ、皆刺狀ノ鋸齒ヲ有ス。晚秋大ナル頭狀花ヲ枝端ニ着ケテ點頭ス。花徑 3-4em、花開ケバ眉刷毛ノ形ニ似タリ。總苞ハ稍鐘形、總苞片ハ密ニ鱗次シ粗針形ヲ成シ質強硬ニシテ刺尖ヲ呈シ暗紫色ニシテ白色ノ蜘蛛毛ヲ被ル。花冠ハ全部管狀ニシテ黒紫色、光澤ヲ有シ、突出セル薬亦同色。和名はば山火口ハはば山ニ生ズルやまぼくちノ意、はば山ハ草ヲ刈ル山上ノ地ヲ云ヒ、やまぼくちハ同屬ノ一種ノ名ナリ、山地ニ生ジ其冠毛ヲ火口ニ利用スルヨリ云フ。

第 49 圖

きく科



たむらさう

一名 たまばうき
Serratula coronata L.

山地ニ生ズル多年生草本。葉ハ互生シ、羽狀深裂ニシテ、裂片ニ粗齒アリ。根上ニ莖ヲ抽クコト 1-1.5m ナリ。八九月頃梢ニ枝ヲ分チ、每枝頭ニ可ナリ大ナル淡紅紫色ノ頭狀花ヲ着クルコトあざみ類ノ如ク、花形亦相似タリ。總苞ハ廣卵球形ニシテ、總苞鱗片ハ覆瓦狀ニ鱗次シ密接セリ。

第 50 圖

きく科



てうせんあざみ

歐名 アーチチヨーク
Cynara Scolymus L.

歐洲ノ原產、大形ナル二年生草本。莖ノ高サ 1.5-2m ニ達ス。葉ハ大ニシテ深ク羽裂シ、裂片ハ往々更ニ羽裂ス。上面綠色、下面ニ白綿毛ヲ有ス。夏時莖頂ニ大ナル紫色頭狀花ヲ着ケ、多數ノ管狀花ヲ有シ、總苞ハ其鱗片短廣ニシテ覆瓦狀ニ鱗次ス。嫩キ頭狀花ノ花托ヲ食用トス。朝鮮薊ノ稱アレドモ固ヨリ朝鮮ノ產ニ非ラズ。

第 51 圖

きく科



ごばう (牛蒡)

Arctium Lappa L.

園圃ニ栽培セラル越年生草本。莖ハ高サ 1.5m 許。根葉ハ叢生シ、大ニシテ長柄ヲ具ヘ、稍心臟形、齒牙緣ニシテ波狀ヲ呈シ、下面ハ白綿毛ヲ布ク。夏日梢ニ分枝シ紫色稀ニ白色ノ管狀花ヨリ成ル多數ノ頭狀花ヲ着ク。總苞鱗片ハ針狀ニシテ先端鈎状ヲ成ス。多肉ノ長キ主根ヲ採リテ食用トシ、又時ニ其嫩葉柄ヲ食スルコトアリ。又民間藥トシテ效用多シ。果實ノ漢名ヲ惡實ト云フ。