

第508圖

やまたふばな
Clinopodium multicaule

O. Kuntze.

(= *Calamintha multicaulis Maxim.*)
西南暖地諸州ノ山地樹陰ノ地ニ生ズル多年生草本。莖ハ一株ニ叢生シ、弓曲シテ傾上シ瘦長ナリ。地下ニ極メテ短キ根莖アリ。高サ10-20cm、全株纖弱ニシテ散毛アリ。葉ハ有柄、對生シ卵形長橢圓形或ハ卵狀披針形ニシテ銳頭、狹底、稍膜質ニシテ粗ナル鈍鋸齒アリ、兩面ニ散毛アリテ裏面ハ淡綠色ヲ呈ス。八月梢ニ少數ノ輪繖花序ヲ着ケ各輪稍隔離ス。花ハ小形白色ニシテ各輪繖ニ其數少ナク、二乃至四箇アリ、葉狀ヲ成セル小形ノ苞アリ。萼ハ短筒狀鐘形ニシテ五裂シ、裂片ハ鉞形ナリ。花冠ハ萼ノ倍長アリ短筒形ニシテ上部ハ唇形ヲ成シ、上唇ハ二淺裂シ下唇ハ上唇ヨリハ闊大ニシテ三尖裂ス。二強雄蕊。花柱ハ略ボ雄蕊ト同長。宿存萼ノ底ニ果實アリ。みやまたふばなニ比スレバ草狀小ニシテ疎ナリ。和名ハ山塔花ノ意ナリ、塔花ハ同屬ノ一種ニシテ其花層ヲ成シテ開ク故云フ。

くちびるばな科



第509圖

くるまばな
Clinopodium chinense

O. Kuntze.

原野ニ多キ多年生草本ニシテ、高サ30-60cmニ達ス。莖ハ方形ニシテ直立或ハ傾上シ、通常梢ニ枝ヲ分ツ。葉ハ對生シ、卵形或ハ長卵形ニシテ邊緣ニ鋸齒アリ。夏日、枝梢ニ層ヲ成シ、莖ヲ圍ミテ葉腋ニ淡紅色ノ唇形花ヲ簇生ス。萼五裂シ、線形苞ト共ニ毛多シ。花冠ハ下唇闊ク、紅點アリ。二強雄蕊アリ。和名車花ハ莖節ヲ周リテ輪層ヲ成セル花狀ニ基ク。從來風輪菜ノ漢名ヲ充ツレドモ非ナリ。

くちびるばな科



第510圖

みぞかうじゅ (薺葶)

一名 ゆきみさう

Salvia brachiata Roxb.

田圃・畦畔ニ多ク見ル二年生草本ニシテ高サ30-60cm許。莖ハ直立シ、方形ニシテ分枝ス。葉ハ對生シ、長橢圓形ニシテ葉腋ニ鈍鋸齒ヲ有シ、葉面ニ皺アリ。五六月ノ頃、各枝梢毎ニ花穂ヲ成シテ淡紫色小形ノ唇形花ヲ綴リ、層ヲ成ス。萼五淺裂シ、花冠ハ下唇闊ク、紫點アリ。二強雄蕊アリ。和名ハ溝香薷ノ意ナリ。

くちびるばな科



はるのたむらさう

Salvia Ranzaniana Makino.

(= *S. japonica Thunb. var. pumila Fr. et Sav.*;
S. chinensis Benth. var. pumila Makino.)

我邦南部ノ山地溪側ニ生ズル多年生ノ小草。高サ12-20cm、根莖ハ瘠小、根葉ニハ長柄アリ。葉ハ葉柄ヲ有シテ對生シ概形長卵形或ハ長橢圓形ヲ呈シ、一乃至略ボ二回羽狀複葉ト成リ、小葉ハ卵形・橢圓形或ハ倒卵形ニシテ鋸齒アリ、表面ニ散毛ヲ生ズ。四五月ノ候一莖ヲ葉中ニ抽キテ直立シ、頂ニ輪繖花序ヲ成シ、中軸ハ紫色ヲ帶ブ。花輪ハ互ニ稍隔離シ、花ハ比較的少數、小形ニシテ白色。萼ハ兩層ヲ成シ、五裂シテ宿存シ後脈上ニ細腺毛アリ。花冠ハ萼ヨリ超出シテ下部ハ筒形ヲ呈シ、上部ハ短ク兩層ヲ成シ上唇ハ立チテ二裂片ニ淺裂シ、下唇ハ平開シテ三裂ヲ成シ、中央裂片ハ大ニシテ二裂片ニ淺裂ス。二雄蕊アリテ少シク花冠ノ上ニ出デ、丁字形ノ其藥隔弓形ヲ成シテ一端ニ長形藥アリ。一雌蕊ニシテ花柱ハ藥ト參差シ柱頭ニ二岐セリ。四分果ハ夏中其宿存萼底ニ熟シテ萼内ヨリ外ニ出デテ地ニ落ツ。和名ハ春の田村草ノ意ナリ。

第511圖



くちびるばな科

第512圖

なつのたむらさう

Salvia japonica Thunb.

山地ニ生ズル多年生草本ニシテ、高サ凡30cm内外、莖ハ方形ニシテ直立ス。葉ハ對生シ、葉柄ヲ具ヘ、再羽裂ニシテ裂片ニ鋸齒アリ。夏日梢ニ分枝シ、每枝ニ花穂ヲ成シテ深紫色ノ唇形花ヲ着ケ、層ヲ成ス。萼ハ唇形。花冠ハ下唇闊シ。二雄蕊高ク花冠外ニ出ヅ。花後其莖地ニ倒レ、莖上ニ苗ヲ生ズル殊態アリ。

くちびるばな科



第513圖

あきのたむらさう (紫參)

Salvia chinensis Benth.

山野ニ普通ナル多年生草本ニシテ、高サ60cm許ニ達ス。莖ハ方形ニシテ直立ス。葉ハ柄アリテ對生シ、奇數羽狀複葉ニシテ通常三乃至七片ノ小葉ヨリ成ル。稀ニハ時ニ單葉ヲ有スルコトアリ。秋日、通常莖梢ニ分枝シ、每枝ニ花穂ヲ成シテ淡紫色ノ小唇形花ヲ綴リ、層ヲ成ス。萼ハ唇形。花冠ハ毛アリテ下唇闊ク、二雄蕊ハ少シク花冠外ニ出ヅ。從來用キシ鼠尾草ノ漢名ハ中ラズ。

くちびるばな科

