


第538圖

くちびるばな科



たつなみさう

Scutellaria indica L.

林邊・原野ニ生ズル多年生草本ニシテ高サ30cm許。莖ハ數條叢生シ、方形ニシテ細長、葉ト共ニ細軟毛ヲ密生ス。葉ハ對生シテ葉柄ヲ有シ、圓狀心臟形ニシテ邊緣ニ鈍鋸齒アリ。初夏、莖頂ニ穗ヲ成シ、紫色ノ唇形花ヲ着ク。二花相列ビ、花冠ハ立チテ筒部長ク、一側ニ向テ開ク。下唇闊ク、紫點アリ。萼ニハ上唇ニ圓盤アリ。二強雄蕊アリ。分果ハ宿存萼内ニ在リ。和名立浪草ハ花姿ニ由ル。

第539圖

くちびるばな科



しそばたつなみ

Scutellaria indica L. var. humilis Makino.

山地樹陰ニ生ズル多年生草本。たつなみさうノ一變種ニシテ之ヨリ丈低ク、普通10-15cm許。葉ハ有柄對生シ、心臟狀卵形ニシテ邊緣ニ鈍鋸齒ヲ具フ。表面ハ深綠色ナレドモ、裏面及葉脈紫色ヲ呈シ、稍しそノ葉ニ似タリ、故ニ紫蘇葉立浪ノ和名アリ。六月頃、莖梢ニ3cm餘ノ穗ヲ成シ、紫色ノ長形唇形花ヲ開キ、二花相列ビテ立ツ。萼・花冠ノ狀、母種ト相同ジケレドモ其色ハ稍淺シ。

第540圖

くちびるばな科



やまたつなみさう

Scutellaria transitra Makino.

山中樹陰ニ生ズル多年生草本。白色ノ細長ナル地下莖アリテ地中ヲ引ク。莖ハ直立シテ高サ15-30cm許、方形ニシテ毛アリ、多クハ單一ナレドモ又分枝スルコトアリ。葉ハ少數ニシテ對生シ葉柄ヲ具ヘ、卵形或ハ三角狀卵形ニシテ鋭尖頭心臟底、邊緣ニ鈍鋸齒ヲ有シ、表面ハ鮮綠色或ハ脈上紫色ヲ帶ビ、光澤ハ無シ。五六月ノ候、莖頂ニ葉狀苞ヲ伴フ總狀花序ヲ成シテ直立シ、稍疎ニ淡紫花ヲ着ケ、毎花極メテ短キ小梗ヲ有シテ下ヨリ開キテ漸次上方ニ及ブ。萼ハ綠色ニシテ短ク、口ハ二唇ヲ成シテ上唇ニハ圓形ノ附飾物アリ。花冠ノ筒部ハ長クシテ直立シ、長サ15-20mm、絨部ハ兩唇ト成リ、筒部ヨリハ濃色ニシテ上唇ハ稍兜狀、下唇ハ三淺裂シ、裂片ハ皆鈍頭ナリ。二強雄蕊。花柱ハ末端ニ二岐ス。四分果ハ宿存萼ノ底ニ在リ。和名山立浪草ニシテ山ニ生ズルたつなみさうノ意ナリ。

なみきさう

Scutellaria scordifolia Fisch. var. pubescens Miq.

海邊砂地ニ生ズル多年生草本ニシテ、高サ30cm内外、地下莖ヲ引キテ繁殖ス。莖ハ立チテ分枝シ、葉ト共ニ毛ヲ被フル。葉ハ對生シ、殆ンド無柄ニシテ長橢圓狀披針形ヲ呈シ、鈍頭ヲ成シ、邊緣ニ鈍鋸齒アリ。夏秋ノ候、梢上葉腋ニ短梗アル紫色唇形花ヲ對生シ、一方ニ向テ開ク。萼ハ五裂。花冠ノ唇部ハ開口ス。二強雄蕊アリ。浪來草ノ和名ハ此品海濱砂地ニ生ズルヨリ起ル。

第541圖

くちびるばな科



ひめなみき

Scutellaria dependens Maxim.

原野、濕地ニ生ズル多年生草本。全草無毛、平滑ナリ。地下ニハ細長白色ノ匍枝ヲ引ク。莖ハ瘦長方形綠色ニシテ高サ30cm内外、直立シ、往々分枝シ、枝モ亦斜ニ直上ス。葉ハ小形ニシテ短柄ヲ以テ對生シ、長卵形、長サ15mm内外、鋭尖頭ナレドモ鈍端、淺キ心臟底ヲ成シ、邊緣ニハ少數ノ鈍鋸齒アリテ質柔薄ナリ。六月ノ候、梢部ノ葉腋ニ各一ノ小白花ヲ着ケテ短小梗ヲ具フ。綠色ヲ呈セル萼ノ上唇ニハ圓キ突起アリテ附飾物ヲ成ス。花冠ハ漏斗狀唇形、筒部ハ弓曲シテ膨ラミ、下唇ノ内部ニハ紫點ヲ布ク。二強雄蕊。花柱ノ頂ハ二岐ス。四分果ハ宿存萼底ニ位ス。和名姫浪來ハなみきさうニ似テ小形ナルヲ以テ云フ。

第542圖

くちびるばな科



こがねばな (黄芩)

一名 こがねやなぎ

Scutellaria baikalensis Georgi.

東亞大陸ノ原産ニシテ園養スル多年生草本。莖ハ立チテ分枝シ、高サ30-60cm許ニシテ、葉ト共ニ毛ヲ帶ブ。葉ハ殆ンド無柄ニシテ對生シ、披針形ニシテ尖リ、全邊ナリ。夏日、主莖梢及枝梢ニ穗ヲ成シ、對生シテ紫色ノ唇形花ヲ開キ、一方ニ向テ開ク。萼ハ五裂。花冠ハ立チ、大ニシテ筒部長ク、唇部開口ス。二強雄蕊アリ。根ヲ藥用トス。和名黄金花ハ花色ニ由ルニ非ズシテ、其根色ニ基キ名ケシナリ。

第543圖

くちびるばな科

