

第556圖

くまつづら科



くさぎ (臭牡丹樹)

*Clerodendron trichotomum* Thunb.

山野ニ自生多キ落葉灌木ニシテ高サ1.5-3m許ニ達シ、分枝ス。葉ハ長柄ヲ以テ對生シ、全邊ノ廣卵形ヲ成シテ先端尖リ、短毛ヲ密生シ、臭氣アリ。八九月頃、枝端ニ聚繖花序ヲ成シテ多數ノ花ヲ開キ、芳香アリ。萼ハ五深裂シ、綠赤色ヲ呈ス。花冠ハ白色、高盆形ヲ成シテ下ハ瘦長ナル筒ヲ成シ、脛部ハ平開シテ五片ニ分レ、紅采アリ。四雄蕊ハ一花柱ト共ニ著シク花外ニ突出ス。果實ハ圓クシテ碧色ニ熟シ、果下ニ星狀ニ開キタル紅紫色ノ宿存萼アリ。往々嫩葉ヲ食用トス。和名ハ臭木ノ意。漢名 海州常山モ或ハ是乎。

第557圖

くまつづら科



ひぎり (赧桐)

一名 たうぎり

*Clerodendron japonicum* Makino.

暖國ノ原産ニシテ通常觀賞花トシテ栽培セラルル落葉小灌木。幹ノ高サ1m内外ニ達ス。葉ハ長柄ヲ以テ對生シ、きりノ葉ノ如ク圓クシテ尖リ、邊緣ニ鋸齒ヲ有シ、深綠色ニシテ裏面ニ黃色ノ粉腺ヲ布キ、大ナルハ全長30cmニ達ス。夏秋ノ候、枝端ニ分枝シテ大ナル圓錐花序ヲ成シ、多數ノ赤花ヲ開キ、頗ル美觀ナリ。萼ハ花冠ト共ニ赤ク、卵圓形ニシテ五裂ス。花冠ハ下ハ筒ヲ成シ、上部ハ五裂シテ開ク。長キ四雄蕊ハ花柱ト共ニ上曲ス。和名ハ緋桐又ハ唐桐ノ意ナリ。

第558圖

くまつづら科



はまごう (蔓荊)

*Vitex rotundifolia* L. fl.

海邊ノ砂地ニ多キ落葉灌木。主莖ハ長ク砂上砂中ヲ横走シ、地ニ接スル處ニ根ヲ下ス。之レヨリ出ヅル枝ハ立チテ30-60cm許アリ。葉ハ對生シ、橢圓形又ハ倒卵圓形ニシテ大サ3-5cm餘、全邊(極テ稀ニ三裂葉ヲ交ユルモノアリ、かはりばはまごう即チ var. *heterophylla* Makino ト云フ)ニシテ短柄アリ、表面綠色ニシテ裏面ハ白色ヲ呈ス。夏日、梢頭ニ穗ヲ成シテ紫色ノ唇形花ヲ綴ル。萼ハ鐘形。花冠ハ下唇三裂シテ闊ク、内面ニ毛アリ。四雄蕊アリ。花後硬キ圓實ヲ結ビ、宿存萼ヲ伴フ。實ヲ蔓荊子ト稱シ、藥用ニ供ス、少シク香氣アリ。處々ノ土言ニ之ヲほうと呼ブ、和名ハまごうハ蓋シハまほうノ轉乎。

にんじんぼく (牡荊)

*Vitex cannabifolia*

*Sieb. et Zucc.*

支那原産ノ落葉灌木ニシテ通常庭園ニ植エラル。高サ凡3m餘ニ達シ、枝梢對生ス。葉ハ長柄ヲ有シ、掌狀複葉ニシテ五小葉ヲ具ヘ、梢ノモノハ三小葉ト成ル、葉縁ニ鋸齒アリ。七八月ノ頃、枝梢葉腋ニ長サ20cm内外ノ穗ヲ成シテ多數ノ淡紫色小唇形花ヲ綴リ、萼ハ五裂、有毛。花冠ハ下唇長大ナリ。人參木ノ和名ハ其葉形ニ基ク。

むらさきしきぶ

一名 みむらさき

*Callicarpa japonica* Thunb.

山野ニ多ク生ズル落葉灌木ニシテ幹ハ高サ1.5-2m、稀ニ3m許ニ達ス。葉ハ有柄、對生シ、橢圓形或ハ長橢圓形ヲ成シテ兩端尖リ、邊緣ニ鋸齒ヲ有ス。六七月頃、葉腋ニ多數ノ淡紫色細花ヲ聚繖的ニ撰簇シテ開キ、香氣アリ。萼ハ短鐘狀、五淺裂。花冠ハ四裂シ、四雄蕊超出ス。花後ニ生ズル球形ノ小漿果ハ秋ニ至リテ紫色ニ熟ス。和名ハ優美ナル紫實ニ基キ、才媛紫式部ノ名ヲ假リテ其樹名ヲ美化セルモノナリ。漢名 紫珠(慣用)

こむらさき

一名 こしきぶ

*Callicarpa dichotoma* Raeus.

(=*Porphyra dichotoma* Lour.; *C. purpurea* Juss.; *C. gracilis* Sieb. et Zucc.) 山足ノ濕地或ハ原野水傍ノ地ニ生ズル落葉灌木。高サ1-1.5m許、枝ハ多少彎曲シ、暗紫色ヲ帶ブルコト多ク、且星狀毛ヲ布キ後ニハ多ク脱落ス。葉ハ對生シテ短柄ヲ具ヘ、狹倒卵形又ハ倒卵狀長橢圓形ニシテ先端ハ鋭ク尖リ、上半部ノミ鋸齒ヲ具フ。初夏ノ候、葉腋ニ細紫花ヲ開キ聚繖花序ヲ成シテ密ニ花ヲ着ケ、花梗ハ葉腋ノ稍上部ニ於ケル莖面ヨリ發出ス。萼ハ短鐘形ニシテ縁ニ四微齒アリ。花冠ハ筒部短ク脛部ハ四裂ス。雄蕊ハ四ニシテ高く挺出セリ。漿果ハ小球形ヲ成シテ枝上ニ密簇シ秋ニ入リテ紫色ヲ呈シ頗ル美ナリ。和名ハ小紫ノ意ニシテ同屬ノ紫式部ニ似テ小ナレバ斯ク云フ、小式部ハ之レヲ紫式部ニ比シテ其小ナルヲ表セリ、紫式部位ニ小式部ハ共ニ和歌ヲ善クセシ優婉ナル女性ナレバ乃チ其美麗ナル紫實ヲ着ケン本品ヲ紫式部ト同ジ歌人ノ小式部内侍ニ擬センナリ。

第559圖

くまつづら科



第560圖

くまつづら科



第561圖

くまつづら科

