

第 52 圖

さ
く
科



きつねあざみ (野苦麻)

Hemistepta carthamoides
O. Kuntze.

田野ニ生ズル越年生草本ニシテ、高サ 60-90cm。根葉ハ叢生シ、莖葉ハ互生シ、羽状ニ深裂シ、裂片ニ粗齒アリ。上面綠色ニシテ下面ニ白軟毛ヲ密布ス。四五月頃梢ニ分枝シ、枝端ニ頭状花ヲ着ケ、紅紫色管状花多シ。總苞片綠色ニシテ鱗次シ、其形卵圓形ヲ成ス。葉ヲ採リ餅ニ入ル。冠毛ヲ利用シテ花管ヲ製セシコトアリ。漢名 泥胡菜(慣用)

第 53 圖

さ
く
科



たうひれん

Saussurea Tanakae
Franch. et Sav.

山地ニ生ズル多年生草本。莖ハ高サ 30-60cm 許、直立シテ狭キ翼ヲ有スルヲ常トス。葉ハ柄アリテ互生シ、廣卵形ニシテ葉頭尖リ、往々心臟状底ヲ成シ、邊緣ニ鋸齒アリ。梢葉ハ小ニシテ、柄ナシ。秋時梢ニ枝ヲ分チ、紫色ノ管状花ヨリ成ル頭状花ヲ有シ、總苞鱗片ハ往々反曲ス。和名ハ唐飛廉ノ意ニシテ飛廉ハひれあざみノ我邦慣用ノ漢名ナリ。

第 54 圖

さ
く
科



きくあざみ

Saussurea ussuriensis Maxim.

山野ニ生ズル多年生草本。莖ハ高サ 60-90cm 許。葉ハ有柄ニシテ互生シ、廣卵形ニシテ先端尖リ、少數ニ羽裂シ、裂片ニ粗齒アリ。梢上多ク枝ヲ分チ、秋日、紅紫色ノ頭状花ヲ着ク。總苞長ク、數箇ノ管状花ハ上方ニ超出ス。和名ノきくハ其葉形ニ基ク。

みやこあざみ

Saussurea Maximowiczii Herd.

山地ニ生ズル多年生草本ニシテ高サ 60-90cm 許。葉ハ互生シ、長橢圓形又ハ披針形ニシテ羽状深裂シ、裂片ハ卵形或ハ卵状披針形ヲ成シ、邊緣ニ不齊ノ鋸齒ヲ有ス。上葉ハ小サク披針形ニシテ鋸齒縁ヲ成シ、梢ニ至ルニ從ヒ漸次全縁ト成ル。秋日梢上分枝シテ多數ノ淡紅紫色頭状花ヲ着クルコトきくあざみノ如シ。時ニ其葉分裂セズシテしをん葉ノ如キアリ、之ヲまるばみやこあざみト云フ。

第 55 圖

さ
く
科



みやまひごたい

Saussurea Kai-montana Takeda
forma major Takeda.
(= *S. triptera Maxim.*

var. major Kitam.)

本州中部ノ高山帯ニ生ズル多年生草本。根莖ハ粗大。莖ハ直立シ圓柱状、時ニ分岐シ、高サ 10-20cm アリ。脚葉ハ有柄、戟状長橢圓形又ハ戟形ニシテ邊緣ニハ不整ノ缺刻ト齒牙トヲ具ヘ、先端尖リ、底部ハ戟状心臟形ヲ成ス。七月、莖梢ニ三四花ヲ繖簇ス。總苞ハ卵状橢圓形ニシテ、覆瓦様ニ鱗次セル總苞片ハ有尾銳尖頭、草質ニシテ綠色ナリ。頭状花ハ徑 1cm 未滿、全部管状花冠ヲ有シテ淡紫色ヲ呈シ、冠毛ハ白シ。總苞片ノ黒紫色ヲ帶ブル者アリテ之ヲたかねひごたい一名きんぶひごたい (*f. minor Takeda* = *S. triptera var. minor Kitam.*) ト云ヒ、一般ニ本品ヨリハ小形ナリ。和名ハ深山ひごたいナリ。

第 56 圖

さ
く
科



ひめひごたい

Saussurea pulchella Fisch.

山野向陽ノ地ニ生ズル多年生ノ大形草本。莖ハ直立シテ高サ 120cm 許ニ達シ直徑 15mm ニ及ビ綠色ニシテ紫色ヲ帶ビ條縱通シ、微毛細隙ヲ布ク。葉ハ廣披針形又ハ披針形、下部ノ者ハ羽状ニ深裂シ、上部ノ者ハ全邊ト成リ、又時ニ小本ノ者ハ全株ヲ通ジテ全邊葉ヲ着クルアリ、嫩時ハ淡綠色ヲ呈シ表面ハ稍糙澁ス。深秋梢上ニ廣大ナル繖房状ヲ成シテ多數ノ紫色頭状花ヲ密集シ頗ル美ナリ。總苞ハ球形、徑 1cm 内外、密ニ鱗次セル總苞片ハ其先端ニ圓キ紫色ノ附飾片ヲ具ヘ此附飾片ハ膜質ニシテ上部ニ至ルニ從ヒ大形ト成リ美麗ナリ。小花ハ皆管状ニシテ五裂シ、冠毛ハ白シ 此一品ニハいくのひめひごたい (*var. tajimensis Makino*) アリ、壯大ニ成長シテ中部上部ニ分枝多ク、頭状花ハ極メテ多數ニシテ母品ヨリ小ク、總苞ハ球形ニシテ鱗片小形、淡綠色、附飾片モ亦小ニシテ狭シ。和名ハ姫ひごたいニシテひごたいニ比スレバ小形ナレバ云フ。

第 57 圖

さ
く
科

