

第 58 圖

ほくちあざみ

Saussurea gracilis Maxim.

九州・中國等ノ山地ニ生ズル多年生草本。高サ 10-30cm 許。葉ハ互生シ、下部ノモノハ長柄ヲ有シ、長卵形ニシテ、底部略心臟形ヲ成シ、邊緣ニ齒アリ。上部ノ葉ハ小ニシテ、短柄ヲ有スルカ又ハ無柄ナリ。葉裏ニ白毛ヲ密布ス。秋時梢ニ枝ヲ分チ、紫色ノ管狀花ヨリ成ル小形ノ頭狀花ヲ着ク。



第 59 圖

のあざみ (小薊)

Cirsium japonicum DC.

原野ニ多キ多年生草本。莖高サ 60-90cm 許、梢ニ枝ヲ分ツ。葉ハ莖ニ互生シ、無柄ニシテ葉底莖ヲ抱キ、羽裂シテ裂片粗齒アリ、齒端棘ヲ成シ、莖・葉ニ毛アリ。初夏枝端ニ紅紫色ノ管狀花ヨリ成ル頭狀花ヲ着ク。稀ニ白・紅色等ノ異品アリ。總苞圓クシテ總苞片鱗次シ片脊粘着ス。漢名ノ一ヲ刺薊菜ト云フ。



第 60 圖

やまあざみ

Cirsium spicatum Matsum.

山野ニ生ズル普通ノ多年生草本。高サ 1m 内外ニシテ、多ク枝ヲ分チ、莖ニ稜アリ。葉ハ互生シ、羽裂シテ邊緣ニ刺多シ。脚葉ハ往々脈間白色ヲ呈ス。秋日紫色ノ頭狀花ヲ開キ、其數多ク、枝ノ頂ト側方ニ生ジ、側者ハ花梗極メテ短シ。總苞ノ鱗片ハ普通反曲ス。管狀花ハ總苞ヨリ高ク出ヅ。漢名 大薊(慣用)



のはらあざみ

Cirsium Tanakae Matsum.

(=*Cnicus Tanakae Franch. et Sav.*)

山野ニ普通ナル多年生草本。莖ノ高サ 1m 内外ニシテ枝ヲ分ツ。葉ハ羽狀ニ深裂ス。根葉ハ大形ニシテ裂片闊カラズ往々紫色ヲ帶ブ。莖葉ハ互生シ、裂片不齊ニ齒裂シ、齒端棘ヲ成ス。秋日梢上枝ヲ分チ、紫紅色ノ頭狀花ヲ着ク、頭狀花ハ花梗短ク往々集リ着ク。總苞鱗片ハ短クシテ通常反曲セズ。和名野原薊ハ原野ニ多キヲ以テ斯ク云フ。



第 61 圖

くるまあざみ

Cirsium Tanakae Matsum.
forma obvallatum Makino.

(=*C. japonicum DC.*

var. obvallatum Nakai.)

のはらあざみノ一變形ニシテ、頭狀花ハ其基部ニ多數ノ葉狀總苞ヲ輻狀ニ着クルヲ以テ異點トス。高サ 40-50cm 許ノ多年生草本ニシテ莖ハ直立シ、下半部ハ粗毛アリ。葉ハ根際ニ輻狀ヲ成シテ花時ニ猶存シ、橢圓形ヲ呈シ邊緣ニ缺刻アリ、又鋭齒ヲ具フ。晩秋莖上疎枝ヲ分チテ各枝端ニ大ナル頭狀花ヲ着ク。頭狀花ハ直立シ、葉狀苞ハ披針形、刺線ニシテ長キ者ハ 6cm ニ達スト雖モ、内部漸次小形ト成リ、時ニ總苞片ニ移行ス。總苞片ハ鋸形ニシテ粘質無シ。花ハ一頭狀花ニ多數アリテ皆管狀小花ヲ成シ紅紫色ヲ呈ス。本品ノ葉狀總苞ノ出現ハ一時的ノ變態現象ニシテ毎年其株ヨリ一定シテ出ヅルニ非ズ、故ニ敢テ一ノ變種ト認ムルニ由ナシ。和名車薊ハ其車輪狀ヲ成セル葉狀總苞ノ狀ニ基キテ名ケタリ。



第 62 圖

ひめあざみ

一名 なんぶあざみ・なあざみ

Cirsium nipponicum Makino.

山野ニ生ズル無毛ノ多年生草本。莖ノ高サ 1m 内外、往々紫色ヲ帶ビ梢上ニ枝ヲ分ツ。葉ハ互生シテ羽裂シ、長橢圓形ニシテ邊緣ニ鋭鋸齒ヲ有シ、葉底ハ莖ヲ抱ク。秋日、紅紫色ノアマリ大ナラザル頭狀花ヲ開キ、總苞片反曲スルヲ常トス。春時莖葉ヲ採リテ食ス。漢名 苦苣(誤用)

