

第 1024 圖

ぶだう科



ぶだう (葡萄)

*Vitis vinifera* L.

あじお西部地方ノ原産ニシテ今ハ世界ニ廣ク栽培セラルル落葉攀緣藤本ナリ。莖ハ葉ニ對出セル卷鬚ヲ以テ攀行シ長ク延ビ、舊莖ハ稍平扁、經年ノ者ハ可ナリ巨大ト成ル。枝ハ節アリテ多少之曲シ、嫩條ニハ毛アリ。葉ハ有柄互生シ、掌狀ニ淺裂シ、底部ハ心臟形ヲ呈シテ鋸齒アリ、裏面ニ綿毛ヲ密布ス。初夏、新枝ノ葉ニ對シテ圓錐花穗ヲ出シ、黃綠小花ヲ攢簇ス。萼ハ輪狀截形。花瓣ハ五、頂着合シ、基部ヨリ開キ離レテ落ツ。雄蕊五、花絲間ニ蜜槽體アリ。漿果ハ房ヲ成シテ下垂シ、球形多汁ニシテ褐紫色ニ成熟シ、甘味生食スベク或ハ葡萄酒ヲ醸造ス。果中ニ二、三ノ種子アリ。和名ぶだうハ葡萄ノ字音ヨリ出デ、葡萄ハ蒲桃ヨリ來リ蒲桃ハ大宛國ノ土言Budawニ基ヅケル音譯字ナリ。

第 1025 圖

ぶだう科



やまぶだう

*Vitis Coignetiae* Pulliat.

山中ニ生ズル大形ノ落葉攀緣藤本ニシテ莖ハ長ク成長シテ葉ニ對出セル卷鬚ヲ以テ他樹ノ上ニ攀行シ、經年ノ者ハ其幹徑數cmアリテ濃褐色ヲ呈シ、枝ハ節アリテ多少之曲シ、嫩條ニハ褐毛アリ。葉ハ有柄互生シ、大形ニシテ三、五尖角アル圓形ヲ成シ、底部ハ心臟形ヲ呈シ、葉緣ニ低尖鋸齒アリ、葉裏ハ茶褐色ノ綿毛ヲ密布ス。秋ハ能ク紅葉ス。花ハ小形黃綠色ニシテ葉ニ對出セル有梗ノ圓錐花穗ニ攢簇シ、花穗下部ノ梗上ニ往々卷鬚アリ。萼ハ輪形。花瓣ハ五、頂合シ、下部分離シ、花托ヨリ離レ落ツ。雄蕊五、花絲間ニ蜜槽アリ。漿果ハ房ヲ成シテ下垂シ、豌豆大ノ球形ニシテ黑熟シ、食フベシ。和名ハ山葡萄ノ意。漢名紫葛(誤用)

第 1026 圖

ぶだう科



えびづる (嬰莢)

*Vitis Thunbergii* Sieb. et Zucc.

山野ニ普通ナル雌雄異株ノ攀緣藤本ニシテ莖ハ葉ニ對出セル卷鬚ニ由テ攀登シ、舊莖ハ褐色ヲ呈シ、稍平扁ニシテ節アリ、多少之曲ス。嫩枝ハ白毛アリ。葉ハ有柄互生シ、心臟狀圓形ニシテ三-五裂シ、時ニ深裂シ、葉緣ニ鋸齒アリ、表面無毛、裏面ハ白色或ハ淡褐色綿毛ヲ密布ス。小ナル有梗圓錐花穗ハ葉ニ對出シ、淡黃綠色ノ小形花ヲ密簇シ、夏月開花ス。梗上ニハ往々卷鬚ヲ具フ。萼ハ輪形。花瓣ハ五、頂部合一シ、下部分離シ、花托ヨリ離レ落ツ。雄蕊五、雌花ノ者ハ不熟。雌蕊一、雄花ノ者ハ不熟。漿果ハ小キ房ヲ成シ、小球形ニシテ黑熟シ、食フベシ。和名ハえび蔓ノ意、えびかづらハ本品ノ古名、後チ葡萄ノ名ト成ル。

ぎやうじゃのみづ

一名 さんかくづる

*Vitis flexuosa* Thunb.

山地ニ見ル落葉攀緣藤本ニシテ雌雄異株ナリ。莖ハ葉ニ對出セル卷鬚ヲ以テ攀登シ、嫩條ニ毛ナシ。葉ハ有柄互生シ、卵圓形或ハ三角狀卵形ニシテ粗鋸齒アリ、兩面ニ毛ナシ、稚本ノ者ハ時ニ深裂ス。夏月、葉ニ對シテ小ナル有梗ノ圓錐花穗ヲ出シ、淡黃綠色ノ小花ヲ攢着ス。萼ハ輪形。花瓣ハ五、頂合シ下離ル。雄蕊五、雌花ノ者ハ不熟。雌蕊一、雄花ノ者ハ不熟。漿果ハ小球形ニシテ小キ房ヲ成シ黑熟シ食シ得。漢名葛藟・千歲藟(共ニ誤用)

けんぼなし (枳椇)

*Hovenia dulcis* Thunb.

山野ニ見ル落葉喬木。高聳シ凡17m許ニ達シ、枝條長シ。葉ハ有柄互生、廣卵形ニシテ尖リ、鋸齒アリ、圓底或ハ多少心底ヲ呈シ、基部ハ三脈上部ハ羽狀脈ヲ有シ、毛ナク或ハ下面ニ多少之レ有リ。夏月小枝端ニ繖房狀花穗ヲ成シ淡綠色小花ヲ攢簇ス。萼片五。花瓣五。雄蕊五、花絲ニ卷擁セラル。雌蕊一、三花柱。核果ハ球形、無毛(變種ニ有毛ノ者アリ、けけんぼなし var. *tomentella* Makino ト云フ)、短梗ヲ以テ肉質ニ肥大セル花穗枝ニ着キ、光澤アル堅硬種子ヲ藏ス。此肉質枝ハ甘味アリテ小兒之レヲ食ス。初冬ノ候此肉質ハ小枝ヲ連ネテ地ニ落ツ。和名ハ蓋シ手棒梨ノ意ニテ其形狀癩病患者ノ手ノ如ケレバ云フナラン、處ニヨリてんぼなしノ一名アリ、又支那ニモ癩漢指頭ノ名アリ、和名ヲ玄圃梨ノ意トスルハ非ナラン。

くろうめもごき

*Rhamnus japonica* Maxim.

山野ニ生ズル雌雄別株ノ落葉灌木ニシテ高サ1.5-6mニ達シ、針狀ニ變セル枝ヲ有シ、樹皮ハ平滑ナリ。葉ハ有柄對生或ハ略ボ對生シ、卵形或ハ橢圓形ニシテ尖リ、下部ハ楔形ヲ呈シ、葉緣ニ鈍鋸齒ヲ有ス、羽狀脈ヲ有シ、下部ノ支脈ハ長ク上走ス。夏日、葉腋ニ淡黃綠色ノ有梗小花ヲ束生ス。萼四片。花瓣四片、細小。雄花ニ四雄蕊、雌花ニ一雌蕊アリ、柱頭ニ岐ス。核果ハ小球形ニシテ黑熟ス、中ニ二核アリ。漢名鼠李(誤用)


第 1027 圖

ぶだう科



第 1028 圖

くろうめもごき科



第 1029 圖

くろうめもごき科

