

第1426圖



第1427圖



第1428圖



まんさく

Hamamelis japonica Sieb. et Zucc.
山地ニ生ジ又時ニ庭園ニ植エラル落葉小喬木或ハ小木ナリ。葉ハ互生シ稍歪形ヲ呈セル菱状椭圆形或ハ倒卵形、鈍頭、楔底或ハ微シク心臟状底、長サ7-12cm、幅5-7cm、邊緣ハ半以上ハ波状鈍齒ヲ有シ、以下ハ全緣ナリ。質厚ク、上面ハ無毛、稍皺縮、中脈ト支脈トハ陥入ス、下面ハ平滑、脈ハ隆起シ、脈上ニ星状毛アリ、支脈ハ中脈ノ兩側各五・六條アリ。葉柄ハ短クシテ星状毛アリ。春日葉ニ先チテ花ヲ開キ枝上ニ滿ツ。黃色ニシテ葉腋ニ單生或ハ少數簇出ス。萼片四、卵形ニシテ背反、内面ハ無毛ニシテ暗紫色、外面ハ絨毛密生ス。花瓣ハ四、線形、長サ1cm内外アリ。雄蕊ハ四、極メテ短シ。子房ハ二花柱ヲ有ス。蒴ハ卵狀球形ニシテ外面ニ短綿毛密布シ、二裂シ穀片硬ク黒色光澤アル種子ヲ彈飛ス。和名ハ満作ノ意ニシテ満作ハ豊作ト同ジク穀物ノ豊稔ヲ云フ、此樹花盛ニ發ラキテ枝ニ満ツレバスケ云フ、人ニ由レバまんさくヲ早春先開ノ義ニ取リシナリト謂ヘリ。漢名 金縹梅(誤用)

いすのき

一名 ゆすのき。ひょんのき 古名 ゆしのき
Distylium racemosum Sieb. et Zucc.
暖地ノ山中ニ自生スル常綠喬木、大ナル者ハ高サ20m、幹徑1m内外ニ達スル者アリ。葉ハ互生シ長椭圆形、鈍頭、楔底、長サ5-8cm、幅2-4cm、全緣、兩面無毛ニシテ光澤無シ、中脈ハ稍著シケレド羽状支脈ハ不明瞭ナリ。往々大ナル蟲瘿ヲ生ジ、小兒其孔ヲ吹テ笛トス。春、開花シ、花ハ紅色ニシテ總状花序ト成リテ腋生シ、上方ニ兩性花ヲ着ケ下方ニ雄花ヲ生ズ。花ニ花瓣無ク、萼片ハ三-六箇、披針形綠色ニシテ不同、外面ニ褐色星状毛ヲ生ズ。雄蕊ハ五-八箇、太キ花絲ヲ具フ。雌蕊ハ雄花ニテハ退化シ、兩性花ニテハ一箇アリ、子房ハ二室ニシテ外面ニ星状毛アリ、花柱ハ二岐。蒴果ハ木質、卵形、外面密毛ヲ有ス、長サ8mm許ニシテ二穀片ニ開裂シ種子ヲ出ス。和名ハ不明ニシテ從來正解ナシ、此樹ノ材ヲ櫛ニ作ル故ニくしのきノ名アリゆきト其發音相似タリ。ひょんの木ハ其蟲瘿ヲ吹ク時ひょうひょうト鳴ル音ニ基ヅキシ名ナリ。


ひうがみづき

Corylopsis pauciflora Sieb. et Zucc.
丹波但馬邊ノ山地ニ自生スト雖ドモ多ク觀賞庭樹トシテ人家ニ栽植シアル落葉灌木ナリ。高サ2-3m許、多ク分枝シ、枝ハ細長ニシテ折レ易シ。葉ハ互生シ小形ニシテ枝上ニ多ク、卵形ニシテ鈍頭、稍心臟状底、長サ2.5-4cm、幅1.5-2cm、邊緣ハ波状齒牙緣、質薄ク上面ハ無毛ニシテ下面ハ有毛、中脈ノ兩側各五-六條ノ明瞭ナル支脈アリ。春時葉ニ先チテ開花シ枝上ニ満チ、二-三箇ノ短キ穗状花序ヲ成シテ下垂ス。苞ハ大ニシテ膜質卵圓形ナリ。花ハ稍無梗、鮮黃色。萼ハ短鐘形ニシテ五裂シ穎片ハ同大、卵形、鈍頭ナリ。花瓣ハ五、倒卵狀橢圓形、楔底、圓頭。雄蕊ハ五、花瓣ト同長又ハ少シク短ク、葯ハ長椭圓形、黃赤色。子房二室、花瓣ヨリ長キ二花柱ヲ具フ。蒴ハとさみづきニ似テ小ク、二穀片ニ開裂シ頂ニ遺存セル花柱アリ。和名ニ日向水木ノ名アドモ日向ノ國ニハ未ダ野生スルヲ見ズ。

とさみづき

Corylopsis spicata Sieb. et Zucc.
土佐ノ山地ニ自生スレドモ通常庭園ニ植エテ觀賞セラル灌木ナリ。幹ハ高サ2-3mニ達ス。葉ハ互生シ圓形或ハ倒卵狀圓形、銳頭或ハ鈍頭、底部ハ心臟形ヲ呈シ、長幅共ニ4-10cm内外アリ、質厚ク、中脈ノ兩側各約八條ノ明瞭ナル支脈アリ、上面ハ無毛ナレドモ皺縮ヲ成シ、下面ニハ軟毛多ク、葉緣ハ波状鋸齒ヲ成ス。春日葉ニ先シテ開花ス。花ハ淡黃色ニシテ七-八箇穗状花序ヲ成シテ下垂ス。苞ハ卵狀圓形、全緣、有毛、謝落ス。花梗ハ極メテ短シ。萼ハ絨毛ヲ被リ、長五裂ス、裂片ハ不同、卵狀披針形。花瓣ハ五、長花管形、長サ7mm内外アリ。雄蕊ハ五、花藥ヨリ短ク葯ハ帶紅色。子房ハ二室、各一卵子アリ。花柱ハ長サ8mm内外、花瓣ヨリ長シ。蒴ハ二室二嘴アリテ硬キ二穀片ニ開裂シ、狹長椭圓形ノ種子ヲ出ス。和名ハ土佐水木ノ意ニシテ此種固ト土佐ヨリ出デシヨ以テ名ク。

第1429圖



第1430圖



みやまとさみづき

Corylopsis glabrescens
Franch. et Sav.

中部以西ノ山地ニ生ズル落葉灌木。莖ハ簇生シテ高サ1-2mニ達ス。枝極疎ニシテ皮目散在シ、精細ナリ。葉ハ有柄互生、卵狀長椭圓形或ハ卵狀心臟形等種々アリテ葉緣多クハ整正ノ波状銳尖齒牙ヲ有シ、々往々先端ハ銳尖頭、底部ハ心臟形ニシテ往々歪形ヲ呈シ、外觀とさみづき葉ニ比シ平行腋小形且ツ薄質ナリ。支脈規則正シ各側八條内外アリ。早春ニ舊枝ノ葉部ニ淡黃色ノ穗状花序ヲ垂ル。花序ノ基部ニハ同色ノ大ナル膜質鱗片數片アリ。花梗ハ全ク無毛ニシテとさみづき葉ニ比シテ細シ。花ハ他種ニ大同小異、花瓣ハ五片、雄蕊ハ花瓣ト略同長ナリ。秋時蒴果熟シ頂部ニ開裂シテ黒光アル四種子ヲ出ス。

第1431圖



ふう(楓)

Liquidambar formosana Hance.

臺灣并ニ支那ニ自生スル落葉喬木。我邦ハヘ章保年間ニ支那ヨリ傳へ時ニ庭園ニ栽植セラル。樹脂ハ蘇合香ノ芳香アリ。幹高サ20m、徑1-2mニ達スル者アリ。葉ハ互生シ長柄ヲ有シ、掌狀三裂ス。裂片ハ卵狀三角形、銳尖頭、細鋸齒緣。葉底ハ圓形、長幅共ニ7-10cm内外、乾ケバ洋紙質ヲ呈シ兩面無毛。秋時多少紅葉ス。花ハ單性ニシテ同株ニ生ズ。雄花ハ頭狀ヲ成セル者更ニ總狀ニ集リ、雌花ハ頭狀ヲ成シ單生ス。花ニ花被無シ。雄花ハ雄蕊ノ數不定ニシテ小鱗片混生シ、葯ハ二室、花絲ハ平滑ニシテ長サ1.5mm許。雌花ハ長サ10mm許ニ花柱アリ、其基部ニ四-五刺狀鱗片アリ、之レト交互ニ短キ假雄蕊四-五アリ。蒴ハ球形ノ集合果ヲ成シ相應着シ、徑2.5cm内外アリ。完全ナル種子ハ椭圓形ニシテ長サ7mm許、翅ヲ有ス。和名ハ漢名楓ノ音ナリ、邦人能クカヘでニ楓ノ字ヲ用ウルハ非ナリ。