

第142圖



さ
く
科

いはいんちん
一名 いはよもぎ
Chrysanthemum Pallasianum
Matsum. var. japonicum Matsum.
(= *Pyrethrum Pallasianum Maxim.*
var. japonicum Franch. et Sav.;
Ch. rupestre Matsum. et Koidz.)

野州日光山・信州浅間山及ビ戸隠山等ノ高山岩
石地ニ生ズル多年生草本ナレドモ根莖ハ木化
シ、高サ10-30cm許アリ。莖ハ瘦長ニシテ直立
シ基部ハ傾上ス。葉ハ互生シ、卵形ニシテ羽狀
ニ深裂シ裂片ハ少數ニシテ互ニ相距リ且ツ廣線
形ヲ呈シテ尖リ、葉ノ底部ハ楔形ヲ呈シテ遂ニ
葉柄ト成リ、表面ハ綠色ナレドモ裏面ニハ白色
ノ細毛ヲ密布シ、宛モよもぎニ似タリ。九十月
ノ候、莖頭ニ細梗ヲ分チ多數小球狀ノ頭狀花ヲ
繖房狀ニ攢着ス。頭狀花ノ徑 5mm 内外アリテ
舌狀花ヲ缺如ス。總苞ハ廣鐘形ニシテ黃色ヲ呈
シ、總苞片ハ卵形ニシテ廣キ薄膜部ヲ有ス。和
名ハ岩茵陳ノ意、茵陳ハ茵陳蒿ニテかはらよも
ぎノコトナリ、いはハ岩間ニ生ズルヨリ云フ、
岩艾ハ岩上ニ生ズルよもぎノ意ナリ。

第143圖



さ
く
科

もくしゅんぎく

一名 きだちかみるれ・まーがれつと

Chrysanthemum frutescens L.

亞弗利加洲かなり一島原産ノ多年生灌木
狀草本ナリ。莖ノ高サ 60-100cm、多ク枝
ヲ分チ、下部ハ木質ヲ成ス。葉ハ互生シ、
分裂セル裂片ハ線形ヲ呈ス、葉色帶白。
夏時白色ノ頭狀花ヲ枝端ニ着ケ、舌狀花
ハ一列ニ列ビテ平開シ、中心ノ管狀花ハ
黃色ナリ。花徑 3-6cm 許。觀賞品トシテ
栽培セリ。

第144圖



さ
く
科

しろむしよけぎく

一名 だるましやちよちゆうぎく

Chrysanthemum cinerariaefolium Bocc.

歐洲はるか諸國中だるましやノ原産ニ
シテ、廣ク培養セララル多年生草本ナリ。
葉ハ多數ニ羽裂シ、稍厚ク、淡綠色ヲ呈
ス。五六月ノ頃長莖ヲ抽クコト 30-60cm、
多ク枝ヲ分チテ各梢頭ニ頭狀花ヲ着ク。
白色黄心ニシテ花徑 3cm 餘アリ。花ヲ
粉末ニシテ蚤取粉ヲ製ス、故ニ除蟲菊ト
通稱ス。其莖葉ハ之ヲ蚊燻並ニ害蟲驅除
ニ利用ス。

あかむしよけぎく

一名 べるしやちよちゆうぎく

Chrysanthemum coccineum Willd.

べるしや原産ノ多年生草本ニシテ、往々
觀賞ノ爲メ栽培セラル。莖ノ高サ 60cm
内外。葉ハ互生シテ羽裂シ、裂片尖裂ス。
莖ハ往々疎ニ分枝シ、夏日莖頂ニ大ナル
紅色ノ頭狀花ヲ着ケ、周邊ニ長キ舌狀花
一列ニ並ブ。頭狀花ニテ製セル粉末ヲベ
るしや蟲除粉ト呼ブ。

第145圖



さ
く
科

しゅんぎく (同蒿)

Chrysanthemum coronarium L.
var. spatiosum Bailey.

南歐ノ原産ニシテ園圃ニ栽培セララル一
年生又ハ越年生草本。全株無毛ニシテ高
サ 30-60cm 許。葉ハ互生シテ再羽狀裂ヲ
成シ、無柄ニシテ葉底莖ヲ抱キ、稍軟質
ナリ。夏日、黃色時ニ白色黄心ノ頭狀花
ヲ開キ、中心ニ管狀花ヲ密集シ、周邊ニ
舌狀花ヲ整列ス。花徑凡ソ 1cm アリ。春
時嫩苗ヲ食スルニヨリ春菊ノ和名アリ、
一種ノ香氣ヲ有ス。母種ハ觀賞ノ爲メ園
中ニ栽培ス、之ヲはなしゅんぎくと稱ス、
しゅんぎくニ比スレバ稍小ナリ。

第146圖



さ
く
科

のこぎりさう

一名 はごろもさう

Achillea sibirica Ledeb.

山野ニ自生シ、又觀賞ノ爲メ栽培セララル
多年生草本。莖ハ瘦長ニシテ高サ 60-
90cm ニ達シ、葉ト共ニ軟毛ヲ被リ、莖梢
ノ葉腋ニ枝ヲ分ツ。葉ハ狹長無柄ニシテ
互生シ、羽狀ニ深裂シ、裂片多數ニシテ
鋸齒アリ。夏日、梢頭ニ繖房狀ヲ成シテ
多數ノ小頭狀花ヲ着ク。舌狀花少數ニシ
テ短ク、普通淡紅色ナレドモ又白色ノモ
ノアリ、培養品ニハ紅紫色ノモノ多シ。
漢名著(慣用)

第147圖



さ
く
科