

第 1540 圖

じふじばな科



なづな (薺)

一名 ペンペンぐさ

*Capsella Bursa-pastoris Medicus.*

郊外ノ路傍・田間或ハ庭傍等ニ生ズル極メテ普通ナル越年生草本ニシテ高サ30-50cm許、全體ニ疎毛ヲ被フル。主根ハ瘦長白色ニシテ地中ニ直下シ分枝ス。莖ハ直立シテ分枝ス。根生葉ハ叢生シテ地ニ布キ頭大羽裂シ、裂片狭長ニシテ耳片ノアル者アリ、又長橢圓形ノ者アリテ長サ往々10cmヲ超ユ。莖生葉ハ基部耳狀ヲ成シテ莖ヲ抱キ、上方ニテハ稍線狀披針形ヲ成ス。春時長キ頂生總狀花序ヲ成シテ多數白色ノ有梗小十字花ヲ開ク。萼片ハ長橢圓形ニシテ長サ1mm餘。花瓣ハ倒卵狀鐘形ニテ長サ2mm許。四強雄蕊、一雌蕊アリ。果實ハ倒三角形扁平ノ短角ニシテ先端少シク凹頭ヲ成シ長サ5mmアリ、細微ナル種子アリ。本種ニ二品アリ葉ノ裂片ニ耳片アル者ヲなづな (var. auriculata Makino) トシ、裂片長橢圓形ナル者ヲおほなづな (var. pinnata Makino) トス、然レドモ普通ニハ此兩品ヲ綜ベテなづなト呼ンデ可ナリ。本種ハ所謂春ノ七草ノ一ナリ。和名ハ撫菜 (なでな) ノ意ニテ愛 (メ) ツル菜ノ意ナル乎ト謂ヒ明解ナシ、ペンペン草ハ其果實三味線ノ撥ニ似タル故其音ヲ取テ斯ク云フ。

第 1541 圖

じふじばな科



こんろんさう

*Dentaria macrophylla Bunge*

var. *dasyloba Makino.*

(= *D. dasyloba Turcz.*; *Cardamine macrophylla Willd. forma dasyloba Korsh.*; *C. leucantha Schulz.*)

山地或ハ溪側ノ半陰地ニ生ズル多年生草本ニシテ地下莖ヲ引テ繁殖シ高サ60cm内外、全株短柔毛アリ。莖ハ單一瘦長ニシテ直立シ稍ニ分枝ス。葉ハ互生シ小葉五-七片ヲ有スル羽狀複葉ニシテ長柄アリ、長サ10-15cm許。小葉ハ長橢圓形或ハ廣披針形ニシテ先端鋭尖ヲ呈シ邊緣不齊ノ尖鋸齒アリテ長サ3-5cm、小葉柄ハ極メテ短ク或ハ全ク無シ。夏日枝端ニ頂生總狀花序ヲ成シ多數有梗ノ白色十字花ヲ着ケ初メ花穂短ク花々密開シ後チ花軸伸長ス。萼片ハ橢圓形ニシテ長サ3mm許、綠色ニシテ有毛。花瓣ハ倒卵形狭脚ニシテ萼片ノ倍長或ハ之レヨリ長シ。四強雄蕊、一雌蕊アリ。果實ハ長サ2cm許ノ長角ニシテ長キ果梗ヲ有シ稍開出ス。和名崑崙草ハ何故斯ク名ケシ乎不明ナリ。

第 1542 圖

じふじばな科



ひろばこんろんさう

一名 たでのうみこんろんさう

*Dentaria appendiculata Matsum.*


(= *Cardamine appendiculata*

*Franch. et. Sav.)*

中部ノ深山溪側ニ生ズル多年生草本ニシテ全草無毛柔質、高サ50cm内外、根莖ハ白色ニシテ匍匐ス。莖ハ直立シ疎ニ數葉ヲ互生ス。葉ハ長柄ヲ具ヘ奇數羽狀ニシテ長サ7cm内外、葉軸ノ兩側各二乃至三片アリ卵形或ハ卵狀橢圓形ニシテ兩端稍尖リ邊緣ニハ缺刻狀鋸齒アリテ葉軸ノ兩側ニ開出ス。葉柄ノ基部兩側ニ耳垂ヲ有シテ莖ヲ抱クノ特徴アリ。七月、莖頂ニ總狀花序ヲ成シテ有柄白色ノ十字花ヲ開キ花徑5mmアリ。萼片ハ狭卵形、綠色。花瓣ハ倒披針形、有花爪、中央ヨリ平開ス。雄蕊六、四強。雌蕊一。長角果ハ線形ニシテ小形ナリ。和名ハ闊葉崑崙草ニシテ其葉ヲこんろんさう葉ニ比スレバ多少短闊ナレバ云フ、蓼のうみ崑崙草ハ下野日光山中蓼の湖 (うみ)ニ於テ見出採集セシヨリノ稱ナレドモ此種ハ既ニ飯沼慾齋ノ草木圖説ニ出ヅ。

第 1543 圖

じふじばな科



みつばこんろんさう

*Dentaria corymbosa Matsum.*

(= *Cardamine anemonoides O. E. Schulz.*; *C. africana Maxim. non L.*)

山中樹陰ノ地ニ生ズル多年生小草本ニシテ高サ9-20cm許、全株無毛ナリ。地下莖ハ短小。莖ハ單一ニシテ分枝セズ、少數ノ有柄三出葉ヲ互生ス。小葉ハ卵狀披針形或ハ披針形ニシテ先端尖リ、葉緣ノ粗鋸齒ハ大小不同、時ニ深ク分裂ス、梢葉ハ分裂セザル者アリ、葉面ニハ微毛アリ。晩春ノ候、梢頭ニ短小ナル總狀花序ヲ成シテ少數大形ノ白色有梗ノ十字花ヲ着ク。萼片ハ長橢圓形ニシテ長サ5mmニ達ス。花瓣ハ鐘形、廣底ニシテ長サ萼片ノ二倍ニ達ス。四強雄蕊、一雌蕊アリ。花後先端細ク尖レル長角ヲ結び、其長サ3.5cmニ達シ直立ス。和名ハ三葉崑崙草ニシテ其葉三裂スルヨリ云フ。

第 1544 圖

じふじばな科



たねつけばな (蔞菜)

一名 たがらし

*Cardamine flexuosa Withering.*

(= *C. hirsuta L. var. sylvatica Gaud.*; *C. sylvatica Link.*)

普ク田間・水邊濕地ニ多ク生ズル越年生草本ニシテ高サ17-30cm許。莖ハ立チ多クハ基部并ニ下部ヨリ分枝シ、暗紫色或ハ綠色ニシテ纖弱ナリ。葉ハ互生シ通常疎毛ヲ帶ビ、頭大羽狀ニ分裂シ、小葉ハ圓形・卵形・長橢圓形等一定セズ、邊緣ハ全邊ニ波狀線或ハ鈍缺刻ヲ呈シ、下部ノ葉ハ長サ凡7cmニ達ス。四五月頃枝端ニ頂生總狀花序ヲ成シテ白色有梗ノ小十字花ヲ開ク。萼片ハ暗紫色ヲ帶ビ卵狀長橢圓形ニシテ長サ凡2mm。花瓣ハ倒卵形ニシテ底部狹窄シ萼片ノ約二倍長アリ。四強雄蕊、一雌蕊アリ。長角ハ細長ニシテ種子ノアル處僅ニ膨腫シ、斜上シテ2.3cm許ノ長アリ、熟スレバ開裂シテ二穀片反轉シ細種子ヲ彈飛ス。一品水傍ニ生ジテ葉ノ裂片稍長大、綠色柔軟ニシテ毛ナキ者ヲみつたねつけばな (var. *latifolia Makino*) ト云ヒ、又乾地ニ生ジテ莖直立シ葉小ニシテ瘦セ毛多キ者ヲたちたねつけばな (var. *fallax O. E. Schulz*) ト云フ。和名種實花ハ苗代ヲ作ル直前ニ米ノ粗種ヲ水ニ漬ス時分ニ盛ニ花サク故名ク、田芥ハ田間ニ生ズルからシノ意ナリ。漢名 碎米薺 (蓋シ誤用ナラン)

第 1545 圖

じふじばな科



みつたがらし

*Cardamine lyrata Bunge.*

野外ノ水邊ニ生ズル殆ド無毛ノ多年生水草ニシテ高サ30-60cm許、白鬚根多シ。莖ハ直立シテ粗長有稜綠色、稀ニ分枝ス。葉ハ互生シ頭大羽狀分裂、下部ノ者其長サ凡7cm許、小葉ハ圓形或ハ橢圓形ニシテ全緣或ハ僅ニ波狀ヲ呈ス。莖ノ基部ヨリ絲狀ノ匍枝ヲ出シテ長ク引キ、圓形ニシテ稍心臟底ノ葉ヲ互生シ往々其葉腋ヨリ白色ノ鬚根ヲ生ズ。四五月頃莖梢ニ頂生總狀花序ヲ成シテ白色大形ノ有梗十字花ヲ開ク。萼片ハ長橢圓形、綠色、長サ4mm許。花瓣ハ廣倒卵形、底部花爪ヲ成シ、長サ1cm許。四強雄蕊、一雌蕊アリ。花後線形ノ長角ヲ結び、斜上ス。種子ニ翼アリ。和名ハ水田芥ナリ、水ニ生ズル田芥ノ意ニシテ水田ニ生ズル芥ニハ非ズ。