

第 1630 圖



つづらふぢ科

かみえび (稱鉤風?、或ハ坂南根?)

一名 ちんちんかづら・びんびんかづら  
誤稱 あをつづらふぢ  
**Cocculus trilobus DC.**  
(=Menispermum trilobum Thunb.;  
C. Thunbergii DC.)

到處ノ山野ニ普通ニ見ル 落葉纏繞藤本ニシテ蔓ハ長ク伸ビ、下部ニ時ニ徑7mm許ニ達シ、枝蔓ハ瘦長ニシテ緑色ヲ呈シ細毛アリ。葉ハ長サ1-3cm許ノ葉柄ヲ有シテ互生シ卵形又ハ廣卵形ニシテ全縁、銳頭或ハ鈍頭、時ニ株ニ由テ三淺裂シ、表裏共ニ短毛ヲ布キ、長サ5-8cm許アリ。雌雄異株。夏月ニ於テ稍狭長ナル圓錐花序ヲ葉腋ニ出シ或ハ枝末ニ生ジ穂長3-9cm許アリテ多數ノ黃白色細花ヲ綴ル。萼花共ニ六片、各長橢圓形ニシテ二列生ヲ成ス。雄花ハ六雄蕊ヲ有シ、約ハ横裂ス。雌花ニハ六假雄蕊ヲ有シ更ニ中央ニ六心皮アリ、花柱ハ圓柱狀ニシテ柱頭分裂セズ。秋月漿果狀ノ球形核果ヲ結ビテ相集リ黒熟シテ果面白粉ヲ帯ビ徑5-8mm許アリ、核ハ扁蹄形ヲ成シ、背部ニハ小突起アリ。和名かみえびノかみハ神ナリト謂ハレシビハ蓋シえびづらノ事ニ其實ニ基キテノ名ナラン、ちんちんかづら及ビびんびんかづらハ多分共ニ其蔓ヲ緊シ引キ張り彈ゼバ音ヲ發スル故云フナラン。漢名 防己、木防己(共ニ誤用)

第 1631 圖



つづらふぢ科

いそやまあをき

一名 いそやまだけ・ごめごめじん  
誤稱 かうしうやく  
**Cocculus laurifolius DC.**

暖地ニ生ズル常綠灌木。幹ハ直立シテ多枝繁葉其高サ3m内外アリ、枝條ハ瘦長綠色ニシテ毛ナク平滑ニシテ縱稜アリ。葉ハ有柄互生シ披針狀長橢圓形ニシテ銳尖頭、全邊、長サ8-15cm、革質ニシテ光澤アリ三行脈顯著ニシテにくけい葉ニ彷彿シ裏面ハ網脈脈明カナリ。四月、葉腋ニ極メテ短キ圓錐花序ヲ着ク柑黃色ノ細花ヲ綴ル。萼ハ六片、卵圓形ニシテ内輪ノ三片ハ大ナリ。花瓣ハ極メテ小形ニシテ六片ヲ以テ一輪ヲ成シ、倒卵形。雌雄異株。雄花ニハ六雄蕊アリテ長サ稍萼長ニ等シ。雌花ニハ一心皮ト假雄蕊トアリ。核果ハ扁球形ニシテ黒熟ス。根及ビ幹ハ二次ノ形成層ニヨル特異ノ肥大生長ヲ成ス特性アリ。和名ハ磯山あをきノ意ナリ、其一名いそやまだけハ薩州ノ方言ニシテいそハ磯、やまだけハあをきを指シ畢竟磯山ニ生ズルあをきをノ意ナリ、故ニ今新名ヲいそやまあをきをトセリ、ごめごめじんハ其意不明、又かうしうやくハ衡州烏藥ナレドモ此衡州ニ産スル烏藥ハ烏藥即チ Lindera strychnifolia Vill. ニシテ敢テ本種ヲ衡州烏藥トハルハ非ナリ、而シテ本種ハ烏藥ト何等ノ關係無シ。

第 1632 圖



へびのぼらず科

なんてん (南天竹、一名南天燭)  
**Nandina domestica Thunb.**

本邦中部并ニ其以南ノ 暖地山林中ニハ自生スレド 普通ニハ裝飾植物トシテ家庭園ニ栽植セラルル常綠灌木。莖ハ叢生シテ直立シ通常單一ニシテ圓柱形ヲ成シ粗面ニシテ暗色ヲ呈シ材ハ黃色ナリ、梢ニハ通常枯死シテ遺存セル短葉柄ヲ着ク、高サ2m内外ヲ普通トシ大ナル者ハ稀ニ3m許ニ及ブ。葉ハ大形、葉柄ニ集リ着テ開出シ有柄互生ニシテ數回重複ノ羽狀複葉ヲ成シ、平滑革質ノ披針形銳尖頭全邊ノ多數小葉ヨリ成ル、小葉下并ニ柄本ニハ關節ヲ有シ、葉柄ノ基部ハ往々暗赤色ヲ呈シテ鞘ト成リ莖ヲ包擁ス。六月ノ候梢頂ニ大ナル圓錐花序ヲ立テ多ク分枝シテ多數ノ小白花ヲ開ク。萼片ハ多數相重リ、花瓣ハ六片アリ舟狀披針形ニシテ滑澤ナリ。雄蕊六アリテ黃色ノ葯ハ縱裂ス。一子房アリテ花柱ハ短ク柱頭ハ掌狀ヲ呈ス。秋冬ノ候多數球形ノ漿果ハ赤熟シテ美觀ヲ呈シ、時ニ白實ノしろなんてん一名しろみなんてん (var. leucocarpa Makino) 又稀ニ淡紫實ノふぢなんてん (var. porphyrocarpa Makino) アリ、果實ニ二種子ヲ藏ム。和名ハ南天燭或ハ南天竹ノ南天ヨリ出ヅ。漢名 南燭(誤用)、是レレシャんぼ(レシャクナゲ科)ノ漢名ナリ。

第 1633 圖



へびのぼらず科

るるえふぼたん  
**Caulophyllum thalictroides Michx.**  
**var. robustum Regel.**  
(=C. robustum Maxim.)

諸州ノ深山林下ニ生ズル無毛ノ多年生草本ニシテ根莖ハ横臥シ、舊莖ノ基部ヲ連ネ、其先端ヨリ一莖ヲ立ツ。莖ハ直立シテ基部ニ鱗片アリ、高サ40-50cm許アリ。葉ハ三三出複葉ニシテ互生シ莖上ニ二葉アリテ無柄或ハ短總柄ヲ具ヘ第一小柄ハ頗ル長ク第二小柄ハ極テ短シ、小葉ハ側者無柄、中者短柄アリテ卵形・長橢圓形或ハ廣披針形、長サ6cm許、全縁、時ニ二三裂シ、裏面稍白色ヲ呈シ質薄シ。初夏ノ候莖梢ニ圓錐花序ヲ成シテ徑7-8mm許ノ綠黃花ヲ開ク。萼六片ハ大ニシテ花瓣狀ヲ成シ其外側ニ三四ノ小苞ヲ伴フ。萼ト對生スル六花瓣ハ縮形シテ小腺様ト成ル。雄蕊六、葯ハ片裂ス。雌蕊ハ一、子房ハ一室二卵子。花後子房ハ早クモ其生長ヲ停止スルヲ以テ在中ノ卵子外ニ露出シ遂ニ成熟スレバ凡8mm著シキ種ヲ有スル球形ノ裸種子二顆ツツ相駢ビ双頭狀ヲ呈シ宛モ果實ノ如シ。和名ハ類葉牡丹ニシテ其葉略牡丹葉ノ態アリ故ニ云フ。

第 1634 圖

いかりさう  
一名 さんしくえふさう  
**Epimedium macranthum Morr. et Decne. var. violaceum Franch.**  
(=E. violaceum Morr. et Decne.)

丘岡或ハ山足地等ノ 樹下ニ生ズル多年生草本ニシテ根莖ハ横臥シ凹凸屈曲シテ質硬ク褐色ニシテ硬キ多鬚根ヲ有シ、數莖叢生スルヲ常トシ高サ15-25cm許アリ、基部ニ鱗片アリテ之ヲ護ス。根葉ハ長葉柄ヲ有シ長サ3-10cm、卵形銳尖頭ニテ刺毛緣狀細鋸齒アリ、底部心臟形ヲ成シ、側生小葉ハ稍左右不同形ヲ呈シ、莖葉ハ總葉柄短シ。四月、莖頂ニ總狀花序ヲ成シテ小梗アル淡紫色ノ數花ヲ着ケ下ニ向テ開ク。萼ハ八片アリテ花瓣狀ヲ成シ四片ヲ以テ内外ノ二輪ヲ成シ外輪片ハ卵狀披針形ニシテ早落シ、内輪片ハ大ニシテ卵狀長橢圓形銳頭ヲ成シ紅紫色ヲ呈ス。花瓣ハ四片アリ基部ハ白色圓形ニシテ内輪萼ヨリ短ク、著シキ長距ヲ有シ距長2cmニ達シ四方ニ斗出シテ前方ニ弓曲ス。四雄蕊アリテ葯ハ長形片ヲ以テ開綻シ其片遂ニ葯頭ニ轉縮ス。一雌蕊アリ。花後莖葉ヲ結ブ。和名ハ旋草或ハ旋草ニシテ其花錠ノ狀ヲ成スヲ以テ斯ク云フ、旋草ハ同義ナリ、三枝九葉草ハ其葉三枝(柄)ニ分レ一柄毎ニ三小葉ヲ有シ合セテ九葉アルヲ以テ云フ、然レドモ此三枝九葉草ノ漢名ハ真正ナル淫羊藿ノ一異名ナリ。漢名 淫羊藿(誤用)

へびのぼらず科

第 1635 圖

ばいくわいかりさう  
**Epimedium diphyllum Lodd.**  
(=Aceranthus diphyllum Morr. et Decne.)

暖地諸州ノ山地或ハ山足地等ニ生ズル多年生草本ニシテ高サ15-25cm許アリ。根莖ハ硬質ニシテ蟠居シ褐色ニシテ硬キ多鬚根ヲ發出シ頸部ニハ膜質鱗片アリ。根葉ハ長葉柄ヲ有シテ二回ニ又シ、各小葉ハ小柄ヲ具ヘ卵狀橢圓形、鈍頭、心臟底ヲ有シ稍斜形ヲ呈シ、全邊ニシテ唯底耳ノ葉緣ニ少數ノ刺毛ヲ具フルノミ。莖葉ハ二箇ノ小葉ヨリ成ル。四月、莖梢ニ一ノ總狀花序ヲ成シ、稍下垂シテ白色有梗ノ數花ヲ開キ花徑10-12mm許アリ。萼ハ八片アリテ内外二列ヲ成シ、外列片ハ膜質ニシテ橢圓形ヲ成シ早落シ、内列片ハ卵狀披針形ニシテ花瓣ト略同長ナリ。花瓣ハ四片アリ、倒卵形鈍頭ニシテ基部ニ距又ハ腺ヲ有セズ長サ6mm許。四雄蕊アリテ葯ハ長片ヲ以テ開ク。一雌蕊アリ。和名ハ梅花旋草ニシテ其花形ニ基キ斯ク云フ。

へびのぼらず科