

第 1636 圖

へびのぼらず科



**ぼざきいかりさう(淫羊藿)**  
*Epimedium sagittatum* Bak.  
 (= *E. sinense* Sieb.; *E. Ikariso* Regel;  
*Aceranthus sagittatus* Sieb. et Zucc.)  
 蓋シ天保年間頃ニ渡來セシ支那原産ノ常緑多年  
 生草本ニシテ偶ニ我邦ニ栽植セラレ、高サ30-  
 40cm許。根莖ハ硬質ニシテ硬キ多鬚根ヲ發出  
 ス。葉ハ質硬クシテ能ク冬ヲ凌グ。根葉ハ再三  
 出複葉ニシテ、小葉ハ卵狀披針形、心臟底又ハ  
 箭形ヲ成シ、時ニ稍歪形ヲ呈シ、刺毛縁ヲ有シ、  
 莖ノ上部ニ於テハ三出葉ニ或ハ三箇ヲ出シ柄アリ。  
 四月ノ候莖頂ノ葉心ヨリ一ノ圓錐花序ヲ立  
 テ多數ノ有梗小白花ヲ綴リ花徑6mm許アリ。萼  
 八片中、外列部四片ハ橢圓形ヲ成シ長サ4mm  
 許、内列部四片ハ白色ニシテ卵狀橢圓形ヲ成シ  
 鋭頭ニシテ花瓣ヨリ少シク短シ。花瓣四片ハ黃  
 色ニシテ蜜槽狀ヲ呈シ短キ距アリ。四雄蕊アリ  
 テ約ハ長片ヲ以テ開裂ス。一雌蕊アリテ子房ノ  
 花柱ハ長シ。此種近江ノ國ニ野生スト謂フハ誤  
 ナリ。和名ハ穗咲草ニシテ其細花穗ヲ成スヲ  
 以テ斯ク云フ。漢名ノ一者ヲ三枝九葉草ト云フ。

第 1637 圖

へびのぼらず科



**ひひらぎなんてん(十大功勞)**  
 一名 ひらぎなんてん・たうなんてん  
*Mahonia japonica* DC.  
 (= *Ilex japonica* Thunb.;  
*Berberis japonica* R. Br.)  
 天和貞享年間ニ渡來シ早クヨリ觀賞品トシテ庭園ニ  
 栽植セラレシ無毛ノ常緑灌木ニシテ元ト支那并ニ臺  
 灣ノ原産ナリ。幹ハ直立シテ疎ニ分枝シ皮質ノ粗皮  
 ヲ有シ材ハ黃色ナリ。葉ハ繖蓋ノ如ク枝頭ニ開出シ、  
 基部ノ者ヲ算入シテ五乃至八對ノ小葉ヨリ成ル奇數  
 羽狀複葉ニシテ、小葉ハ頂者ヲ除テ無柄、卵狀披針形  
 或ハ長橢圓狀披針形、下部ノ者卵形ニシテ葉頭ハ長披  
 針形ヲ成セル一尖齒ヲ形成シ、邊緣ニハ粗大齒牙ヲ具  
 ヘ齒端ハ刺尖ヲ成シ、革質ニシテ表面綠色光滑、裏面  
 ハ黃綠色ヲ呈ス。葉軸ハ有節、葉柄ハ短ク基部ハ鞘ヲ  
 成シテ莖ヲ擁ス。春早ク葉心ヨリ數條ノ花軸ヲ抽キ總  
 狀花序ヲ開出シテ稍下向シ黃色ノ有梗小花ヲ綴リ、穗  
 長13cm許アリ、花軸ハ瘦長硬質、小梗本ニ廣鏡形ノ  
 宿存苞アリ。萼ハ九片。花瓣六片ニシテ瓣端ニ裂シ基  
 部ニ二蜜腺アリ。六雄蕊アリテ約ハ片裂ス。一雌蕊ニ  
 シテ子房ハ一室ナリ。漿果ハ略球形ニシテ熟スレバ紫  
 黑色ヲ呈シ表面白粉ヲ被リ中ニ少數ノ種子アリ。和名  
 ハひひらぎ南天ノ意、なんてんニ類シテ其粗齒アル葉  
 ひひらぎ葉ノ如ケレバ云フ、唐南天ハ唐ヨリ渡リシ南  
 天ノ意ナリ。

第 1638 圖

へびのぼらず科



**ほそばひらぎなんてん(十大功勞)**  
*Mahonia fortunei* Fedde.  
 (= *Berberis fortunei* Lindl.)  
 明治初年渡來セル支那原産ノ無毛常緑灌木ニシ  
 テ庭園ニ栽植セラレ、高サ1-2m許アリ。幹ハ叢  
 生シ、瘦長ニシテ直立シ、材ハ黃色ナリ。葉ハ有  
 柄互生シ、奇數羽狀複葉ニシテ長サ12-25cm許、  
 葉柄ノ基部ハ鞘ヲ成シテ莖ヲ擁シ、小葉ハ無柄  
 ニシテ七乃至九片アリ側者ハ對生シ、狭長披針  
 形ニシテ鋭尖頭ヲ有シ邊緣ニハ低鋸齒ヲ具ヘ齒端  
 ハ針狀ヲ呈シ、革質ニシテ表面稍光澤ヲ帶ビ、  
 葉軸ニ節アリ。秋時莖梢ヨリ數條ノ總狀花序ヲ  
 出シ長サ凡6cm内外アリテ黃色ノ小花ヲ簇着シ  
 花下ニ短梗アリ。苞ハ小形ノ鱗片狀ニシテ長サ  
 1mm許。萼ハ九片。花瓣ハ六片ニシテ基部ニ蜜  
 腺アリ。六雄蕊ニシテ約ハ片裂ス。一雌蕊ニシ  
 テ子房ハ一室。漿果ハ藍黑色ヲ呈ス。和名ハ細  
 葉ひひらぎ南天ニシテ其葉狭長ナレバ云フ。漢名  
 ハひひらぎなんてんと同シ、是レ支那ニテハ此  
 十大功勞ハ其兩種ノ總稱ナラン。

めぎ

一名 ことりすわらず・よろひどほし  
**Berberis thunbergii** DC.  
 山地或ハ山原或ハ原野ニ生ズル落葉小灌木ニシテ高  
 サ凡2mニ達ス。幹ハ直立シテ繁ク分枝シ葉多クシ  
 テ密ニ叢ヲ成シ、枝條ニハ稜條ヲ有シ褐色ニシテ刺針  
 アリ。葉ハ小形ニシテ倒卵形或ハ狭倒卵形ヲ成シ下部  
 ハ楔形ヲ呈シ、全邊、長サ2-3cm許、葉裏淡綠色後チ住  
 ヲ帯白色ヲ呈シ、新枝ニハ互生スト雖モ短枝ニハ叢生  
 シ殆ド無柄ニシテ枝ト節合ス。葉下ニ葉ノ變形ナル單  
 一或ハ三岐セル刺針ヲ具ヘ、稚苗ノ葉ハ圓形ニシテ關  
 節アル鬚狀ノ長葉柄ヲ具フ。四月新葉ト共ニ小總狀花  
 序ヲ出シテ少數ノ黃花ヲ開キ下向ス。萼ハ六片アリテ  
 長橢圓形、淡綠色、微シク紅彩アリ。花瓣亦六片ニシテ  
 萼片ヨリ小サク長橢圓形ニシテ長サ2mm許アリ。六  
 雄蕊アリテ開花ノ時故ラニ偏レバ内曲運動ヲ起スノ  
 殊性アリ。葯ハ片裂ス。雌蕊ニハ一子房アリテ一室ナ  
 リ。漿果ハ長橢圓形ニシテ秋冬ニ紅熟ス。葉裏帶白色  
 ノ者ヲうらじろめぎト云ヘドモ其帶白ノ度一様ナラ  
 ズ往々不明ナルヲ以テ之レヲ獨立ノ變種トスルハ實  
 際ニ即セス、且此ノ如キ帶白ノ者ハ通常單ダ之レヲ老  
 葉ニ見ルノミ。和名ハ日本ノ意ニシテ此木ヲ煎シ洗眼  
 藥トスル故斯ク云フ、小鳥坐らずハ枝葉密且多刺ナル  
 小鳥モ坐リ止ムル能ハズト云フ、鋸通ハ其尖銳ナル  
 小刺ヲ此小刀ニ擬セシメナリ。漢名 小葉(蓋シ誤用)

第 1639 圖

へびのぼらず科



おほぼめぎ

一名 みやまへびのぼらず・  
 みやまめぎ・しこくめぎ  
**Berberis tschonoskiana** Regel.  
 (= *B. sikokiana* Yatabe.)  
 我邦南方諸州ノ山地ニ生ズル落葉小灌木ニシ  
 テ、概形めぎニ類スレドモ枝ハ疎ニ分レ圓柱形  
 ニシテ枝面ニ稜條ヲ缺キ通常無刺ナレドモ又往  
 ヲ多少ノ小刺ヲ見ル。葉ハ廣倒卵形全邊ニシテ  
 長サ3-7cm許、下部急ニ狹窄シテ短枝上ニ數葉  
 叢生ス。初夏ノ候短枝上ノ叢生葉中ヨリ總狀花  
 序ヲ出シ、小梗ハ黃色ノ數花ヲ開キ、花穂  
 多クハ葉ヨリ短ク、花軸并ニ小花梗ハ細長ナリ。  
 萼及ビ花瓣ハ共ニ六片。六雄蕊アリテ其約ハ上  
 方ニ反轉スル蓋片アル二約胞ヲ有ス。雌蕊ニ  
 一子房アリテ花柱ハ短シ。漿果ハ長橢圓形ニシテ  
 赤熟シ長サcm許アリ。和名ハ大葉日本ニシテ  
 本品めぎノ類ニテ其葉大ナレバ云フ、深山蛇上  
 らず、深山日本ハ文字ノ示ス如キ意ナリ、四國  
 日本ハ南海道ノ四國ニ生ズルめぎヲ意味セリ。

第 1640 圖

へびのぼらず科



へびのぼらず

一名 とりとまらず・こがねゑんじゅ  
**Berberis sieboldii** Miq.  
 東海中部ノ山野ニ生ズル無毛ノ落葉小灌木ニ  
 シテ高サ凡50-70cmアリ。幹ハ直立シテ分枝シ、  
 小枝ハ圓柱形ニシテ微ニ細稜條ヲ有シ暗灰色ヲ  
 呈シ、材ハ黃色ナリ。葉ハ長倒卵形又ハ倒披針  
 形ニシテ一尖針アル鈍頭ヲ有シ小刺毛縁ヲ成  
 シ、基部ハ楔狀ニ狹窄シ無柄或ハ短柄ト成リ枝  
 ト節合シ、上面綠色、下面ハ老ユレバ帶白色ヲ  
 呈ス、葉叢下部ニ三岐時ニ單一ナル刺針ヲ有ス。  
 初夏ノ候、短枝上ノ叢生葉中ヨリ略ガ繖形狀ヲ呈  
 セル總狀花序ヲ成シテ黃色ノ數小花ヲ開キ、穗  
 長凡3cmアリ。萼ハ六片アリテ廣倒卵形、鈍頭、  
 長サ約6mm。花瓣亦六片アリテ小ナリ。雄蕊ハ  
 六、約ハ二胞ニシテ各上方ニ反轉スル蓋片アリ  
 テ開裂ス。雌蕊ニハ一子房アリテ花柱ハ短シ、  
 漿果ハ略球形ニシテ赤熟シ徑6mm許アリ。和  
 名蛇上らずハ枝上ニ刺アリテ蛇モ能ク上リ得ズト  
 ノ意、鳥止らずモ亦同義ナリ、黄金槐ハ其花  
 黃金色ナルヨリ云フ。漢名 伏牛花(誤用)

第 1641 圖

へびのぼらず科

