

第 1642 圖

へびのぼらず科



ひろはへびのぼらず
一名 ひとりへびのぼらず
Berberis amurensis Rupr.

(=B. vulgaris L. var. japonica Regel.)
中部以北ノ山地ニ生ズル落葉灌木ニシテ高サ1-3m許アリ。幹ハ直立シテ密ニ分枝シ、枝ハ瘦長ニシテ稜角ヲ有シ灰色ヲ呈シテ毛ナク又三岐セル大形ノ鋭刺ヲ有シ此刺ハ元來葉ノ變形ナリ。葉ハ刺腋ニ出ヅル短枝上ニ簇生シ橢圓形或ハ倒卵狀披針形鈍頭ニシテ長サ3-5cm、下部ハ葉底ニ向テ楔狀ニ狹窄シ葉柄狀ヲ呈シ枝ト節合シ、葉縁ニハ鋭刺ヲ有スル細鋸齒ヲ連ネ、膜質ニシテ裏面脈絡網狀ニ隆起シテ顯著ナリ。初夏ノ候短枝端ニ多少一方ニ傾斜セル總狀花序ヲ着ク密集セル淡黄色ノ小花ヲ開キ、一穂十花内外アリ。萼六片アリ。花瓣モ亦六片ニシテ倒卵圓形ヲ成シ平開セズ、基部ニ二小隙アリ。雄蕊ハ六、葯ハ二胞ニシテ瓣開ス。漿果ハ橢圓形ヲ成シ長サ1cm許、霜雪到リ紅熟ス。和名ハ闊葉蛇上らサノ意ニシテ此種他ニ比スレバ其葉闊大ナルヲ以テ云フ。

第 1643 圖

へびのぼらず科




とがくしさう
一名 とがくししょうま
Ranzania japonica T. Ito.
(=Podophyllum japonicum T. Ito.)

中部北部ノ深山幽陰ニ生ズル多年生草本。地下ニハ匍匐セル多節ノ根莖アリテ其頂ヨリ莖ヲ抽出シテ直立シ高サ30cm内外、莖頂ニ二箇ノ三出葉アリ、花後葉伸長シ、小葉ハ圓形或ハ卵圓形ニシテ鈍頭深心臟底粗大ノ缺刻狀鋸齒アリ、膜質ニシテ無毛ナリ。五月頃ニ葉間ニ繖形ヲ成シテ長梗アル美ナル淡紫色ノ花ヲ開キ、花冠ニシテ花徑凡2-3cmアリ。萼ハ六片、卵狀披針形ニシテ花瓣様ヲ呈シ鈍頭稍波縁。花瓣ハ迢カニ小サク六片相集リテ鐘形ヲ形成シ雌雄蕊ヲ圍ム。六雄蕊アリテ葯ハ瓣開シ雄蕊ノ物ニ觸レシ瞬間ニ運動スルコトめぎニ同ジ。雌蕊ハ一子房アリ。秋ニ入テ卵狀橢圓形ノ漿果ヲ結ブ。學名ハ本邦有名ナル本草學者小野蘭山ノ名ヲ用キアレド元來本品ハ同氏ト何ノ因縁モ無シ、初メ Maximowicz 氏ニ由リ Yatabea japonica Maxim.ナル學名準備セラレシト雖モ此名ハ遂ニ公ニナラザリキ。和名ハ戸隠草并ニ戸隠升麻ノ意ニシテ此種初メ信州戸隠山ニ得タル故斯ク云フ。

第 1644 圖

へびのぼらず科



なんぶさう
Achlys japonica Maxim.
(=A. triphylla DC. var. japonica T. Ito.)

我邦東北部并ニ北海道ノ山地ニ生ズル多年生草本ニシテ地下ニ瘦長ナル根莖横走ス。葉ハ根莖ノ先端ヨリ出デ、瘦長ナル葉柄アリテ立チ高サ5-10cm、三小葉ヨリ成リ徑3-5cm、小葉ハ無柄平開シ、頂小葉ハ菱狀廣卵形、側小葉ハ歪卵形、共ニ上部ハ二三ノ波縁ヲ成シ通常缺刻狀ヲ呈ス。膜質ニシテ表面平坦ナリ。花序ハ根莖端ニ出デテ直立セル葉柄狀ノ瘦莖梢ニ穗狀ヲ成シ葉上ニ抽ク。夏時ニ開花シ、花ハ無柄ニシテ細小白色ヲ呈シ所謂裸花ニシテ萼片及ビ花瓣ヲ有セズ。雄蕊ハ九-十五、花絲筒形ヲ呈シ長短アリ。雌蕊ハ一ニシテ一心底ヨリ成ル。果實ハ膏莢ニシテ腎臟形ヲ呈シ長サ3-4mm、内ニ一種子アリ。和名ハ初メ之レヲ採集セル陸中盛岡方面一帯ヲ成セル南部ナル地名ニ基ツク。

さんかえふ

Diphylleia cymosa Michx.
var. Grayi Maxim.
(=D. Grayi Fr. Schm.)

深山樹下ノ地ニ生ズル多年生草本ニシテ根莖ハ横臥シ凹狀ヲ成セル舊莖ノ基部ヲ連ネ下ニ鬚根ヲ發出ス。莖ハ一株一本ニシテ直立シ高サ50cm内外アリ、全體短毛アルモ葉裏脈ニ沿ヒテ著シ。根葉ハ長柄ヲ有シ大ナル橢圓形ヲ呈セル廣腎形ヲ成シ二深裂ス。莖葉ハ二片或ハ時ニ三片アリテ其下部ノ葉ハ長柄ヲ具ヘ、橢圓形ヲ呈セル廣腎形ニシテ二深裂シ、葉縁ニ大小ノ齒牙ヲ成シ時ニハ深く裂入ス、上部ノ葉ハ殆ド無柄ニテ其形狀下部ノ葉ト同クシテ稍小サク深心臟底ヲ有ス。夏月莖頂ニ繖形様花序ヲ成シ白色ノ數花ヲ開ク。萼ハ六片アリテ早落ス。花瓣亦六片ニシテ廣倒卵形、長サ約1cm、六雄蕊アリテ葯ハ瓣開ス。雌蕊ハ一子房アリテ花柱短シ。漿果ハ球形ニシテ碧黒色ニ熟シ、數種子ヲ容ル。和名ハ漢名ノ山荷葉ニ基キシモノナレドモ元來此山荷葉ハ本種ノ名ニハ非ラズ。

む べ

一名 ときはあけび 古名 うべ・郁子(むべ)
Stauntonia hexaphylla Decne.

山地ニ生ジ又庭園ニ栽植セラルル常綠藤本ニシテ莖ハ長ク伸ビ時ニ徑凡6cmニ達ス。葉ハ互生シ長柄アリテ五乃至七小葉ヨリ成ル掌狀複葉ニシテ、小葉ハ橢圓形、全邊、平滑、革質、三主脈アリ、葉裏ハ淡色ヲ呈シ細脈甚ダ明ナリ。小葉柄ハ長サ3cm内外、下ノ葉柄ト節合シ上ノ葉面ト節合ス。種本ニテハ其葉往々三小葉ヨリ成ル。五月ノ候新葉ノ腋或ハ鱗片腋ヨリ總狀或ハ繖形様花序ヲ抽キ白色稍淡紅紫赤アル三-七花ヲ開ク。雌雄同株。花ニハ萼六片アリテ花瓣無シ。雄花ノ萼ハ其外列三片ハ廣披針形長サ13mm許、内列三片ハ線形ニシテ外者ヨリ稍長シ。雌花ノ萼ハ其外列三片ハ短シニシテ其線形ノ内列三片ハ披針形ノ外列三片ヨリ短シ。雄花ニハ六雄蕊ト雌蕊ノ痕跡トアリ。雌花ニハ三子房ト不實性雄蕊トアリ。果實ハ紫色ノ漿果ニシテ卵圓形ヲ成シ長サ5cm許、不開裂、果肉ハ白色ニシテ甘ク肉中ニ黒色ノ種子多シ。和名むべハおほむべノ略ナリ、住時此果實ヲ藥籠ニ容レ之レヲ朝廷ニ奉リシニヨリ大贊(おほむべ)即チ菖菖(おほむべ)ト云フ、此おほむべ變ジテらんべト成リ次デらんべト略セラレタリ、昔更ニ之レヲ郁子ト書キタリ是レ時經ニ在ル莫(莫ニシテニシテ)ヲむべト訓ゼシ事アルヲ以テむべニ同音ノ郁ノ字ヲ用キタルナリト謂フ、常磐あけびハあけびニ似テ其葉常綠ナルヨリ云フ。漢名野木瓜(誤用)


あけび(野木瓜)

一名 あけびかづら
Akebia quinata Decne.

普通ニ山野ニ見ル無毛ノ落葉纏繞灌木ニシテ莖莖長ク伸ビテ分枝シ大ナル者ハ莖徑1.5cm許アリ、枝ハ細長ニシテ褐色ナリ。葉ハ短柄アル五小葉ヨリ成ル掌狀複葉ニシテ長柄ヲ有シ、柄頂ハ小葉柄ト節合ス、小葉ハ狭長橢圓形或ハ長倒卵形、先端凹頭、全邊、長サ6cm内外アリ、新枝條ニ互生シ老莖ニ在テハ鱗片アル短枝ニ叢生ス。四月新葉ト共ニ開花シ短枝ノ葉間ニ有柄ノ短總狀花序ヲ出シテ下垂シ有柄ノ淡紫花ヲ着ク。雌雄同株ニシテ一花穂中ニ多數小形ノ雄花ト少數大形ノ雌花ト交ヘ生ジ通常花蕾ヲ缺ク。萼三片ハ卵圓形或ハ圓形、内凹、稍多肉質。雄花ニハ六雄蕊アリテ雌蕊ノ痕跡ヲ具フ。雌花ニハ粘性柱頭アル短圓柱形ノ三乃至六心皮アリテ不育雄蕊ヲ伴フ。漿果ハ長サ6cm内外アリテ強壯ナル果梗頂ニ一乃至四顆ヲ着ク橢圓形或ハ長橢圓形ニシテ果皮厚ク熟スレバ縦開シテ黒色種子ヲ含メル白色ノ果肉ヲ露ハス。果肉ハ味甘ク食フベシ。和名あけびハ實ハ其果實ノ名ニシテ其種ヲ呼ブトキハ宜シクあけびかづらト稱スベキナリ、あけびノ語原ハ種々ニ解釋セラレ其數實ハ一方縦開シテ白肉ヲ露ハスニ由リ開ケ實ハ欠ビ并ニ開ケつツナル三説アリ、又あけびハあけりノ短縮言ナラント謂フ人アリ、むべ實ハ開カザレドモあけび實ハ開ケバナリ。漢名 木通并ニ通草(共ニ誤用、本品ハ蓋シ Clematis 即チセんにんざら屬ノ者ナラン)

第 1645 圖

へびのぼらず科



第 1646 圖

あけび科



第 1647 圖

あけび科

