

第160圖



ひめひまはり

Helianthus debilis Nutt.

北米ノ原産ニシテ近年ノ舶來ニ係リ、觀賞ノ爲メ庭園ニ栽植ス。莖ハ高サ1-1.5m許ニシテ多ク分枝シ、葉ハ長柄ヲ有シ、稍心臟形ヲ成シテ先端尖リ、邊緣ニ粗齒ヲ具フ。莖葉共ニ短剛毛ヲ布キテ頗ル糙澁ナリ。夏秋ノ候枝梢上ニ徑6-9cm許ノ頭狀花ヲ開ク。舌狀花ハ鮮黃色ニシテ中部ノ管狀花ハ暗褐色ヲ呈ス。

第161圖



きくいも

Helianthus tuberosus L.

北米原産ノ多年生草本ニシテ原ト其塊莖ヲ採ル爲メニ栽エラレシガ今ハ時ニ人家ニ栽植シテ觀賞セラル。莖ハ高サ1.5-2.5mニ達シ、葉ト共ニ粗毛ヲ被リテ糙澁ス。葉ハ下部ノモノ對生、上部ノモノ互生シ、長橢圓形ニシテ尖リ、疎鋸齒ヲ有シ、大ナル三脈ヲ具フ。秋月梢ニ多枝ヲ分チ、徑8cm許ノ黃色頭狀花ヲ開ク。舌狀花ノ瓣ハ細長ナリ。地下ニ能ク塊莖ヲ生ジ、食用トスベキモ味佳ナラズ。和名ハ菊芋ノ意ナリ。

第162圖



おらんだせんいち

一名 はたうがらし
Spilanthes Acmella L.
var. *oleracea Clarke.*

東印度原産ノ一年生草本。莖ハ高サ30cm内外、多ク分枝ス。葉ハ對生シ、有柄ニシテ廣卵形ヲ成シ、邊緣鈍鋸齒ヲ具ヘ、暗紫綠色ヲ呈ス。夏日梢枝頂ニ球形或ハ橢圓形ノ紫褐色頭狀花ヲ生ズ。頭狀花ハ管狀花ノミヨリ成リ、毎小花舟形ノ長苞ヲ伴フ。瘦果ハ扁平ニシテ兩縁ニ毛ヲ有シ、冠毛ヲ缺キ、二刺ヲ具フ。其花黃色ノ者ヲきばなおらんだせんいちト稱ス。葉味辛ク、之レヲはたうがらしト稱シ食用ニ供スルコトアリ。和名ハ和蘭千日紅ノ意、千日紅ノ姿ニ似テ舶載品ナレバ斯ク謂ヒ、葉唐辛ハ葉ニ辛味アレバ云フ。

ねこのした

誤稱 はまぐるま

Wedelia prostrata Hemsl.

多年生ニシテ海邊ノ砂場ニ生ジ往々之レヲ覆フニ至ル。莖ハ長ク、砂上ニ匍ヒテ節ヨリ根ヲ下シ60cm内外、溝條アリテ分枝ス。葉ハ對生シ、卵形ニシテ疎鋸齒ヲ有シ、葉質厚シ。莖葉共ニ糙澁ス。夏日枝頭ニ黃色ノ頭狀花ヲ着ク。舌狀花ハ短クシテ廣ク、其數多カラズ。瘦果ニ冠毛ナク、每果幅闊キ穎苞ヲ伴ヘリ。和名猫ノ舌ハ其葉面粗糙ニシテ宛モ猫舌面ノ如ケレバ云フ。

第163圖



くまのぎく

一名 はまぐるま・しほかせ

Wedelia calendulacea Less.
(= *Verbesina calendulacea L.*)

暖地ノ瀕海濕潤ノ地ニ生ズル多年生草本。莖ハ綠色ヲ呈シテ細長、疎ニ分枝シテ延ビ下部伏臥シ上部昂起シテ縱横ニ蔓衍シ、全草甚ダ糙澁ナリ。葉ハ對生シ、披針形又ハ狹長橢圓形、先端ハ概ネ銳形、底部稍無柄ニシテ邊緣ニ疎低鋸齒アリ、三主脈ヲ有シ一見ねこのしたノ葉ニ似テ長シ。頭狀花ハ長梗ヲ以テ葉腋ヨリ單立シ、徑2-3cm許アリテ晩春初夏ノ候ニ開ク。總苞片ハ稍二列ヲ成シ、外片ハ大形草質ナレドモ内片ハ小形且ツ膜質ナリ。邊緣ノ舌狀花ハ七乃至十箇、黃色ニシテ雌性、舌狀瓣ハ先端嚙痕アリ。中心花ハ短小ニシテ兩性、黃色ナリ。瘦果ニハ冠毛ヲ缺ク。和名熊野菊ハ紀州熊野地方ニ生ズルヨリ云ヒ、濱車ハ其車咲ノ花ニ對シテ呼ビ、鹽風ハ鹽風ノ吹キ來ル海邊ニ生ズルヨリ云フ。

第164圖



おほはんごんさう

Rudbeckia laciniata L.

北米原産ノ長大ナル多年生草本ナリ。莖ハ高サ1.5-2m、上部ニ分枝ス。脚葉ハ柄ヲ有シ、羽狀ニ五乃至七裂シ、上部ノ葉ハ三乃至五深裂シ、最上ノ葉ハ全邊ナリ。秋時長梗頂ニ黃色ノ頭狀花ヲ着ケ、長ク下垂セル舌狀花ヲ有ス。觀賞品トシテ栽培ス。和名ハ大反魂草ノ意。八重咲ノモノ今世間ニ多シ、之レヲはながさぎく(花笠菊)ト呼ブ、即チ var. *hortensia Bailey* ナリ。

第165圖

