

第 1648 圖

あけび科



みつばあけび
Akebia trifoliata Koidz. (=Clematis trifoliata Thunb.; A. lobata Decne.)

山野ニ多キ落葉藤本ニシテ莖ハ卷絡シテ高ク上リ大ナル者直徑凡2cmアリ、莖本ヨリ發出スル匍枝ハ瘦長ニシテ遠ク地上ニ横走ス。葉ハ互生シテ長柄ヲ具ヘ三出複葉ニシテ小葉ハ葉柄頂ト節合スル小柄ヲ有シ卵形或ハ廣卵形ニシテ長サ4-6cmニ達シ、鈍頭、粗鈍齒アリテ小葉柄ト節合シ、新枝條ニ互生シ老莖上ノ短枝ニ叢生ス。四月短枝ノ葉中ヨリ長柄ヲ抽出シ上部ニ總狀花序ヲ成シテ多クノ暗紫花ヲ開ク。雌雄同株ノ單性花ニシテ花軸ノ先方ニハ短梗アル十數内外ノ小形雌花ヲ簇着シ、基部ニハ長梗ヲ有スル大形雌花一乃至三箇ヲ開ク。花瓣無ク萼ハ三片ニシテ雌花ノ者長サ2mm許、雌花ノ者長サ8mmニシテ圓形或ハ廣卵形ヲ呈ス。雄花ニハ六雄蕊、雌花ニハ粘性アル短柱形ノ四乃至六心皮アリ。漿果ハ長橢圓形ニシテ果皮厚ク、熟スレバ紫色ヲ呈シ、縱裂シテ黒色ノ種子ヲ含ム白色果肉ヲ露出ス。果肉ハ甘クシテ食用トナリ、蔓ハばすけつと等ヲ造ルニ用ケラル。えぞのみつばあけび一名まるばみつばあけび (var. clematifolia Nakai = A. clematifolia Sieb. et Zucc.) 并ニ var. quercifolia (=A. quercifolia Sieb. et Zucc.) ハ單ニ勢力アル氣條的蔓上ノ葉ニ基キ命名セシモノニシテ敢テ變種或ハ異品ト爲スニ足ラズ。和名ハ三葉あけびニシテ葉柄上ニ三小葉アルヲ以テ斯克云フ。

第 1649 圖

きつねのぼたん科



せんになさう
Clematis paniculata Thunb.
(=C. recta L. var. paniculata O. Kuntze.)

山野路傍等向陽ノ地ニ生ズル多年生攀緣草本。莖ハ長ク延ビテ疎ニ分枝シ大ナル者ハ徑7mm許、枝ハ圓柱形ニシテ綠色ヲ呈シ葉ト共ニ無毛ナリ。葉ハ有柄ニシテ對生シ、奇數羽狀葉ニシテ三乃至七小葉ヲ有シ、互ニ隔離シテ疎ナリ。小葉ハハ卵形或ハ長卵形、全邊ニシテ長サ3-5cm許、葉柄ハ卷曲シテ能ク他物ニ纏絡ス。夏末初秋ノ候、莖頂又ハ葉腋ニ聚繖花序ヲ成シテ多數ノ白色花ヲ攢簇シ花徑2.5-3cmアリ。四萼片ハ十字形ニ平開シ線狀長橢圓形ヲ成シ花瓣狀ヲ呈ス。花瓣ハ無シ。雄蕊ハ多數ニシテ萼片ヨリ短ク、花絲ハ絲狀、約ハ狹シ。雌蕊亦多ク子房ハ狹長ニシテ花柱ニ細毛アリ。瘦果ハ平扁ナル倒卵形ニシテ柑色ヲ呈シ、延長セル花柱ハ白色ノ羽毛狀ヲ成シ長サ3cm許。有毒植物ナリ。和名ハ仙人掌ノ意ナレドモ今其解ヲ得ズ。漢名 大蓼(誤用)

第 1650 圖

きつねのぼたん科



ぼたんづる
Clematis apiifolia DC.

普通ニ向陽ノ山地或ハ原野ニ見ル落葉攀緣藤本ニシテ莖ハ長ク伸テ疎ニ分枝シ、其大ナル者ハ徑1.5cm許アリテ莖面稍縱溝ヲ呈シ淡褐色ノ皮ハ剝離シ易ク枝ハ瘦長ニシテ綠色ヲ呈シ往々暗紫色ヲ帶ブ。葉ハ有柄ニシテ對生シ單三出複葉ヲ成シ全體微シク短毛ヲ帶ビ、小葉ハ小柄ヲ具ヘテ卵形ニシテ短キ鋭尖頭ヲ成シ基部ハ圓形ニシテ邊緣ニ少數ノ缺刻粗齒ヲ有シ、長サ3-6cm許アリ、葉質稍厚シ。夏時莖梢或ハ枝上ノ葉腋ニ有柄ナル聚繖花的ノ短キ圓錐花序ヲ成シテ多數乳白色ノ小花ヲ攢簇ス。花徑1.5-2cm許アリ之レヲせんになさう花ニ比スレバ稍小ナリ。四萼片ハ十字形ヲ呈シ平開シ、長橢圓形ニシテ外面ニ白色短毛ヲ布ク。無花瓣。雄蕊ハ多數アリテ萼ヨリ稍短ク、花絲ハ扁平ナリ。多雌蕊アリ。瘦果ハ狹卵形ヲ成シ、宿存セル花柱ハ延長シテ長サ1cm許ニ達シ羽毛狀ヲ呈ス。和名牡丹蔓ハ其葉牡丹葉ノ態アリ且蔓本ナレバ斯克云フ。漢名 女萎(誤用)

こぼたんづる

Clematis brevicaudata DC.
(=C. Vitalba L. var. brevicaudata O. Kuntze.)

關東諸國ノ山野ニ生ズル落葉攀緣藤本。莖ハ強靱ニシテ皮ハ縱ニ裂ケ易ク、枝ハ瘦長ニシテ往々暗紫色ヲ呈ス。葉ハ長柄ヲ有シテ對生シ再三出複葉ヲ成シ、小葉ハ長橢圓狀披針形ノ者多ク、長サ2-4cm、鋭頭、銳底或ハ稍鈍底、其上半部ニハ疎且大ナル銳鋸齒アリ、乾ケバ洋紙質ヲ呈シ、生時ハ表面暗綠色ニシテ裏面淡色毛茸少ナシ。夏秋ノ候、葉腋ニ有柄ノ短キ圓錐狀聚繖花序ヲ出シテ多數ニ白色ノ小花ヲ攢簇シ開キ、花徑1.5cm許アリ。萼ハ四片ニシテ十字形ニ平開ス。花瓣ヲ缺如ス。多數ノ雄蕊アリテ萼ヨリ短シ。雌蕊多數。莢ニハ花柱宿存シテ羽狀ノ長尾ヲ曳クコトぼたんづるニ於ケルガ如シ。本種ハ瘦形ぼたんづるニ似タリト雖モ其葉ハ再三出ナルヲ以テ容易ニ識別シ得ベシ。和名小牡丹蔓ハぼたんづるニ似テ其葉瘦小ナレバ云フ。

第 1651 圖

きつねのぼたん科



めぼたんづる

一名 こぼのぼたんづる
Clematis Pierotii Miq.

(=C. parviloba Gard. et Champ. var. Pierotii O. Kuntze.)

四國九州琉球等ノ山地ニ生ジ、全株短毛ヲ有スル多年生攀緣草本ニシテ莖ハ長ク伸ビ瘦長ナリ。葉ハ有柄ニシテ對生シ、單三出或ハ再三出複葉ヲ成シ、小葉ハ狹卵形又ハ長橢圓形ニシテ先端尖リ二三ノ裂片ヲ有シ更ニ粗鋸齒ヲ呈ス。秋月枝梢或ハ葉腋ヨリ有柄ノ聚繖花序ヲ出シ通常葉ヨリ稍超出シテ一乃至三ノ白花ヲ開キ花徑凡3-4cm許アリ、花蕊ニハ對生セル葉狀苞ヲ具フ。萼ハ四片、十字狀ニ平開シ長橢圓形ヲ成シテ外面ニ短毛アリ。花瓣無シ。雄蕊多數アリテ萼片ヨリ短ク、藥ハ短クシテ花絲ハ扁平ナリ。雌蕊亦多數アリ。瘦果ハ卵形ヲ成シ短毛ヲ被フリ、宿存セル花柱ハ尾狀ヲ成シテ延長シ羽毛狀ヲ呈シ長サ15mm許アリ。和名ハ女牡丹蔓ノ意ニシテ此レヨリハ壯姿ヲ呈スルぼたんづるニ對シ此名ヲ附セシナリ、又小葉の牡丹蔓ハ其葉之レヲぼたんづるニ比スルニ頗ル小形ナレバ斯克云フ。

第 1652 圖

きつねのぼたん科



はんしょうづる

Clematis japonica Thunb. (non Houtt.)
(=C. ternata Makino.)

諸州山地ノ林叢中ニ見ル落葉攀緣藤本ニシテ莖ハ瘦長ニシテ往々暗紫色ヲ帶ブ。葉ハ有柄ニシテ對生シ、三小葉複葉ヲ成ス。小葉ハ極メテ短キ小柄ヲ有シ或ハ殆ド無柄ニシテ卵形又ハ橢圓形ヲ成シ短鋭尖頭ヲ有シテ粗鋸齒アリ、長サ凡4-9cm、葉質稍硬クシテ表裏共ニ短毛ヲ布ク。初夏ノ候枝上ニ叢生セル葉間ヨリ長柄ヲ抽キ其中央部ニ小苞ヲ具ヘ先端ニ紅紫色ノ一花ヲ開キ花體鐘形ニシテ下垂シ全端ニ長サ2.5cm許アリ。萼ハ四片アリテ長橢圓形ヲ成シ白縁アリ、外面ノ邊緣ハ毛茸稍密生ス。花瓣無シ。雄蕊多數アリテ藥ハ短小、花絲ハ稍扁平ニシテ白色短毛アリ。多雌蕊アリ。瘦果ハ狹卵形ヲ呈シ頭部ニ宿存セル一花柱ヲ着ケテ尾狀ト成リ白色羽毛狀ヲ呈シテ其長サ4cm許アリ。和名ハ半鐘蔓ニシテ其花吊下セル半鐘ノ形ニ似タレバ云フ。

第 1653 圖

きつねのぼたん科

