

第 1654 圖

きつねのぼたん科



みやまはんしょうづる  
*Clematis alpina* Mill. var.  
*ochotensis* Regel et Tiling.  
(= *C. ochotensis* Poir.;

*Atragene ochotensis* Pall.)

我邦中部北部に高山に生ズル落葉攀緣藤本ニシテ莖ハ瘦長ナリ。葉ハ有柄ニシテ對生シ再三出複葉ヲ成シ各三出葉ニハ柄アリ、小葉ハ卵形又ハ卵狀披針形ヲ成シ葉質薄ク粗鋸齒ヲ有ス。七八月ノ候長花梗ヲ葉叢中ヨリ抽キ、梗頂ニ大ナル濃紫色ノ一美花ヲ下垂シテ開キ、花ハ鐘狀ニシテ半開ニ止マル。萼ハ四片ニシテ狹卵形鋭尖頭、長サ 2.5cm 許アリ。花瓣無シ。雄蕊ハ多數ニシテ約ハ小形、花絲ハ扁平、外部ノ者ハ無葯ニシテ筒形ヲ呈シ大ナル者ハ幅 3mm ニ達ス。多雌蕊アリ。瘦果ハ廣卵形ヲ成シ、宿存セル花柱ハ長ク延ビテ尾狀ト成リ長サ 2.5cm ニ達シ稍褐色ヲ帶ビタル羽毛狀ヲ呈ス。和名ハ深山半鐘蔓ノ意ニシテ深山ニ生ジ花形略ボ半鐘ノ如ケレバ云フ。

第 1655 圖

きつねのぼたん科



くろばなはんしょうづる

一名 えぞはんしょうづる

*Clematis fusca* Turcz.

我邦ニテハ北海道ニ産スル落葉攀緣藤本。莖ハ蔓ヲ成シ木質ニシテ枝條ハ草質ナリ。葉ハ有柄ニシテ對生シ、單羽狀ヲ成セル複葉ニシテ疎ニ二乃至四對ノ小葉ヲ具ヘ、小葉ハ極メテ短キ小柄ヲ具ヘ卵形或ハ卵狀披針形ヲ成シ鈍頭全邊ニシテ時ニ二三深裂シ、葉裏脈ニ沿テ短毛アリ。夏時葉腋ニ葉ヨリ短キ花梗ヲ抽テ先端ニ暗紫色ノ一花ヲ着ケ鐘狀ヲ呈シテ正開セズ。梗ノ中央ニ苞片對生ス。萼ハ四片アリテ萼片ハ卵形ヲ成シ長サ 1.7cm 許、花梗ト共ニ暗褐色ノ毛茸ニ被ハル。花瓣無シ。雄蕊ハ多數アリテ葯稍長ク、花絲ハ稍扁平ニテ上部ニ白毛ヲ有ス。雌蕊亦多數アリ。瘦果ハ橢圓形ニシテ細毛ヲ有シ、宿存セル花柱ハ延長シテ羽毛狀ヲ呈シ稍褐色ヲ帶ビ、長サ 3cm ニ達ス。和名ハ黒花半鐘蔓ニシテ其花黒褐色ナレバ云ヒ、蝦夷半鐘蔓ハ北海道ニ産スレバ云フ。

第 1656 圖

きつねのぼたん科



くさぼたん  
*Clematis stans* Sieb. et Zucc.

(= *C. heracleifolia* DC.)

var. *stans* O. Kuntze.)

山地ニ生ズル落葉灌木。莖ハ木質ニシテ直立シ高サ 1m 許ニ達シ大ナル幹ハ稀ニ 1.5cm ノ徑アリテ全株毛茸ヲ帶フ。葉ハ長柄ヲ有シ對生シ三出複葉ニシテ質硬ク葉脈裏面ニ隆起ス、小葉ハ廣卵形ニシテ長サ 4-10cm 許、先端尖リ往々二三分裂ヲ成シ邊緣ニ粗鋸齒ヲ具フ。秋月莖頂及葉腋ニ短キ聚繖花序ヲ相集テ圓錐花穂ヲ形成シ多數ノ美ナル紫花ヲ着ケテ下向シ鐘狀ニ開キ下部ハ筒狀ヲ呈シ上端ハ外方ニ反轉ス。萼ハ四片アリテ廣線形、長サ 1cm 内外ニシテ外面ニ白色絹毛ヲ被リ、内面ハ紫色ナリ。雌雄異株ニシテ雌花ハ雄花ヨリ稍小ナリ、雄蕊多數アリ、雌花ニ在テ葯細小、花絲ハ稍扁平ニシテ短毛アリ。雌蕊多數アレドモ雄花ノ者ハ不孕ナリ。瘦果ハ卵形ヲ成シ宿存セル頂端ノ花柱ハ長サ 1.5cm 許アリテ羽毛狀ヲ成シ宛モ尾ノ如シ。和名ハ草牡丹ノ意、牡丹ハ其葉狀ニ基ク、本種ハ元來灌木ナレドモ其概觀宛モ草本ノ如ケレバ草ト云ヘリ。

てっせん (鐵線蓮)

*Clematis florida* Thunb.

(= *Anemone japonica* Houtt.)

舊ク寛文年間ニ渡來セル支那原産ノ落葉攀緣藤本ニシテ觀賞花トシテ人家ノ庭園ニ栽植ス。莖ハ瘦長ニシテ質硬ク冬ヲ凌ゲ枯レズ、全體ニ短毛疎布セリ。葉ハ有柄ニシテ對生シ單三出或ハ再三出複葉ヲ成シ、葉柄ハ能ク他物ニ卷絡ス。小葉ハ卵形或ハ卵狀披針形ニシテ全邊或ハ二三缺刻アリ。五六月ノ候、葉腋ニ長梗ヲ出シ中央ヨリ下リテ廣卵形ノ二苞ヲ對生シ、梗端ニ白色大形ノ一花ヲ開キ花徑 6-8cm 許アリ。萼ハ六片アリテ平開シ、花瓣様ヲ呈シ、各萼片ハ卵形鋭頭、邊緣ハ多少波狀ヲ呈シ中央ニ三主脈縱通シ外方ニ斜走セル支脈多ク、外面ハ中央脈ニ沿テ稍紫色ヲ帶ビ短毛ヲ帶フ。花瓣無シ。雄蕊ハ多數、通常變形シテ其花絲扁平ニ擴大シ暗紫色ヲ呈ス。雌蕊亦多數アリ。花後普通品ニハ結實セズ、然レドモ其雄蕊變形セズ正形ノ者アレバ始メテ結實ヲ見シ。和名ハ鐵線蓮ニシテ其漢名ナル鐵線蓮ノ鐵線ニ基ク、即チ其蔓強クシテはりがねノ如ケレバ斯ク云フ。

第 1657 圖

きつねのぼたん科



かざぐるま (轉子蓮)

*Clematis patens* Morr. et Decne.

通常人家ノ庭園ニ栽植スル落葉攀緣藤本ニシテてっせんニ類似セル蔓莖ハ瘦長ニシテ褐色ヲ呈シ長ク伸ブ。葉ハ長柄ヲ有シ對生シ通常單三出葉或ハ時ニ再三出葉ヲ出シ、小葉ハ卵形或ハ狹卵形ニシテ先端鋭頭、底部圓形或ハ稍心臟形、全邊、長サ 2-6cm 許、表裏脈ニ沿テ細毛アリ。葉柄ハ長ク、他物ニ卷絡スル性アリ。五月、枝端ニ一花梗ヲ出シテ梗端ニ一美花ヲ開キ花徑 10cm 内外アリテ花色ハ通常紫色ナレドモ又淡紫色紅紫色等ノ異品アリ。萼ハ通常八片アリテ車輪狀ニ平開シ、各片長橢圓ニシテ先端鋭尖頭ヲ成ス。無花瓣、雄蕊多數アリテ葯ハ細長ニシテ紫色ヲ呈シ花絲ハ白色ニシテ扁平ナリ。雌蕊モ亦多數。瘦果ハ頭狀ニ相集リ卵形ニシテ宿存セル花柱ハ褐色ノ毛多クレドモ羽毛狀ヲ成サズシテ短シ。今日人家ニ培養セルル品ハ多分往時てっせんト同ジク之レヲ支那ヨリ傳ヘシ者ナラント思惟ス、而シテ本邦諸州ニ見ル野生品即チ帶紫淡白色ノのかざぐるまハ蓋シ從來ノ園藝品トハ何等關與スル所ナキ者ト信ズ。和名ハ風車ニシテ其花狀玩具ノ風車ニ似タル故云フ。

第 1658 圖

きつねのぼたん科



ふくじゅさう

一名 ぐわんじつさう

*Adonis amurensis* Regel et Radd.

邦内一般ニ野生ス、然レドモ中部以南ノ地ニハ之レヲ見ルコト稀ナレドモ北地ニハ多ク産スル質軟カキ多年生草本ニシテ普通ニ花草トシテ愛植セラル。根莖ハ短クシテ稍肥厚シ多數ノ暗褐色鬚根ヲ叢出ス。莖ハ直立シ緑色ニシテ葉ト共ニ毛ナク下部ニハ數輪片アリテ之レヲ擁シ高サ 15-25cm ニ達ス。葉ハ互生シテ長柄ヲ有シ三回羽狀裂葉ヲ成シ、小裂片ハ卵形或ハ長卵形ニシテ羽狀深裂シ、深裂片ハ更ニ鋭尖頭アル線狀披針形裂片ト成リ、柄本ニハ裁裂セル小形葉ヲ對生シ、莖本ノ葉ハ變ジテ大形ノ鞘鱗片ヲ成ス。二月ニ至テ新葉ト共ニ莖頂ニ黄色ノ一美花ヲ着ケ日光ヲ受ケレバ天ニ朝フテ正開シ花徑 3cm 許アリ。瘦苗ニテハ一花、肥苗ニテハ分枝シ數花ヲ着ケ。萼ハ數片アリテ暗緑紫色ヲ帶フ。花瓣ハ多數アリテ瘦狭長橢圓形ヲ成シ上縁微齒ヲ有シ光澤アリ。黄色ノ多雄蕊アリ。雌蕊亦多數、子房ハ短小綠色ニシテ有毛、稍長キ花柱アリテ柱頭ハ微シク放大ス。瘦果ハ頭狀ニ相集リ略ボ球形ニシテ細毛アリ。和名ハ福壽草ノ意、歐陸花草トシテ元日ニ用ウルヲ以テ之レヲ祝福シ此佳名ヲ附セシモノナリ。漢名 側金盞花・歐葶藶・雪蓮花(共ニ誤用)

第 1659 圖

きつねのぼたん科

