

第 1678 圖

きつねのぼたん科



あづまいちげ

一名 うらべにいちげ(同名アリ)

Anemone Raddeana Regel.

中部並ニ北部ノ山地樹下ニ生ズル多年生草本。根莖ハ横走シテ粗大ナラズ、先端ニハ鱗片アリ。根生葉ハ花後伸長シ、長柄ヲ具ヘ長サ10-15cmニ達シ再三出葉ニシテ小葉ハ有柄倒卵形楔底、更ニ三尖裂シ最終裂片ハ鈍頭、蒼綠色ヲ呈シ全ク平滑無毛ナリ。早春葉ヨリ高ク直立セル一莖ヲ抽キ、莖頂ニ三片ノ葉狀苞ヲ着ケ、有柄ニシテ平開シ三全裂シテ裂片ハ橢圓狀倒卵形ヲ成シ鈍頭、形質根生葉ト相等シ。苞葉ノ中心ヨリ直立セル一梗ヲ抽キ、梗末ニ一花ヲ着ケ日光ヲ受ケテ平開ス。花ハ初メ點頭シ後チ天ニ朝ヒ、花徑2-3cm許アリ。萼ハ花瓣様ヲ呈シ十片内外アリ、狹長長橢圓形ニシテ白色ヲ呈シ外面ニ微紫采アリ。花瓣無シ。雄蕊多數ニシテ黄色。雌蕊多數、瘦卵形ヲ成セル子房ニハ細毛アリ。和名ハ東いちげノ意ニシテ關東地ニ見ルヲ以テ名トセリ。

第 1679 圖

きつねのぼたん科



ゆきわりいちげ

一名 るりいちげ(同名アリ)

Anemone Keiskeana Ito.

關西諸州ノ竹林中或ハ山足ノ林下地等ニ群ヲ成シテ生ズル質軟カキ多年生草本ニシテ十一月ニ既ニ新葉ヲ萌出シ冬ヲ凌ギテ春ニ發ル。根莖ハ地中ニ横臥シ多肉ニシテ紫采ヲ有シ鬚根ヲ發出ス。葉ハ根生シ長柄アリテ立ち、平開スル無柄ノ三小葉ヨリ成リテ概形三角形ノ外縁ヲ有シ、小葉亦三角狀卵形或ハ菱形ヲ呈シテ鈍頭ヲ有シ不齊ノ鈍鋸齒アリテ葉底ハ全邊、其中央小葉ハ廣楔形ヲ呈シ側生小葉ハ歪形ヲ呈シ、上面ハ緑地ニ褐紫斑アリ、下面ハ紫色ヲ呈シテ美ナリ、草質ニシテ葉柄ト共ニ無毛ナリ。早春葉ヨリモ高ク一莖ヲ抽クコト凡10cm内外、莖頂ニ葉狀苞ヲ有シ、苞ハ三片ヨリ成リ無柄ニシテ卵狀披針形ヲ呈シテ二三ノ缺刻アリ。苞ノ中心ヨリ細毛アル一花梗ヲ直立シ、梗頂ニ一花ヲ着ケ日光ヲ受ケテ正開シ上部稍白色下部淡紫色ヲ帶ブ。萼ハ十五片内外ニシテ線狀橢圓形ヲ成シ宛モきくざきいちりんさうノ觀ヲ呈ス。花瓣無シ。雄蕊多數ニシテ長短アリ、黄色。雌蕊亦多數、子房ハ瘦卵形ナリ。和名ハ雪割いちげニシテ雪中既ニ其苗萌出スルヨリ云フ。瑠璃いちげハ其花色ニ基キシ稱ナレドモきくざきいちりんさうニモ亦此名アリ。

第 1680 圖

きつねのぼたん科



ふたまたいちげ

一名 あうしきな

Anemone dichotoma L.

(=A. dichotoma L.

var. japonica Huth.)

北海道並ニ樺太ニ生ズル多年生草本ニシテ全株細毛ヲ布ク。莖ハ直立シ、高サ凡50cm内外、上部又狀ニ分枝ス。根葉ハ三深裂シ、裂片ハ二或ハ三深、小裂片ハ缺刻齒アリ。莖葉ハ無柄ニシテ對生シテ抱莖シ、三深裂シ裂片ハ線狀長橢圓形ヲ成シ上部ハ缺刻狀齒牙縁ヲ有シテ先端ハ鈍頭ヲ成ス。上葉モ亦同様ニシテ小形ナリ。夏月又狀枝ノ中間即チ對生セル苞葉ノ中心ヨリ直立セル一長梗ヲ抽キ、梗頂ニ一輪ノ白花ヲ開キ、花徑2.5cm許アリ。萼ハ五片、稀ニ四片或ハ六片ニシテ花瓣様ヲ成シ廣倒卵形ニシテ鈍頭ヲ有ス。花瓣無シ。雄蕊ハ多數ニシテ黄色。多雌蕊ニシテ子房ハ微毛ヲ生ズ。瘦果ハ相集リ平扁ニシテ細毛アリ。和名ハ二又いちげニシテ其枝又狀ヲ呈スルヨリ云フ、あうしきなハ蓋シあいぬ語ナラン。漢名 草玉梅(誤用)

はくさんいちげ

Anemone narcissiflora L.

中部北部ノ高山ニ生ズル多年生草本ニシテ全株綠色ヲ呈シ且粗毛茸ヲ生ジ、花時高サ15-20cm許アリ。株ハ太クシテ下ニ鬚根ヲ發出シ周圍ニ舊葉柄ノ殘纖維ヲ伴ヒ長柄アル根生葉ヲ叢生ス。葉ハ掌狀ニシテ三乃至五出ヲ成シ、裂片ハ無柄ニシテ二三ニ分裂シ、小裂片ハ更ニ分裂シテ線狀ヲ成シ鈍頭或ハ稍鈍頭ノ細裂片ト成ル。花莖頂ノ總苞葉ハ無柄ニシテ三片アリ、根生葉ノ小葉ト同ジク三裂ス。夏月總苞葉ノ中心ヨリ線形狀ヲ成シテ數條ノ短花梗ヲ抽キ、梗頂ニ各一白花ヲ開キ花徑2cm許アリ。萼ハ花瓣様ヲ呈シ五片アリテ卵形。花瓣無シ。雄蕊多數ニシテ黄色。雌蕊亦多數。花後花梗ハ伸長シテ往々30cm許ニ達シ、梗端ニ曲鈎ヲ有スル扁平橢圓形ノ綠色或ハ暗色瘦果ヲ密着ス。和名ハ白山いちげニシテ初メ加賀ノ白山ノ品ヲ見テ名ケシ者ナリ。

第 1681 圖

きつねのぼたん科



ひめいちげさう


一名 ひめいちげ

Anemone debilis Fisch.

山地ニ生ズル多年生小草本ニシテ高サ6-10cm許。根莖ハ短クシテ地中ニ横臥ス。莖ハ直立シテ纖細ナリ。葉ハ根生シテ纖細ナル葉柄ヲ有シ三出ニシテ廣卵形ヲ呈シ不齊鋸齒アリ。葉狀總苞ハ三片アリテ莖頂ニ輪生シ各短柄アリテ三出ヲ成シ各時小葉ハ披針形ニシテ通常粗鋸齒ヲ有シ時ニ全邊ナリ。五六月ノ候總苞ノ中心ヨリ直立セル一花梗ヲ抽クコト2cm許、梗端ニ白色ノ一小花ヲ開ク。萼ハ花瓣様ヲ成シテ五片アリ、長橢圓形ニシテ長サ7mm許。花瓣無シ。雄蕊多數ニシテ黄色。雌蕊亦多數ニシテ子房ハ短毛密生ス。花後果亦多球狀ヲ呈シ、瘦果ハ長橢圓形ヲ呈シ先端尖リテ短嘴ヲ成ス。和名ハ姫いちげ草ニシテ全草小形ナルヲ以テ斯ク云フ。

第 1682 圖

きつねのぼたん科



第 1683 圖

きつねのぼたん科

えぞいちげ

一名 ひろはひめいちげ

Anemone yezoensis Koidz.

北海道ニ生ズル多年生草本ニシテ高サ凡12cm内外アリテ毛ヲ帶ブ。根莖ハ瘦長ニシテ地中ニ横走ス。根葉ハ再三出ヲ成シ各小葉ハ葉柄ヲ有シテ三全裂シ、裂片ハ廣披針形ニシテ粗鋸齒アリ、中央片ハ底部楔形、側生片ハ不齊鈍底ヲ有シ、全體ニ短毛ヲ疎布ス。葉狀總苞ハ直立セル莖頂ニ三片アリテ各片三全裂ス。初夏ノ候、總苞葉ノ中央ヨリ直立セル一花梗ヲ抽出シ、梗頂ニ一白色花ヲ開ク。萼ハ花瓣様ヲ呈シテ六七片稀ニ五片ニシテひめいちげヨリ少シク大ナリ。雄蕊多數ニシテ黄色。雌蕊稍多數、子房ハ瘦卵形ニシテ細毛ヲ有ス。瘦果ハ卵狀橢圓形ニシテ細毛ヲ被フリ短鈎ヲ有ス。