

第 1702 圖

きつねのぼたん科




やまをだまき  
*Aquilegia buergeriana*  
Sieb. et Zucc.

諸州ノ山地ニ生ジ又時ニ人家ノ庭園ニ栽植セラルル多年生草本ニシテ高さ30-50cm許アリ。莖ハ暗褐色ヲ呈シ主根アリテ地中ニ入ル。葉ハ直立シテ疎ニ分枝シ往々褐紫色ヲ呈ス。根葉ハ長柄アリテ再三出ア成シ、小葉ハ廣楔形或ハ截狀楔形ヲ呈シテ二三深裂或ハ尖裂シ裂片ハ楔形ヲ成シテ更ニ二三鈍頭齒牙ヲ有シ、上面緑色下面稍粉白色ヲ呈ス。五六月ノ候、上方ニ分枝シ上端花穂ト成リテ大ナル花ヲ開キ下向ス。萼ハ褐紫色ヲ呈シ、五片アリテ斜開シ、卵狀披針形ニシテ狭鈍頭ヲ有シ長サ17mm許アリ。花瓣ハ五片ニシテ直立シ萼片ト互生シ、略ボ截頭ノ長橢圓形ヲ成シテ萼片ヨリ短ク、上部淡黄色ヲ呈シ、後部ハ瘦距ヲ成シテ微シク内方ニ弓曲シ長ク花外ニ斗出シ距體漸次ニ狭小ト成リ末端遂ニ小球狀ヲ成シ萼ト同ジク褐紫色ヲ呈ス。雄蕊多數アリテ長短不同、内部ニ白膜質ノ狭長鱗片アリテ子房ノ周圍ヲ擁セリ。雌蕊五、子房ハ狭長ニシテ細毛アリ、花柱長シ。蓇葖ハ五、直立シ短細毛ヲ被フル。和名ハ山芋環ニシテ此種山地ニ生ズルヨリ云フ。

第 1703 圖

きつねのぼたん科




みやまをだまき  
*Aquilegia akitensis* Huth.

中部以北ノ高山帯ニ生ズル多年生草本ニシテ太キ根莖ヲ有ス。葉ハ四五數根生シ、柄長ク、單三出或ハ再三出ニシテ小葉ハ三全裂シ裂片ハ廣楔形ヲ成シ鈍頭、更ニ鈍頭裂片ニ細裂ス、帶紫綠色ニシテ且白霜ヲ帯ビ下面ニハ軟毛ヲ散生シ、質厚シ。盛夏ノ候直立セル一莖ヲ抽クコト、葉ヨリモ高く高サ10-20cm許、莖上ニ往々一葉アリ、梗頂ニ豐大ナル鮮紫色ノ美花ヲ着ケ點頭シテ開キ、花徑3cm許アリ。萼ハ五片アリテ廣ク開キ、各片廣卵狀披針形ヲ成ス。花瓣ハ五片ニシテ萼片ヨリ短ク長方形ニシテ黄色ヲ帯ビ、基部ニハ長キ距直立シテ其先端内卷シ萼片ト共ニ鮮紫色ナリ。多雄蕊。五雌蕊。蓇葖ハ五箇アリテ並立シ殆ンド無毛ナリ。和名ハ深山芋環ニシテ本種深山ニ生ズルヨリ云フ。

第 1704 圖

きつねのぼたん科



いぬしょうま  
*Cimicifuga biternata* Miq.

岡陵或ハ山地或ハ溪側等ノ樹下ニ生ズル多年生草本ニシテ高さ70cm許ニ達ス。根莖ハ少數アリテ長柄ヲ有シ、或ハ單三出或ハ再三出ハ其中間ノ者アリテ一株ニ出デ三者併ニスル者或ハ一二者偏ニスル者アリテ一様ナラズ、小葉ハ略ボ圓形或ハ卵圓形ヲ成シ心臟底ヲ有シ數尖裂ヲ成シ、裂片ノ邊緣ハ鋭頭齒牙ヲ有シ葉質硬シ。七八月ノ候、稍頭葉ヨリモ高く暗綠色ノ長花莖ヲ抽テ直立シ、單一或ハ分枝シ、長キ穗狀ヲ成シテ多數ノ無柄小白花ヲ開キ花下ニ微小ノ苞アリ、花軸ハ長クシテ細毛アリ。萼ハ五片アリテ四面ノ橢圓形或ハ倒卵形ヲ成シ長サ4mm許アリテ早落ス。花瓣無シ。雄蕊ハ多數ニシテ展開シ其直徑4mm許。雌蕊ハ一二箇アリ、子房ハ瘦長橢圓形ニシテ極メテ短キ柄ト花柱トアリ。蓇葖一二、長橢圓形、無毛、短柄ヲ具ヘ、中ニ種子ヲ容ル。和名ハ犬升麻ニシテ利用ナキ升麻ノ意ナリ、升麻ハさらしなしょうまヲ指ス。

さらしなしょうま (升麻)

一名 やさいしょうま  
*Cimicifuga simplex* Wormsk.  
var. *ramosa* Maxim.

山地樹木下或ハ山中ノ草地等ニ生ズル大形ノ多年生草本ニシテ高さ1m餘ニ達ス。莖ハ直立シ、圓柱形ニシテ綠色ヲ呈ス。葉ハ五生シテ長柄ヲ具ヘ、大形ニシテ重三出複葉ヲ成シ、多數ノ小葉ハ卵形或ハ長橢圓狀卵形ヲ成シ更ニ二三裂シ、裂片ハ缺刻狀鋭頭齒牙ヲ有シ、葉柄ハ短鞘ヲ成ス。七八月ノ候、稍ニ長キ花莖ヲ抽キ單一或ハ疎ニ分枝セル花軸ニ穗狀花序ヲ成シテ多數有梗ノ白花ヲ開キ兩性花ト雄花トアリ。萼片ハ橢圓形ニシテ長サ4mm許、外面ニ短毛アリテ早落ス。雄蕊ハ多數ニシテ長シ。雌蕊ハ二、子房ハ短柄ヲ有シテ披針形ヲ成シ多少毛アリ。蓇葖ハ長柄ヲ有シ長サ約1cmアリテ長橢圓形ヲ成シ、上端ニ鈎曲セル短花柱ヲ存シ果面ニ微毛アリ。和名ハ晒菜升麻ニシテ其嫩葉ヲ煮テ水ニ酒シ味ヲ附ケ食フ故斯ク云フ、野菜升麻ハ同ジク野菜トシテ食フ故云フ。

第 1705 圖

きつねのぼたん科



第 1706 圖

きつねのぼたん科



きけんしょうま  
一名 おぼばしょうま  
*Cimicifuga japonica* Spreng.  
var. *obtusiloba* Makino.  
(= *Pityosperma obtusilobum* Sieb. et Zucc.)

山地ノ樹林下或ハ溪側等ノ陰地ニ生ズル多年生草本ニシテ高さ30-60cm許、根莖ハ一箇或ハ二箇ヲ出シテ暗綠色ノ長葉柄ヲ具ヘ單三出ヲ成ス。小葉ハ小葉柄ヲ有シ大形ニシテ表面稍光澤アリ通常質稍厚ク、葉緣淺裂シテ裂片ハ不整ノ齒牙ヲ有ス、側生ノ二片ハ少シク歪形、底部ハ深キ心臟形ヲ呈シ、或ハ時ニ楕形(いぶきのきけんしょうま f. *peltata* Makino)ヲ呈ス。秋日、長キ花莖ヲ直立シテ葉ヨリ高く、上方疎ニ分枝シ穗狀花序ヲ成シテ稍密ニ無柄白色ノ多數小花ヲ着ケ、花軸ニ細毛アリ。萼ハ五片アリテ橢圓形或ハ卵形ニシテ早落シ長サ4mmアリ。花瓣無シ。雄蕊多數ニシテ展開シ其直徑8mm許、花絲ハ長クシテ絲狀。雌蕊一二、子房ハ線狀長橢圓形。蓇葖ハ一二、長橢圓形ニシテ上方ヲ指セル短花柱ヲ存シ、下ニ短柄アリ。種子ニ横皺アリ。和名ハ鬼臉升麻ナレドモ是レ元來漢名ナレバ之レヲ以テ本品ヲ呼ブハ中ラズ、大葉升麻ハ其葉大ナルヨリ云フ。

第 1707 圖

きつねのぼたん科



るゐふしょうま  
*Actaea spicata* L.  
var. *nigra* Willd.

山中樹林下ノ陰地ニ生ズル多年生草本ニシテ高さ60cm許ニ及ブ。根莖ハ短クシテ鬚根多シ。葉ハ粗大ニシテ直立シ單一ニシテ多少之曲ス。葉ハ大形ニシテ長柄ヲ有シ、再三出或ハ三三出複葉ヲ成シ莖上ニ二三葉ヲ具フ。小葉ハ卵形或ハ卵狀披針形ニシテ鋭尖頭ヲ有シ、葉緣ニ大小不齊ノ鋭頭粗鋸齒ヲ有ス。六月ノ候、稍上ニ直立セル一莖ヲ抽キ上部ニ單三出或ハ再三出ノ小形葉ヲ着ケ其頂部ニ短穗狀花序ヲ成シテ多數ノ白色小花ヲ開ク。萼ハ四片アリテ早落ス。花瓣亦四片、廣密形ニシテ長サ3mm許アリ。雄蕊多數アリテ長サ6mm許。雌蕊ハ一、子房ハ卵形ヲ呈シ柱頭ハ扁平ナリ。果實ハ漿果様ヲ成シ球形ニシテ黒熟シ徑6mm許、花軸ヨリ横向或ハ斜ニ下向シテ出デシ稍肥厚セル果柄ノ頂ニ着キ中ニ多種子アリ。和名ハ類葉升麻ニシテ其葉狀宛モ升麻葉ニ類似スレバ云フ。