

第166圖



たかさぶらう (鰐腸)

*Eclipta alba Hassk.*

路傍・畦畔等ニ生ズル一年生草本。莖ハ高サ30cm餘、直立或ハ横臥シ、葉腋ニ對生シテ枝ヲ分チ、更ニ先端小枝ヲ分ツ。葉ハ披針形ニシテ對生シ、莖ト共ニ短毛ヲ被リ、糙澁ス。八九月ノ候、梢頭枝端ニ徑1cm内外ノ頭狀花ヲ着ク。舌狀花冠ハ細小ニシテ白色ヲ呈シ、中心花ハ淡綠色ニシテ廣キ花托ニ着ク。瘦果ハ黒熟ス。

第167圖



めなもみ (穉菱)

*Siegesbeckia pubescens Makino.*

原野ニ普通ノ一年生草本。莖ハ直立シ、高サ1m内外、葉ト共ニ毛茸多シ。葉ハ有柄、對生、卵狀圓形ニシテ尖リ、鋸齒ヲ有シ、三脈大ナリ。秋日枝梢ニ黃色ノ頭狀花ヲ開キ、花下ニ少數ノ狹長筒狀ノ總苞片アリ、腺毛ヲ有シテ粘液ヲ分泌シ、以テ人衣等ニ膠着シ、種子ノ散布ニ便ス。外圍ノ總苞ハ綠色。舌狀花ハ細小。中心管狀花ハ多數ナリ。和名ノめハ雌ニシテをなもみノ雄ニ對ス、なもみハ蓋シなづむノ意ニシテなごみト成リ遂ニなもみニ轉化セシナラン、即チなづむハ澁滞逡巡ノ意ニシテ其粘腺アル鉤毛頻リニ附着シ困頓ヲ極ムルヨリ斯ク云ヒシナラン。

第168圖



こめなもみ

*Siegesbeckia glabrescens Makino.*

山野ニ生ズル一年生草本。めなもみニ似タレドモ、全株瘦長。高サ50cm内外ニシテ莖及ビ葉ニ彼ニ見ルガ如キ長キ粗立毛ナク、唯伏臥セル短毛ヲ疎ニ布キ、一見無毛ナルガ如キヲ以テ其區別容易ナリ。莖ハ圓柱形ニシテ帶褐紫色、上部ニ對生シテ分枝ス。葉ハ有柄對生シ、草質ニシテ薄ク表面糙澁シ、卵圓形或ハ圓形ニシテ短ク尖リ、邊緣ニ不齊齒ヲ刻ミ、三主脈アリ。秋日梢頭枝端ニ聚繖的圓錐形ヲ成シテ黃色ノ頭狀花ヲ散着ス。總苞外片五箇ハ筒形ヲ呈シテ平開シ、内片ハ相集リテ立チ内部ノ花ヲ包ミ、共ニ綠色多肉ニシテ密ニ腺毛ヲ布キ瘦果熟スレバ他物ニ觸レテ容易ニ離脱膠着ス。邊緣花ハ舌狀花冠ヲ有スレドモ細小ニシテ顯著ナラズ。中心花ハ黃色ノ管狀花ヲ有シ花冠五裂ス。瘦果ハ倒卵形ヲ成シテ少シク曲レリ。和名ハ小めなもみニシテ之ヲめなもみニ比スレバ草狀小ナレバ斯ク云フ。

ひやくにちさう

*Zinnia elegans L.*

觀賞品トシテ園裡ニ栽植セルアル一年生草本ニシテめきしこノ原産ナリ。莖ハ直立シテ高サ60-90cmニ達シ、葉ハ無柄ニシテ對生シ、長卵形ニシテ尖リ、基部ハ莖ヲ抱キ、全邊ナリ。葉腋ニ枝ヲ分チ、夏ヨリ秋ニ互リ、相次ギテ每枝頂ニ大ナル一頭狀花ヲ開ク。舌狀花冠ハ剛質ニシテ永ク残り、一重八重アリテ、紅・紫・緋・黃・樺等ノ數品アリ。中心管狀花ハ黃色ニシテ遂ニ卵狀ニ高マル。

第169圖



ぶたくさ

*Ambrosia elatior L.*

(= *A. artemisiaefolia L.*)

北米ノ原産ニシテ明治初年後ニ渡來シ今ハ荒蕪地ニ多ク野生スル大形ノ一年生草本ニシテ高サ1mニ達ス。全株短剛毛ヲ布キ、多ク枝極ヲ分ツ。葉ハ下部ハ對生、外形三角狀卵形、一二回羽狀ニ全裂シ、裂片ハ線形ニシテ表面深綠、裏面ハ淡色ナリ。夏日細黃花ヲ開ク。雌雄同株ニシテ雄性花序ハ枝端莖頂ニ長キ穗狀ヲ成シ、頭狀花ハ徑2-3mm、十乃至十五ノ小花ヨリ成リ、總苞ハ綠色草質ノ倒圓錐形ヲ呈シテ苞片ニ分岐セズ、花ハ悉ク管狀花冠ヲ有ス。雌性花序ハ枝ノ中部ノ葉腋ニ單立又ハ塊狀ヲ成シテ生ズ、頭狀花ハ一小花ヨリ成リ、二箇ノ總苞片ヲ伴ヒ、倒卵形、短嘴頭、綠色ニシテ、花柱ハ二岐ス。和名豚草ハ北米ニテ Hogweed ト稱スルヨリ之レニ基キ斯ク呼ビシナリ。

第170圖



をなもみ (莧耳)

*Xanthium Strumarium L.*

原野・路傍ニ生ズル一年生草本。莖ハ高サ1.5m内外ニ達シ、葉ト共ニ短毛ヲ被ル。葉ハ長柄ヲ具ヘ、廣闊ニシテ鋭頭ヲ有シ、葉底心臟形ヲ成ス、邊緣ニ缺刻及粗鋸齒ヲ有シ、下部ノ三脈著シ。夏月梢ニ黃綠色ノ頭狀花ヲ疎穗狀ニ綴ル。雌雄アリテ、雄性頭花ハ稍球形ヲ成シテ頂生シ、雌性頭花ハ下部ニ在リテ二嘴並ニ鉤刺ヲ有スル長橢圓形ノ壺狀總苞ヲ有シ、花後長サ1cm餘ニ及ビ、中ニ二箇ノ瘦果ヲ閉入ス。果實ハ風邪藥トシテ效アリ。

第171圖

