


第 1714 圖

きつねのぼたん科



とうごくさばのを

*Isopyrum trachyspermum Maxim.*

諸國ノ山中陰濕ノ地ニ生ズル多年生草本ニシテ高サ10cm内外、全草柔軟無毛ナリ。根ハ鬚狀ヲ成シテ短小ナル根莖ヨリ出ヅ。葉ハ根生シ、葉柄本ニハ軟骨様ノ葉鞘ヲ具ヘテ卵形ヲ成シ夏日モ尙存セリ。葉片ハ徑3cm内外、三出或ハ鳥趾狀五出、小葉ハ圓卵形、縁ニ鈍鋸齒アリ。莖ハ一株ニ三四條ヲ出シテ葉ヨリモ高ク、傾上シテ四稜アリ、汚紅色ニ染ミ、上部二苞相對シ柄短ク三出ス。四月頃莖頂ニ淡黃綠花ヲ開ク。細梗アリ。萼五片、花瓣様。花瓣ハ黃色ノ蜜槽ト化シ萼片ヨリ短シ。雄蕊ハ十五内外。薔莖ハ五六月ニ熟シテ水平ニ開キ幅2cm内外アリ。萼筒ハ多汁ト成リテ果梗ノ先端ヲ包ム。種子ハ小圓形、瘤狀突起ヲ布ク。夏日根際ニ閉鎖花ヲ生ズ。和名ハ東國鯖の尾ノ意ニシテ此種關東地ノ山ニ生ジ而シテさばのをノ一種ナレバスク云フ。

第 1715 圖

きつねのぼたん科



しろかねさう

一名 つるしろかねさう

*Isopyrum stoloniferum Maxim.*

富士山ノ陰地ニ生ズル質軟カキ多年生草本ニシテ地中ニ横走スル白色ノ根莖アリテ繁殖ス。莖ハ纖細綠色ニシテ高サ12cm内外ニ達ス。根葉ハ長葉柄ヲ具ヘ柄本僅ニ擴大シテ小ナル鞘ヲ成シ、趾狀五出葉ニシテ小葉ハ廣卵形ヲ呈シ缺刻狀鈍鋸齒縁ヲ有ス。上方ニ細枝ヲ分チ、其分枝點ニ梢葉ヲ叢生ス。五六月ノ候梢頂ヨリ直立セル細梗ヲ出シ梗頂ニ白花ヲ着ケ上向シテ開ク。花徑1.3cm許。萼ハ五片アリテ長橢圓形。花瓣ハ五アリテ縮形シ、長サ2mm許、上方圓形ヲ成シテ黃色ヲ呈シ、下部絲狀柄ヲ成ス。花中ニ多雄蕊并ニ二心皮ヲ具フ。薔莖ハ二個粒下水平ニ開出シ、果皮膜質ニシテ先端ニ絲狀花柱ヲ宿存ス。和名白銀草ハ蓋シ其花白色、其莖・葉綠色ニシテ他色ノ采無キヲ以テテスクノ如キ名稱ヲ下セシナラン、蔓白銀草ハ其地下莖蔓狀ヲ呈スルヨリ云フ。

第 1716 圖

きつねのぼたん科



おほしろかねさう

*Isopyrum Raddeanum Maxim.*

var. *japonicum Franch. et Sav.*

中部諸州山地ノ陰處ニ生ズル質軟カキ多年生草本。根莖ハ短ク下部ニハ多數ノ鬚根ヲ發出シ上部ニハ鱗片ヲ伴フ。莖ハ瘦長ニシテ直立シ、中部以上ニ一葉ヲ着ク。葉ハ有柄、小柄アル三小葉ヨリ成リ小葉ハ其概形卵形ニシテ銳頭淺心臟底、更ニ三深裂シ裂片ハ更ニ缺刻狀ノ鋸齒縁ヲ有ス。花ハ繖形ヲ成シテ數葩莖頂ニ開キ白色ヲ呈ス。花梗ハ細長、3cm内外ニシテ葉狀苞ノ中心ヨリ出デ其苞ハ無柄ニシテ莖葉ノ小葉ト同質ナリ。萼ハ五片アリテ花瓣様ヲ呈シ平開シ、橢圓形ニシテ其狀にりんさうニ似タリ。雄蕊ハ多數、花絲ハ絲狀ニシテ雌蕊ヨリ長ク葯ハ黃色。雌蕊ハ小形、心皮ハ三乃至五アリテ柄ナク、上部ハ狹窄シテ先端ハ點狀ノ柱頭ト成ル。薔莖ハ平開シ、其腹縫線ニ於テ開裂ス。和名ハ白銀草ノ意ニシテ其草狀しろかねさうニ似テ大形ナルヨリ云フ。

くろたねさう

*Nigella Damascena L.*

徳川末葉時代ニ渡來シ偶ニ庭園ニ培養セララルル一年生ノ草本ニシテ歐洲ノ原産ナリ。莖ハ直立シ通ジテ葉ヲ有シ高サ50cm内外アリ。葉ハ互生シ、卵形ニシテ先端尖リ三四回羽狀ニ細裂セリ。夏時、枝頭二三分枝シ、各枝頂ニ單生セル大形花ヲ開キ細裂セル總苞葉ヲ以テ圍繞セラレ花徑2cm許アリ。萼ハ五片アリテ花瓣様ヲ成シ淡碧色或ハ白色ヲ呈ス。花瓣ハ五シテ大ニ縮形シ、長サ5mm許、先端二岐ス。雄蕊ハ多數。心皮ハ三乃至十箇ニシテ基部合一シ、先端ニ尾狀柱頭ヲ有ス。蒴果ハ大形ニシテ膨腫シ、長サ2cm許、上端ニテ開裂シ黑色小形ノ多種子ヲ散出ス。和名黒種草ハ其種子黑色ナルヨリ斯ク云フ。

第 1717 圖

きつねのぼたん科



せつぶんさう

*Eranthis pinnatifida Maxim.*

(= *E. Keiskei Franch. et Sav.*)

我邦中部并ニ稍西部地ニ産シ山腰ノ半陰地ニ見ル多年生小草本ニシテ球狀ノ一塊莖ヲ地中ニ有シ其塊頂ヨリ莖葉ヲ發出シ下ニ鬚根ヲ發出ス。莖ハ直上或ハ傾上シ軟弱ニシテ高サ8-14cm許アリ。根生葉ハ纖弱ナル長葉柄ヲ有シテ三深裂シ、側裂片ハ更ニ二深裂シ、各裂片ハ羽裂シ、小裂片ハ鈍頭線形ヲ成ス。總苞葉ハ莖頂ニ在リテ柄無ク不齊ナル線形片ニ分裂シ、輪様ニ排列ス。三四月ノ候、總苞ノ中心即チ莖頂ヨリ直立セル一梗ヲ抽クコト1cm許、梗頂ニ一白花ヲ開キ花徑2cm許アリ、萼ハ五片ニシテ花瓣様ヲ呈シ卵形ヲ成シテ縱脈ヲ具ヘ邊緣ニハ多少不齊ノ鈍齒ヲ見ル。花瓣五箇ハ大ニ縮形シテ兩岐セル黄色ノ蜜槽ト成ル。雄蕊ハ多數、葯ハ淡紫色。披針形ノ心皮二三箇アリ。薔莖ハ短柄アリテ半月形ヲ成シ先端ノ嘴ヲ併セテ長サ1cm許アリ。種子ハ大ニシテ圓形ナリ。和名ハ節分草ノ意ニシテ此草春寒ヲ冒シテ早く萌出スルヨリ春ノ節分頃ニ開花スルト謂ヒ此名ヲ得タリ。漢名 菟葵(誤用)

第 1718 圖

きつねのぼたん科



第 1719 圖

きつねのぼたん科

ひたかさう

*Callianthemum Miyabeianum*

*Tatewaki.*

北海道日高ノ山地ニ生ズル多年生草本。高サ10-20cm。根莖ハ短厚、鬚根ヲ發出ス。葉ハ根生シ長葉柄アリテ花時ニハ葉末ダ伸長セズ、再三出、裂片ハ廣卵形、更ニ細片ニ分裂ス。裂片ハ鈍頭、葉質稍厚ク初メ白霜ヲ帯ベドモ表面ハ後ニ黃綠化ス。五月、葉間ニ花莖ヲ抽キ二分枝シテ頂ニ徑2cm内外ノ白花ヲ開キ上向ス。萼ハ十片内外、單輪ニシテ花瓣様ヲ呈シ、倒卵狀橢圓形、底部ニ近ク赤褐色ノ斑點ヲ飾ル。花瓣ハ無シ。雄蕊及ビ雌蕊ハ多數。果實ハ瘦果ニシテ卵圓形ヲ呈ス。一種信州北岳ニ産スル者ハ葉面粉白頗ル顯著ニシテ秋ニ入ルモ其色脱セズ、萼片ハ先端ニ凹點アリテ區別シ得、之レヲきただけさう(*C. hondoense Nakai et Hara*)ト云フ。和名日高草ハ其産地ニ基ク。

