

第1756圖



なでしこ科

せんのう (剪紅紗花?)
一名 せんをう 古名 こうばいぐさ
Lychnis Senno Sieb. et Zucc.
蓋シ往昔支那ヨリ傳へシ者乎、今ハ觀賞花草トシテ庭園ニ栽培セラル多年生草本ニシテ體上ニ細毛ヲ密布ス。莖ハ直立シ圓柱形ニシテ節アリ高サ60cm内外アリ。葉ハ莖節ニ對生シ、卵狀披針形或ハ廣披針形ニシテ先端ハ銳尖ナリ。七八月ノ候稍上ニ疎ナル聚繖花序ヲ成シテ美花ヲ着ク。花ハ徑4cm許、通常深紅色ナレドモ時ニ白花ノ者アリテしろばなせんのう (*forma albiflora Makino*) ト云フ。萼ハ長棍棒狀ヲ成シテ毛ヲ散生シ、先端五裂ス。花瓣ハ五片ニシテ平開シ、下ニ花爪ヲ具ヘ、舷部ハ前緣深クニ剪裂シ、花喉ニハ每瓣各二小鱗片ヲ有ス。十雄蕊。五花柱。子房ハ長橢圓狀圓柱形ニシテ長柄上ニ立ツ。蒴果ハ宿存萼ヲ伴フ。和名仙翁ハ此草原ト山城嵯峨ノ仙翁寺ニ出ヅルヲ以テ此ク云フ。古名こうばいぐさハ紅梅草ニシテ其花色花形ニ由ル。從來本種ニ對シテ剪秋羅ヲ用ウレドモ元來此ノ如キ漢名アルコト無シ。

第1757圖



なでしこ科

まつもと
一名 まつもとせんのう
Lychnis Sieboldi V. Houtt.

(= *L. cognata Maxim.*)
通常觀賞花草トシテ庭園ニ栽培セラル多年生草本ニシテ、其原種ハ九州ニ産シくしまつもと (*var. spontanea Makino*) ト稱シ綠莖ニシテ赤花ヲ開ク。莖ハ數條叢生シ直立シ節高ク、高サ70cm許ニ達シ、毛茸ヲ有シ葉共ニ暗赤色ヲ呈ス (白花品ハ綠葉)。葉ハ莖節ニ對生シテ葉柄無ク、卵形或ハ長卵形ニシテ銳尖頭ヲ有シ毛ヲ散生ス。六月頃梢頭ニ花ヲ開キ聚繖の二相集ル。花梗ハ短ク、毛ヲ密生ス。花ハ徑4cm許、深赤色ノ外ニ白色或ハ赤白ノ絞リ等アリ。萼ハ長棍棒狀ニシテ膨レ粗毛ヲ散生シ、先端五裂ス。花瓣ハ五片ニシテ平開シ、下ニ花爪ヲ具ヘ、舷部ハ前緣四頭ヲ成シテ倒心臟形ヲ呈シ兩側ニ各一ノ狹片ヲ具ヘ邊緣ニハ不齊ノ短小齒牙ヲ刻ミ、花喉ニ十小鱗片ヲ有ス。十雄蕊。子房ハ長橢圓狀圓柱形ニシテ五花柱アリ。蒴果ハ宿存萼ヲ伴フ。和名まつもとハ元來まつもとせんのうノ略ナリ、まつもとハ其花形俳優松本幸四郎ノ紋所ニ似タル故此呼ビシナリ、從テ信州松本ノ邊多ク自生スル故其名アリト稱スルハ非ナリ。從來本種ニ剪春羅ノ漢名ヲ充テシハ誤ナリ。本種ハ一ノ間種ト謂ハル *L. Haageana Lem.* = 酷似ス。

第1758圖



586

ふしごろせんのう
一名 ふじあふさかさう
Lychnis Miquelianae Rohrb.

諸州ノ山地殊ニ半樹陰邊ノ草間ニ生ズル多年生草本ニシテ莖ハ直立シ高サ凡50-70cm許アリ、稍無毛ニシテ綠色ノ圓柱形ヲ呈シ單一或ハ疎ニ分枝シ、節高クシテ紫黒色ヲ帶ブ。葉ハ對生シ、卵形・倒卵形乃至橢圓狀披針形ニシテ銳尖頭ヲ有シ底部ハ狭窄シ、全邊葉緣ニ短緣毛アリ。夏日莖梢ニ聚繖的分枝ヲ成シテ少數ノ朱赤色大花ヲ開キ短梗ヲ有ス。萼ハ長棍棒狀ヲ呈シテ毛無ク、先端五裂シ裂片ハ三角狀鍼形ヲ成シテ尖レリ。花瓣ハ五片ニシテ平開シ、下ニ花爪ヲ有シ、舷部ハ倒心臟形ニシテ全邊、前端微ニ凹頭ヲ成シ、花喉ニ十小鱗片ヲ具フ。十雄蕊。子房ハ長橢圓形ニシテ同長ノ柄ヲ有シ先端五裂ス。蒴ハ長橢圓形ニシテ五花柱ヲ有ス。和名節黒仙翁ハ本種せんのうノ類品ニシテ其莖節紫黒色ナル故云フ、ふしごろせんのうノ略、逢坂草ハ江州城州界ノ逢坂ニ生ズルヲ以テノ稱ナリ。

586

第1759圖



なでしこ科

ひろはのまんてま
Lychnis alba Mill.
(= *Melandryum album Garcke.*)

歐洲・北亞弗利加及北西亞細亞原產ノ越年生或ハ多年生草本ニシテ庭園ニ栽培セラル觀賞花草ナリ。莖ハ高サ60cm許ニ達シテ毛ヲ密生シ、上部ニテハ白腺毛ヲ密布ス。葉ハ對生、卵狀披針形或ハ長橢圓形ニシテ銳頭、銳底、軟毛疎アリ。五六月ヨリ九月ニ瓦リ、枝ヲ分チテ寬闊ナル圓錐花穗ヲ成シ短梗上ニ白花ヲ着ケタニ開テ香氣ヲ放ツ。萼ハ鐘形ニシテ長サ1.5cm許、淡綠色ニシテ腺毛及ビ軟毛ヲ有シ、先端五裂シ裂片ハ披針狀三角形ナリ。花瓣ハ五片ニシテ平開シ、下ニ花爪ヲ有シ、舷部ハ倒卵形ニシテ先端二裂シ、各片花喉ニ二小鱗片ヲ具フ。十雄蕊。五花柱アリ。本種ハ雌雄異株ニシテ雌本ニハ卵狀球形ノ蒴果ヲ成ビ爲メニ宿存セル萼片ハ膨大シ蒴ノ先端十裂シ齒片ハ短クシテ直立ス。*L. dioica L.*ハ本種ニ類似スレドモ元來別種ニシテ通常紅花ヲ朝ニ開キテ香氣ナク蒴齒ハ反曲ス。

第1760圖



なでしこ科

するせんのう
一名 ふらねるさう
Lychnis Coronaria Desr.

(= *Agrostemma Coronaria L.*)

今諸處ノ庭園ニ觀賞花草トシテ培養セラル歐洲南部ノ原產ノ越年生或ハ多年生草本ニシテ全體密ニ白色ノ長綿毛ヲ以テ被ハル。莖ハ直立シテ上部ニ枝ヲ分チ高サ凡30-90cmアリ。葉ハ對生シ、橢圓形或ハ長橢圓形ニシテ稍鈍頭ヲ呈シ、脚葉ハ下部狭窄シテ葉柄ト成リ、莖葉ハ無柄ナリ。夏秋ノ間、長キ花梗ノ頂ニ紅色・淡紅色或ハ白色ノ美花ヲ開キ花徑2.5cm許アリ。萼ハ鐘形ニシテ革質、著シク隆起セル脈アリ、サ1.5cm許、裂片ハ捩レタ線形ナリ。花瓣ハ五片、圓狀倒卵形ニシテ稍凹頭、花喉ニ小鱗片ヲ具フ。十雄蕊。五花柱アリ。蒴果ハ長橢圓形ニシテ先端五裂シ宿存萼片ヲ伴ヘリ。和名霞仙翁ノ意ニシテ多分初め白地ニ水紅色ヲ潮セル花ニ擬セル名ナリ。

第1761圖



なでしこ科

えんびせんのう
一名 えんびせん
Lychnis Willfordii Maxim.

我邦中部北部ノ山原或ハ原野ノ草地ニ自生スレドモ普通ニハレヲ見ズ、時ニ庭園ニ栽培セラル多年生草本ナリ。莖ハ高サ50cm許、稍無毛ナリ。葉ハ對生シ、披針形ニシテ銳尖頭、基部稍抱莖、無毛ニシテ微緣毛ヲ有ス。八月ノ候莖頂ニ聚繖花序ヲ成シ、徑3cm許ノ深紅色美花ヲ開ク。花梗ハ短クシテ毛茸ヲ有ス。萼ハ長橢圓形圓筒形ヲ成シ長サ1.5cm、無毛ニシテ先端五裂シ裂片ハ三角狀鍼形ナリ。花瓣ハ五片ニシテ平開シ、下ニ花爪ヲ有シ、舷部ハ深ク剪裂シ裂片ハ少數ニシテ狹長銳尖ナリ、花喉ニ少剪齒アル鍼形ノ十小鱗片ヲ有ス。十雄蕊。子房ハ長橢圓形ニシテ五花柱アリ。蒴果ハ橢圓形ニシテ先端五裂シ宿存萼片ヲ伴フ。和名ハ燕尾仙翁ノ意ニシテ其分裂セル花瓣ノ狀ニ基ク、燕尾仙ハえんびせんのうノ略稱ナリ。

587