



第172圖



第173圖



58

のぶき

Adenocaulon bicolor Hook.
var. *adhaerescens* Makino.

山野ノ樹陰・溪間等陰濕ノ地ニ生ズル多年生草本。地下莖ハ短クシテ鬚根ヲ多出シ、通常一根ニ一莖ヲ抽キテ高サ 50cm 餘ニ達ス。脚葉ハ叢生シ、稍ふきニ似ルモ小ク、長柄ニハ狹翼ヲ具ヘ、三角状腎形ヲ成シ、葉裏綿毛ヲ布キテ白色ヲ呈ス。上葉ハ小ク、互生ス。夏秋ノ候、梢ニ分枝シ、白色ノ小頭状花ヲ多生ス。外部ノ小花ハ雌花ニシテ内部ノ小花ハ雄花ナリ。瘦果ハ緑色ノ棍棒状ヲ成シテ輻射状ニ列ビ、暗紫色ノ粘腺毛ヲ密生シ、以テ他物ニ膠着ス。和名ハ野ノふきノ意。漢名和尚菜(誤用)

がんくびさう

Carpesium divaricatum
Sieb. et Zucc.

山野ニ生ズル越年生草本。莖ハ直立シ、高サ 30-60cm 許、通ジテ葉ヲ互生シ、梢上葉腋ニ小枝ヲ分ツ。脚葉ハ長柄ヲ具ヘ、往々心脚ニシテ卵状橢圓形ヲ呈シ、邊緣ニ不齊ノ鋸齒アリテ莖ト共ニ毛ヲ帶ブ。上葉ニ至ルニ從ヒテ漸次短柄ト成リ、且ツ葉身狭マル。秋日、梢頭枝端ニ黃色ノ一頭状花ヲ着ケ、側向或ハ下向ス。頭状花ハ二三ノ葉状苞ヲ伴ヒ、總苞ハ鱗次シ、外片ハ短闊、内片ハ狭シ。花態煙管ノ雁首ニ髣髴タリ、故ニ此和名アリ。漢名杓兒菜(誤用)

第174圖

やぶたばこ (天名精)

Carpesium abrotanoides L.

原野・山麓等ニ生ズル越年生草本ニシテ一種ノ臭氣アリ。莖ハ強硬ニシテ高サ 60-90cm 許ニ達シ、葉ト共ニ細毛ヲ密布ス。根葉ハ地ニ就キテ生ジ、稍たばこの葉ニ似ルモ小ク、鋸齒線ニシテ皺面ヲ成シ、莖葉ハ長橢圓形ニシテ互生ス。夏秋ノ候梢頭ニ開出スル枝ヲ分チ、各葉腋ニ短梗アル黃色ノ一頭状花ヲ着ケ、枝上ニ連續ス。頭状花ハ稍鐘形ニシテ總苞片鱗次シ、其外片數箇ハ葉狀ヲ呈ス。果實ハ黒褐細長、先端微棘ヲ具ヘ、粘液ヲ分泌シ、臭氣アリ。葉ノ絞汁ハ腫物・打傷ニ効アリ。又根・種子モ藥用ニ供セラル。

こやぶたばこ (杓兒菜・金空耳)


Carpesium cernuum L.

山野ニ生ズル越年生草本。全株伏臥セル軟毛ヲ布キ帶白綠色ヲ呈ス。莖ハ直立シテ高サ 60-90cm 許ニシテ疎ニ分枝ス。根葉ハ闊大。莖葉ハ互生シ、下部ノ葉ハ橢圓形又ハ卵状橢圓形ニシテ鈍頭、銳尖底ヲ以テ長キ有翼ノ葉柄ト成リ、共ニ鋸齒線ヲ具ヘ、上部ノ葉ハ小形ニシテ廣披針形、低鋸齒線、漸尖頭、銳底、短柄ナリ。秋月、枝端毎ニ一頭状花ヲ着ケ點頭シ、直徑 1cm 内外アリテ平頭ナリ。總苞ハ淡綠色ノ廣鐘形ニシテ下ニ葉状苞二乃至五片ヲ具ヘ、外總苞片ハ倒卵状披針形、鈍頭、葉質ニシテ上部反卷シ、内方ノ總苞片ハ乾皮質ナリ。小花ハ總テ管狀花冠ヲ有シ、淡綠白色ヲ呈シ黃色ナラズ。和名小畠煙草ハ小形ナルやぶたばこノ意ナリ。

第175圖



第176圖



さじがんくびさう

Carpesium glossophyllum Maxim.

山野ニ生ズル多年生草本。莖ハ質硬ク、高サ 50cm 内外、單一或ハ一二分枝シ、葉ト共ニ毛茸多シ。根葉ハ稍叢生シテ地ニ平布シ、殆ド無柄ノ倒披針形ニシテ邊緣波狀ヲ呈シ、鈍頭。莖葉ハ小サク、披針形ニシテ疎ニ互生ス。夏日梢頭枝端ニ各一箇ノ小ナラザル白綠色頭状花ヲ着ケ、側向ス。頭状花ハ披針形ヲ成セル少數ノ葉状苞ヲ伴ヒ、總苞片ハ稍幅廣ク、其外片ハ先端葉状ヲ成シテ反卷シ、内片ハ乾皮質。瘦果ハ細長ナリ。

第177圖



ひめがんくびさう

Carpesium rosulatum Miq.

山地ニ生ズル多年生草本。莖ハ細長ニシテ高サ 30cm 内外アリ、全株短毛ヲ布ク。葉ハ脚部ニ多ク、鈍頭ナル倒披針形ニシテ邊緣ニ淺齒ヲ具ヘ、梢葉ハ狹小ニシテ疎着ス。夏時、梢上ニ枝ヲ分チ、枝端ニ管狀花ヨリ成ル淡黃色ノ小頭状花ヲ有シ、點頭ス。頭状花ハ圓柱形ヲ呈シ、徑 4mm 許アリ、總苞外片ハ先端葉状ヲ呈シテ反卷シ、中・内片ハ乾皮質ニシテ直立ス。本邦產本屬中ノ最小者ナリ。