

第 1774 圖

なでしこ科




わちがひさう
Pseudostellaria heterantha Pax.
(= *Krascheninnikowia heterantha Maxim.*)

山地ノ林中ニ生ズル多年生小草本ニシテ塊根ハ單一ニシテ地中ニ直下シ紡錘形ヲ呈ス。莖ハ單一ニシテ直立シ、細長ニシテ毛條ヲ有シ高サ8-15cm許アリ。葉ハ對生シ、下部ノ者ハ倒披針形、上部ノ者ハ卵狀披針形或ハ披針形ニシテ鈍頭ヲ有シ、底部ハ邊緣ニ疎毛ヲ有シ狭窄シテ葉柄ト成ル。五月ノ候上部葉腋ヨリ細長ニシテ毛條ヲ有スル花梗ヲ抽テ頂ニ一白花ヲ開キ天ニ朝フ。綠萼五片、披針形ニシテ鈍頭、長サ4-5mm、邊緣ニ毛ヲ有ス。花瓣モ亦五片、倒披針形ニシテ稍鈍頭ヲ呈ス。十雄蕊アリテ葯ハ紫色。子房ノ頂ニ三花柱アリ。別ニ莖ノ下部葉腋ヨリ閉鎖花ヲ生ズルノ特徴アリテ該花ハ四數ヨリ成ル。蒴果ハ四裂シ細種子ヲ散ズ。和名輪違草ハ往昔此草ノ名稱尙不明ナリシ時無名ノ標識トシテ其盆栽ニ輪違ヒノ符ヲ記セシ事アリ由テ終ニわちがひさうノ名ヲ生ゼント謂フ。

第 1775 圖

なでしこ科



くしろわちがひ
Pseudostellaria sylvatica Pax.
(= *Krascheninnikowia sylvatica Maxim.*)

特ニ北地ニ見ル多年生ノ小草本ニシテ地中ニ直下スル塊根ハ單一ニシテ小蕪菁根狀ヲ呈ス。莖ハ直立シテ高サ20cm許ニ及ビ細長ニシテ毛條アリ。葉ハ無柄ニシテ對生シ、下部ノ者ハ線形、上部ノ者ハ線狀披針形ニシテ先端長ク尖リ、底部ノ邊緣ニハ毛ヲ有ス。六月ノ候梢上葉腋ヨリ疎枝ヲ岐チ白色ノ有梗花ヲ開キ天ニ朝フ。花梗ハ細長ニシテ毛條アリ。綠萼五片、披針形ニシテ鈍頭ナリ。花瓣モ亦五片、倒卵形ニシテ先端二裂ス。十雄蕊。卵形ノ子房頂ニ三花柱アリ。蒴果ハ卵圓形ニシテ三裂片ニ開裂ス。別ニ莖ノ下方節部ヨリ有梗ノ閉鎖花ヲ生ズル特徴アリ。和名ハ釧路輪違ニシテ本種初メ北海道釧路國ニ於テ採集セラル故ニ其名アリ。

第 1776 圖

なでしこ科



たちはこべ
Moehringia trinervia Clairv.
var. platysperma Makino.
(= *M. platysperma Maxim.*)

諸國ノ山地ニ生ズル稍濁綠色ヲ呈セル一年生草本。全草軟弱ニシテ瘠長、細毛アレドモ顯著ナラス。莖ハ瘦細ニシテ直立或ハ斜上シ、通常基部ニテ岐レ又上部ニ於テ分枝シ枝ハ菲弱ナリ。葉ハ小形ニシテ對生シ、卵形或ハ長卵形ニシテ鈍頭、廣楔狀底、葉柄ヲ具ヘ、三行脈ヲ有シ質薄ク略ボ平滑ナレドモ葉裏中脈上ト葉緣トニハ細毛列生ス。夏時ニ開花シ、花ハ細小ニシテ長キ細梗ヲ有シ、細梗ハ梢ノ二枝間或ハ葉腋ニ直立シ葉ヨリ長シ。萼片ハ鏡狀披針形ニシテ鈍ク尖リ中央背部ニハ毛アリ、兩緣ハ膜質ヲ呈ス。花瓣ハ極メテ小サシ。花後卵球狀ノ蒴果ヲ結ビ其長サ宿存セル萼片ヨリ短ク、頂部ノミ開裂シテ細子ヲ吐ク。種子ハ黑色ニシテ腎形ヲ成シ一見平滑ニシテ光澤アリ。和名ハ立繁縷ニシテ立チタルはこべノ意ナリ。

ひめたがそでさう


誤稱 おほやまふすま

Moehringia lateriflora Fenzl.
(= *Arenaria lateriflora L.*)

山地或ハ山原ニ生ズル多年生小草本ニシテ往々群ヲ成シテ生ズ。根莖ハ絲狀ニシテ地中ニ走ル。莖ハ直立シ細長ニシテ單一或ハ多少分枝シ、高サ10-20cm許、細毛ヲ有ス。葉ハ對生シ略ボ無柄、橢圓形乃至長橢圓形ニシテ鈍頭、長サ1-2cm許、細毛アリ。六七月頃、少數花ヨリ成ル聚繖花序ヲ腋生或ハ頂生シ、細長ナル花梗ヲ有スル小形ノ白花ヲ開ク。萼ハ五片、卵形ニシテ長サ2mm許、先端鈍頭ナリ。花瓣モ亦五片、長倒卵形ヲ成シ萼片ノ略ボ倍長アリ。概ネ十雄蕊アリテ花絲ノ基部ニ毛アリ。子房頂ニ三花柱アリ。蒴果ハ廣卵形ニシテ萼片ヨリ長ク、先端六裂シ、宿存萼ヲ伴フ。和名ハ姫誰ケ袖草ナリ。

第 1777 圖

なでしこ科



のみのつづり (小無心菜)
Arenaria serpyllifolia L.
var. leptoclados Reichb.

路傍・廢地并ニ田野等ニ普通ニ生ズル越年生小草本ニシテ全體綠色ナリ。莖ハ纖細ニシテ稍硬質、株本ヨリ分枝シテ簇生シ、枝ヲ分ツコト多ク、下部ハ往々傾臥シ、高サ5-25cm許、細毛ヲ布ク。葉ハ小形ニシテ對生シ、長サ3-6mm許アリ、卵圓形ニシテ鈍頭、細毛ヲ有ス。春ヨリ夏ニ至リ梢上葉腋ニ細花梗ヲ出ダシ小白花ヲ開ク。萼ハ五片、長サ3mm許、披針形ニシテ鈍頭、細毛ヲ有シ邊緣膜質ニシテ宿存ス。花瓣モ亦五片、長橢圓形ニシテ萼片ヨリ稍短ク、分裂セズ。十雄蕊。卵形ノ子房頂ニ短キ三花柱アリ。蒴果ハ萼片ト略ボ同長ニシテ先端六裂ス。種子ハ腎形、微細ナル凹凸アリ。和名ハ蚤ノ綴リニシテのみノ短衣即チつづりノ意ナリ、蓋シ本種ノ小形葉ヲ蚤ノ衣ニ擬セシモノナラン。

第 1778 圖

なでしこ科



てうかいふすま

一名 めあかんふすま

Arenaria merckiioides Maxim.
(= *A. chokaiensis Yatabe.*)

高山ノ巖間或ハ砂礫地ニ生ズル多年生草本ナリ。根莖ハ細長ニシテ匍匐シ白色ヲ呈ス。莖ハ簇生シ細長ナル圓柱形ニシテ節間短ク、高サ5-10cm許ニシテ軟毛ヲ被フル。葉ハ對生シテ葉柄無ク、長卵形乃至長橢圓狀披針形ニシテ鈍頭ヲ有シ底部ハ短ク狭窄シ、全邊ニシテ質稍厚ク、而シテ短毛ヲ散生シ長サ1-3cm許アリ。八月ノ候莖上ニ腋生或ハ頂生シテ少數ノ有梗白花ヲ開ク。萼ハ五片、披針形ヲ呈シ長サ5-10mm、細毛ヲ布ク。花瓣モ亦五片、萼片ト略ボ同長ニシテ長卵形ヲ呈シ鈍頭ニシテ基部急ニ狹窄ス。十雄蕊。卵形ノ子房上ニ三花柱アリ。鳥海ふすまハ本種羽後鳥海山ニ生ズルヨリ此名ヲ得タリ、又雌阿寒ふすまモ北海道釧路ノ雌阿寒岳ニ産スルヲ以テノ稱ナリ、ふすまノ意ハ未ダ詳ナラス。

第 1779 圖

なでしこ科

