

第 1822 圖

ひ
ゆ
科



あをびゆ

Amaranthus retroflexus L.

明治年間ニ外來シ今ハ隨處ニ歸化植物ト成リテ生ズル高サ2m内外ノ大形一年生草本。全株短毛ヲ布ク。莖ハ高く直立シ硬直粗大ニシテ稜角ヲ有シ、枝條多く出デ秋ニ至レバ往々紅染スル者アリ。葉ハ互生シテ長柄ヲ有シ菱狀長卵形或ハ卵狀長橢圓形ニシテ長サ5-12cm許、全邊銳頭廣楔底ヲ成シ、平坦ナレドモ主脈ノミ上面ニ於テ陷凹セリ。晩夏初秋ノ候枝端葉腋ニ綠色ノ密集セル穗狀花序ヲ出ダシ、頂部ニテハ穗樣ノ圓錐花序ト成ル。花ノ外側ニハ芒樣ノ銳尖頭披針形綠色ノ苞アリテ花ヨリ高く尖リ、萼片ノ二倍長ナリ。雌雄異花。五萼片尖リテ綠色ヲ呈シ、花瓣無シ。五雄蕊。上位子房ハ短大ニシテ柱頭ハ三裂ス。蓋果ハ宿存萼ヲ伴ヒ横裂シテ帽狀ノ上半脫離シ黑色れんず形ノ細子ヲ入ル。本種ハ元來熱帶亞米利加ノ原産ナリト云フ。嫩葉ハ食シ得ベシ。和名ハ青莧ナリ蓋シ其俗稱 Green Amaranth ヲ譯シテ和名ト爲セシナラン。

第 1823 圖

ひ
ゆ
科



はげいとう (鴈來紅)

Amaranthus tricolor L.

(= *A. gangeticus* L.; *A. melancholicus* L.)

舊ク我邦ニ渡來シ觀賞植物トシテ庭園ニ栽植スル熱帶亞細亞原産ノ一年生草本ナリ。莖ハ直立シテ頗ル粗大、高サ凡1.5mニ達シ圓柱形淡綠色ニシテ無毛ナリ。葉ハ其數多く相接近シテ莖ヲ通ジテ互生シ、長葉柄ヲ有シテ開出シ、葉形ハ種々ニジテ菱狀卵形・長橢圓狀披針形乃至線形(近來渡來)ヲ呈シ、概ネ銳尖頭ヲ成シ、底部狹窄シ全邊ニシテ紅色・黃色等ノ斑ヲ有シ甚ダ華麗ナリ。夏秋ノ間、葉腋竝ニ梢上ニ淡綠色又ハ淡紅色ノ細花ヲ密着ス。苞ハ萼ト略ボ同形同大ニシテ先端芒狀ヲ成ス。萼ハ三片、卵狀披針形ニシテ先端芒狀ニ尖リ、長サ3mm許。三雄蕊。一雌蕊。蓋果ハ卵狀橢圓形ニシテ宿存セル萼ヨリ短ク、先端ニ二、三ノ突起ヲ有シ、横斷シテ開裂シ帽狀ノ上半ハ脫離ス、内ニ一種子ヲ入ル。和名ハ葉鶏頭ノ意、本品けいとうニ類シテ其葉殊ニ美觀ナルヲ以テ斯ク云フ。

第 1824 圖

ひ
ゆ
科



ひもげいとう (老鎗穀?)

一名 せんになてく

Amaranthus caudatus L.

今ヨリ凡百餘年以前ニ我邦ニ渡來シ庭園ニ栽植セル熱帶地方原産ノ一年生觀賞草本ナリ。莖ハ粗大ニシテ直立シ高サ90cm許ニ及ビ、微稜ヲ有シ、紅色ヲ帯ビ、上部ニ微毛アリ。葉ハ互生シテ長柄ヲ有シ、菱狀卵形乃至菱狀披針形ニシテ先端稍尖リ底部楔形ヲ成ス。夏秋ノ間、莖頂竝ニ上部葉腋ヨリ長く下垂セル花序ヲ成シ、紅色時ニ白色ノ細花ヲ密着ス。苞ハ卵形ニシテ先端長芒ヲ有シ、萼ヨリ稍長シ。萼ハ五片、長橢圓形ニシテ銳尖頭、長サ2mm許。五雄蕊。一雌蕊。蓋果ハ橢圓形ニシテ宿存セル萼ヨリ長ク、先端ニ短キ三突起ヲ有シ、横斷開裂ヲ成シ帽狀ヲ呈セル上半ハ脫落ス。種子ハ白色扁圓ニシテ周邊紅色ヲ呈シ、食用トスベシ。和名ハ紐鶏頭ノ意ニシテ其花穗ノ狀ニ基キ稱ナリ、仙人穀ハ仙人ノ食スル穀實ノ意ナリ。

けいとう (鶏冠)

Celosia cristata L.

舊ク我邦ニ入り觀賞花草トシテ普ク庭園ニ栽培セル一年生草本ニシテ蓋シ亞細亞熱帶地ノ原産ナラント謂フ。莖ハ直立シ高サ90cm許ニ達シ、硬直ニシテ毛ナク往々紅色ニ染ム。葉ハ互生シテ長柄ヲ有シ、卵形或ハ卵狀披針形ニシテ銳尖頭、底部通常短ク狹窄シ、長サ5-10cm許。通常其花軸帶化シテ上緣部顯著ナル鶏冠狀ヲ呈シテ小鱗片多く、其下部兩面ニハ無數ノ細花ヲ密ニ布生ス。夏秋ノ候開花シ、赤・紅・黄・白等種々ノ色アリ美麗ナリ。萼ハ五片、廣披針形ニシテ銳尖頭、長サ5mm内外。五雄蕊アリテ萼ヨリ短ク、花絲ノ基部ハ合體ス。一雌蕊ニシテ子房ニハ長花柱アリ。蓋果ハ卵形ニシテ宿存萼ヲ伴ヒ横斷開裂ヲ成シ帽狀ノ上半ニハ細長ナル一花柱ヲ遺存シ、内ニ三乃至五箇ノ光澤アル黑色ノ種子ヲ藏ス。和名ハ鶏頭ノ意ニシテ其花頭ノ鶏冠ヲ有スル牡鶏ノ頭ニ擬セシ名ナリ。種中ニちやぼげいとう・やりげいとう・みだれげいとう・さきわけげいとう等數異品アリ。

第 1825 圖

ひ
ゆ
科



第 1826 圖

ひ
ゆ
科




のげいとう (青箱)

Celosia argentea L.

暖地ニ自生シ又時ニ栽植セル一年生草本ナリ。莖ハ直立シ高サ80cm内外、圓柱形ニシテ條ヲ印シ無毛ナリ。葉ハ互生シ葉柄ヲ有シ、披針形或ハ卵狀披針形ニシテ銳尖頭ヲ成シ全邊ニシテ質軟カナリ。夏秋ノ候、梢上長枝端ニ太キ穗狀花序ヲ成シ、多數ノ淡紅色小花ヲ密着ス。苞ハ萼ヨリ遙ニ短シ。萼ハ五片、長橢圓形ニシテ銳尖頭、長サ8mm内外、乾皮質ニシテ花後白色ヲ呈ス。五雄蕊アリテ萼ヨリ短ク、花絲ハ其下部相聯合ス。一雌蕊ニシテ子房ハ直立セル長花柱ヲ有ス。蓋果ハ卵形ニシテ宿存セル萼ヨリ短ク、横斷開裂ヲ成シ、頂部ノ長花柱ヲ遺存セル帽狀ノ上半部ハ脫落シ、内ニ數箇ノ種子ヲ容ル。人或ハ之レヲけいとうノ原種ト考定スト雖モ否ラザルノ證アリト謂フ。和名ハ野雞頭ニシテ野生ノけいとうノ意ナリ。

第 1827 圖

あ
か
ざ
科



をかひじき

一名 みるな

Salsola Komarovi Iljin.

我邦諸州ノ海濱砂地ニ自生スル綠色ノ一年生草本ナリ。莖ハ通常斜臥シテ擴ガリ、下部ヨリ多クノ枝ヲ分チ、長サ10-40cm許、初メ柔脆ナレドモ老ユレバ硬強ナル質ト成ル。葉ハ肉質ニシテ互生シ、瘦線狀圓柱形ヲ成シ、葉端ハ尖リテ小刺ヲ成シ、後チ漸次ニ強硬ト成リ、長サ1-3cm許アリ。夏ニ至テ葉腋ニ淡綠色無梗ノ一小花ヲ開ク。花下ヲ擁スル二片ノ小苞ハ卵狀鉞形ヲ呈シ先端小刺ヲ成シ老ユレバ強剛ト成ル。萼ハ五片、狹披針形ニシテ尖リ質薄シ。五雄蕊アリテ萼ヨリ短ク約ハ黑色ナリ。一雌蕊ニシテ卵形種子房頂ノ短花柱ハ深く兩岐ス。胞果ハ上端角度ヲ成シテ内屈セル軟骨質ノ宿存萼ニ包マレ短倒卵形ニシテ上部截形ヲ呈シ宿存セル花柱ヲ伴フ、一種子アリテ胚ハ螺旋呈シ。嫩葉ヲ採リ茹ゲテ食用ニ供シ得ベシ、陸ひじきノ和名之レニ因テ起レリ、水松菜モ亦其綠葉ニ似タル故云フ。