



まだいろう

Rumex Daiwoo Makino.


山足或ハ山間ノ水傍ニ生ズル大形ノ多年生草本ニシテ高サ1m内外。根ハ黄色ニシテ大形肥厚ス。莖ハ粗大ニシテ直立シ緑紫色ニシテ縦溝線多ク上部疎ニ分枝ス。根葉ハ長大ニシテ長柄ヲ有シ、托葉ハ膜質、葉面ハ卵形或ハ卵狀長橢圓形ヲ成ス。莖葉ハ互生シ卵狀披針形ヲ成シ、上部ニ至ルニ從ヒ漸次ニ小さク、遂ニ苞葉ト成ル。夏日開花シ、圓錐花穂ハ疎ニシテ花軸ハ往々多少彎曲ス。花ハ綠色或ハ帶紫綠色ヲ呈シ小ニシテ小梗ヲ有シ穂軸上ニ輪生シテ各輪互ニ相離ニスルコト多シ。六萼片アリテ花瓣無シ。六雄蕊。一子房頂ニ三花柱アリテ柱頭ハ毛狀。瘦果ハ三稜ニシテ茶褐色ヲ呈シ多クハ種子成熟セズ。宿存增大セル内列萼三片ハ紅紫色ト成リ、内部ニ三稜卵形ノ瘦果ヲ籠シ、外ニ背瘤無ク或ハ辛ジテ之レヲ見ルニ過ズ。民間時ニ藥用ノ大黃ト誤認スルコトアリ、即チ種名ノ Daiwoo ハ之レニ基ク。和名ハ眞大黃ノ意ニシテ眞正ノ大黃ノ如ケレドモ是レ元來誤認ニ出デシ名稱ニシテ固ヨリ大黃ノ眞物ニハ非ズ。漢名 土大黃(誤用)



たかねすいば

Rumex montanus Desf.

中部以北ノ高山帯ニ生ズル雌雄異株ノ多年生草本。全株瘦瘠シ平滑ニシテ淡綠色ヲ呈ス。莖ハ直立シ高サ30-50cm。葉ハ質柔クシテ薄ク莖葉ハ極メテ疎ニ互生シ多クハ短柄ヲ有シ長橢圓形或ハ卵狀ヲ帶ビ長サ5cm内外、先端尖リ底部ハ稍耳狀ノ戟形ヲ呈シ、葉縁ハ全邊ナレドモ上下ニ波皺シ、根葉ハ葉面短ク且ツ長柄ヲ具フ。夏日梢頭ニ黄綠色ノ細花ヲ開キ輪繖狀ヲ成シ相集リテ圓錐花穂ト成ル。萼六片アリテ花瓣無シ。雄花ニハ六雄蕊アリ。雌花ニハ一子房、三花柱アリテ柱頭ハ特殊ノ星芒毛狀ヲ呈ス。瘦果ハ三稜様ノ卵狀長橢圓形ヲ成シ、之レヲ包メル宿存内列三萼片ハ稍圓形全邊ノ翼狀ト成リ質菲薄ニシテ綠褐色ヲ呈シ背面ノ脚部ニ小瘤點ノ存スルアリ。和名ハ高嶺酸模ニシテ此種高山ニ生ズルヨリ斯克云フ。




つちとりもち

一名 やまでらばうざ

Balanophora japonica Makino.

(=Balania japonica Van Tieghem.)

我邦暖地ノ山地樹陰ニ生ズル多年生寄生草本。雌雄異株ナレドモ敢テ雄本ヲ見ズ。高サ7-10cm許、はひのき屬ノ樹根端ニ寄生ス。根莖ハ肥厚粗大ニシテ大小不齊ナル球狀塊ニ分裂シ淡黄褐色ニシテ大ナル淡白色ノ痂點ヲ疎布ス。花莖ハ多肉ニシテ開口セル根莖頂ヨリ直立シ、大ナル肉質鱗片鱗次シ共ニ柑赤色ヲ呈ス。花穂ハ單一ニシテ肥厚シ、卵狀橢圓形或ハ長橢圓狀卵形、時ニ卵圓形ヲ成シ、深赤色ヲ呈シ、穂面ニ細微黄色ノ雌花ヲ無數ニ密布シ、其花間ニ赤色倒卵圓形ノ一體ヲ交エ其數多クシテ穂面ヲ覆ヒ花ハ之ニ被ラレテ見エズ。子房ハ有柄ニシテ橢圓形ヲ成シ一卵子ヲ容レ上ハ長花柱トナル。花候ハ十一月。根莖ヨリ鳥糞ヲ製ス。本種ハ雌本アリテ雄本ナシ然モ能ク種子ヲ生ジ單性生殖ヲ營ム適例ノ一トス。和名ハ土鳥糞ノ意ニシテ其根莖ヲ搗糜シテ鳥糞モチヲ製ス故ニ斯克云フ、又山寺坊主ハ此種山中ニ生ジ其穗形坊主頭ノ如ケレバ云フ。




みやまつちとりもち

Balanophora nipponica Makino.

(=Balania nipponica Masamune.)

諸州ノ深山樹陰ニ生ズル多年生寄生草本。雌雄異株ナレドモ獨リ雌本ノミニテ雄本ナシ。高サ10-14cm許。黄赤色。根莖ハ特ニ肥大セル樹根ノ末端ニ寄生シ、多クノ球狀塊ニ分裂シ、黄褐色ニシテ小ナル痂點ヲ散布ス。花莖ハ開口セル根莖頂ヨリ直立シ、肉質ニシテ大ナル鱗片疎ニ鱗次シテ之レヲ被フ。花候ハ秋時。花穂ハ卵狀長橢圓形ニシテ肥厚、長サ4.5cm許、黄色ニシテ満面ニ無數細微ノ雌花ヲ密布シ、花間ニ倒卵圓形ノ一體ヲ多數ニ交ユ。子房ハ短柄アリ紡錘狀橢圓形ニシテ一卵子ヲ藏シ、頂ハ長花柱ト成ル。本種ハ單ニ雌本ノミナルモ單性生殖ヲ成シテ尙能ク種子ヲ結ビ繁殖ス。和名ハ深山土鳥糞ノ意ナリ、土鳥糞ノ解ハつちとりもちノ條下ニ在リ。



きいれつちとりもち

一名 とべらにんぎやう

Balanophora tobiricola Makino.

(=Balaneikon tobiricola Setchell.)

樹下ニ生ズル多年生寄生草本。雌雄同株ナリ。高サ3-10cm許、とべら(或ハしゃりんばい)ノ根端ニ寄生ス。根莖ハ肥厚ニシテ數塊集合シ、黄色ヲ呈シ、痂點ナシ。花莖ハ直立或ハ傾上シ、多肉ニシテ淡黄色ノ鱗片鱗次ス。花候ハ十、十一月。花穂ハ白色、卵狀長橢圓形或ハ卵形ヲ成シ、穂面ニ細微ナル無數ノ雌花ヲ密布シ、花間ニ倒卵圓形ノ一體ヲ多數ニ交ユ、且ツ大ナル雄花ヲ疎ニ穂面ニ散點ス。雄花ハ有柄、花蓋三片アリテ花心ニ無柄ノ三葯ヲ具ヘ、花粉白シ。雌花ノ子房ハ無柄或ハ有柄ニシテ橢圓形ヲ成シ中ニ一卵子ヲ容レ、頂ニ長花柱アリ。九州ニ産ス。本品ハ蓋シ琉球産ノ B. Wrightii Makino ト同種乎、否乎。和名ハ喜入土鳥糞ノ意ナリ、喜入ハ薩摩指宿郡ノ一地名ニシテ本品初メ此地ニ於テ採集セルル由テ其名ヲ得タリ、とべら人形ハ此種とべらノ根ニ寄生シ其形貌人形ノ如ケレバ斯克云フ。



りうきうつちとりもち

Balanophora Kuroiwai Makino.

八重山島ニ産スル多年生寄生草本。高サ10cm許、簇生シ、雌雄同株ニシテ黄赤色ヲ呈ス。地下莖ハ塊ヲ成シ、不齊ニ分裂シテ痂點無シ。花莖ハ根莖ノ頂ヨリ直立シ、肥厚ニシテ疎ニ鱗片ヲ以テ被ハル。秋時、花穂ハ黄色(?)、球形ヲ呈シ、細微ナル雌花無數ニ穂面ニ密布シ、花間ニ有柄ノ倒卵圓形ヲ多數ニ交ユ。雄花ハ花穂ノ下縁ニ群着シ、花體頗ル大ナリ、有柄ニシテ花蓋四片、時ニ三片アリ。葯四、時ニ三アリテ、花絲ハ合一シ、短大ナリ。雌花ノ子房ハ有柄、橢圓形ニシテ一卵子ヲ容レ、上ニ長花柱アリ。本品ト酷似セル一種ニシマつちとりもち一名ヤヘヤまつちとりもちアリ、亦八重山島ニ産シ花穂卵形或ハ短キ長橢圓形ヲ成スノ差アリ、學名ヲ B. fungosa Forst. ト云フ。和名ハ琉球土鳥糞ニシテ本種琉球ニ産スレバ斯克云フ。