

第 1966 圖

ぶな科



あらかし
Quercus glauca Thunb.

中部以南ノ山野ニ極テ普通ナル常緑喬木ニシテ高サ 10-20m. 樹皮ハ帯緑暗灰色ニシテ裂罅ヲ生ゼズ。葉ハ有柄互生、廣楕圓形或ハ倒卵狀楕圓形、長サ5-10cm. 革質ニシテ表面滑澤、裏面ハ灰白色、假毛アレドモ無毛平滑ニ見エ、上半部ニノミ鋭鋸齒アルコト多シ。新葉ハ絹様ノ軟毛ヲ被ルト雖モ暫クスレバ落チ去ル。四月新葉ノ開舒ト共ニ開花色。雌雄同株。雄花葉裏ニハ新枝下部ノ鱗片腋ニ下垂シ長サ5-10cmアリテ總軸ニハ白毛アリ。雄花ニハ一苞并ニ三萼片ト黄葯ノ雄蕊十五六箇トアリ。雌花モ同ジク新枝ノ中部葉腋ニ生ジ短梗上ニ頭狀ヲ成シ、花數二三ニシテ小ナリ。花柱ハ花體ヨリ挺出シ、三裂ス。堅果ハ球狀楕圓形長サ2cm内外、先端尖リ、晩秋熟シテ脱落ス。殼斗ハ碗狀ヲ呈シ、數段ノ輪狀ヲ成シテ鱗片排列ス。材ヲ諸用ニ供シ木炭ニ可シ。本種ハ關西地方ニ最も多ク同方面カシ類ノ代表者ニシテ單ニ之ヲカシト呼ベリ。和名ハ蓋シ粗カシノ意ニシテ其枝ハ粗強其葉ハ粗大硬質ナレバ此ク云フナラン。カシノ意不明、一説ニカシハカシノ略ト略ト言ヘド首肯シ難シ、カシハ一ニカシト稱スルヲ以テ堅木ヲ合シテ樞ノ和字ヲ作りカシト訓ゼリ。漢名 柁・櫛 (共ニ誤用)、櫛ハ支那産常緑カシノ一種ノ名ナリ。

第 1967 圖

ぶな科



よこめがし
一名 しまがし
Quercus glauca Thunb.
var. fasciata Blume.

(=Q. striata Sieb. ;
Q. glauca var. striata Makino.)
あらかしニ屬セル園藝の一變種ニシテ觀賞樹ノ一種トシテ偶ニ庭園ニ栽植セラルルノミ、未ダ野生ノ者ヲ見ズ。幹ハ直立シテ硬直ナル枝極ラ分チ新枝ニハ初メ褐色ノ軟毛ヲ布ク。葉ハ互生シテ葉柄ヲ有シ、倒卵狀長楕圓形・長楕圓狀披針形ニシテ先端鋭尖頭ヲ成シ、底部ハ廣楔狀銳形ヲ呈シ、邊緣上過半部ニ鋭頭ノ粗鋸齒アリテ齒端硬化シ、長サ5-10cm許、質厚クシテ硬ク、上面綠色ヲ呈シ斜上シテ走レル多數支脈ノ間ニ特ニ帶白色ノ雲紋アリテ帶ヲ成シ、下面ハ粉白色ヲ帶ビテ伏臥毛アリ。葉柄ハ長サ1-1.5cm許アリ。枝上時ニ正葉即チ尋常葉ヲ出スコトアリ。和名横目がしハ葉面ニ横走セル條紋アルヨリ云ヒ、縞がしモ亦條紋ノ模様アルヨリ云フ。

第 1968 圖

ぶな科



ひりゅうがし
Quercus glauca Thunb.
var. lacera Matsum.

(=Q. lacera Blume.)
あらかしニ屬セル園藝の一變種ニシテ偶ニ庭園ニ栽植セラルルノミニシテ敢テ其野生品ヲ見ルコト無シ。幹ハ立チテ分枝シ枝條ハ瘦長ナリ、新枝ニハ初メ褐色ノ軟毛ヲ密布ス。葉ハ互生シテ葉柄ヲ有シ、倒卵狀倒披針形・長楕圓狀披針形或ハ披針形ニシテ先端尾狀ニ尖リ、底部ハ楔形ヲ呈シ、邊緣ハ全邊ナル下部ヲ除テ深く羽狀ニ剪裂シ裂片ハ鉞狀ヲ成シテ鋭尖頭ヲ有シ、長サ5-10cm 許、質稍厚ク、上面綠色ニシテ光澤アリ、下面ハ粉白色ヲ帶ビテ伏臥毛アリ、支脈ハ羽狀ヲ成シテ斜上シ、葉柄ハ短シ。和名ハ飛龍がしニシテ其葉形ニ基キテ斯克云フ。

第 1969 圖

ぶな科



あかがし
一名 おほがし・おほばがし
Quercus acuta Thunb.

(=Cyclobalanopsis acuta Oerst.)
我邦中部南部ノ山地ニ多キ常緑喬木ナレドモ又往々人家附近ニ栽植セラル。幹ハ直立シテ枝葉繁ク、大ナル者高サ20m許、徑60cm餘ニ達シ、新枝ニハ褐色ノ軟毛ヲ密布ス。葉ハ有柄互生シ、長卵形乃至長楕圓形ニシテ先端急ニ鋭尖頭ヲ成シ、底部楔形或ハ圓形、全邊或ハ上部ニ少數ノ鈍齒アリ、長サ6-15cm許、質厚ク、嫩葉ニハ褐綿毛ヲ密布スルモ後兩面共平滑ト成ル。雌雄同株ニシテ五月開花シ、雄花ノ葉裏花隱ハ新枝ノ下方ニ生ジ多數ノ有苞細花ヲ着テ長ク下垂シ褐色ヲ呈シ、雌花隱ハ上部葉腋ニ生ジテ直上シニ乃至五ノ雌花ヲ着ケ、雄花隱ト共ニ褐軟毛ヲ被ル。雄花ハ萼片六深裂シテ多雄蕊アリ。雌花ハ密毛アリ總苞ニ包マレテ三花柱ヲ有ス。堅果ハ年々越エテ成熟シテ六乃至七層ノ横輪ヲ有シ、褐綿毛ヲ布ク。木材ハ堅クシテ帶赤色ヲ呈シ利用多シ。和名あかがしハ其材色ニ基キ、大がしハ其粗大ナル樹容ニ由リ、大葉がしハ其葉ノ壯大ナルヲ以テ斯克云フ。漢名 血櫛 (誤用)

第 1970 圖

ぶな科



つくばねがし
Quercus paucidentata Franch.
(=Cyclobalanopsis paucidentata
Kudo et Masam.)

我邦中部南部ノ山地ニ生ズル常緑喬木。幹ハ直立シテ往々大木ト成リ高サ20m、徑60cm 許ニ達ス。葉ハ樹上ニ繁ク通常短柄ヲ有シテ互生シ長楕圓狀倒披針形、長サ10cm内外、先端ハ急ニ短キ鋭尖頭ト成リ底部ハ鈍形或ハ銳形ヲ呈ス、全邊ナレドモ獨ダ上部ニノミ鋸齒アリ、強剛ナル革質ニシテ毛無ク表面滑澤ニ富ム。雌雄同株ニシテ四月開花シ、新枝ノ下部ヨリ雄花ノ褐黃色葉裏花隱ヲ垂ル。雌花隱モ亦新枝上部ノ葉腋ニ出デ短總軸アリ。雄花ハ苞ヲ伴ヒ萼四乃至七深裂シ多數ノ雄蕊アリ。雌花ハ總苞ニ包マレテ三花柱アリ。堅果ハ楕圓形ニシテ長サ1.5cm内外、秋ニ熟シ濃褐色ニシテ縦線ヲ印ス。本種ハ頗ル能クあかがしニ酷似シ、往々其中間型アリテ其識別時ニ困難ナレドモ一般ニ葉柄短ク葉狭ク且其上部ニ鋸齒ヲ伴フヲ以テ分ツベシ。和名ハ葉ノ小枝端ニ四出スルノ狀尙羽根即チ羽子ニ似タレバ云フ。

第 1971 圖

ぶな科



うらじろがし
Quercus stenophylla Makino.
(=Q. glauca Thunb.
var. stenophylla Blume.)

中部以南ノ山地ニ生ズル常緑喬木。幹ハ直立シテ多枝繁葉、往々大樹ト成リテ高サ20m、徑1m 許ニ達ス。葉ハ有柄互生シ披針形或ハ長楕圓狀披針形ニシテ先端ハ尾狀ニ尖リ底部ハ銳形ヲ呈シ、長サ10-15cmアリ、上部ニノミ鋭尖鋸齒アリ、具ハ、稍薄キ革質ニシテ表面滑澤、裏面ハ蠟質ヲ分泌平布シテ白色ヲ呈ス。嫩葉ハ絹毛ヲ被リ長ズレバ脱落ス。雌雄同株。五月、新枝ノ基部ヨリ黄色ノ細長ナル雄花葉裏花隱ヲ垂ル。雌花隱ハ新枝ノ葉腋ニ短總軸ヲ成シテ立ち、三四花ヲ着ク。雄花ハ三四萼片四乃至六雄蕊アリ。雌花ハ總苞ニ包マレテ三花柱アリ。堅果ハ晩秋ニ熟シ廣楕圓形或ハ卵狀廣楕圓形ニシテ濃褐色ヲ呈シ、殼斗ハ灰褐色ノ碗狀ニシテ外面ニ横輪ヲ匝ラス。材ヲ諸用ニ供ス。和名裏白がしハ其葉裏特ニ白色ヲ呈スルヲ以テ斯克云フ。