

かばのき科



はしばみ (榛)
Corylus heterophylla Fisch.
var. *Thunbergii* Blume.

向陽ノ丘阜地ニ生ジ又往々人家ニ栽植セラルル落葉
灌木ニシテ灌生シ、幹ノ大ナル者高サ5m、徑9cm許ア
リ。葉ハ互生シテ葉柄ヲ有シ、廣倒卵形又ハ略ボ圓形
ニシテ先端急ニ鋭尖頭、底部心臟形ヲ成シ、葉縁ハ淺
キ缺刻ヲ有シ不齊ノ細鋸齒アリ、葉質稍薄クシテ下面
ニ短毛ヲ有シ、長サ6-12cm、幅5-12cm許アリ、嫩葉ハ
早落托葉ヲ有シ、其葉面往々紫斑アリ。雌雄同株。三月
葉ニ先テ開花ス。雄花ノ葉莖總ハ一乃至數條小枝上
ヨリ下垂シ長紐狀ヲ成シテ黃褐色ヲ呈ス。雄花ハ苞鱗
内ニ一箇アリテ二小苞ヲ有シ、萼ヲ缺キ、八雄蕊アリ。
雌花總ハ小ニシテ稍卵形ヲ呈シ小枝ニ着テ上向シ無
柄ニシテ芽鱗片之レヲ擁シ十餘ノ鮮紅色花柱ヲ束出
ス。雌花ハ各苞鱗内ニ二箇アリテ各一子房二花柱アリ
。堅果ハ稍球狀ヲ成シテ堅ク、鐘狀ヲ成セル葉狀ノ
二總苞片之レヲ包ミ、苞片ハ先端數裂ス。果實ヲ食用
トス。和名ハ葉面ニ皺アレバ葉皺即チはしむノ轉ト
謂ヘドモ信ジ難キ感アリ、元來此木ハ果實ヲ主トスル
者ナレバ榛柴實ノはりしばみトスル説ハ葉説ニ優レ
リ、按ズルニ或ハ葉柴實ノ意乎。

かばのき科



つのはしばみ
一名 ながはしばみ
Corylus Sieboldiana Blume.

(= *C. rostrata* Ait. var. *Sieboldiana* Maxim.)
山中ニ生ズル落葉灌木ニシテ幹ハ直立シテ分枝シ多
クノ葉ヲ着ク、其大ナル者ハ高サ5m、徑12cm許、新枝
ニハ毛アリ。葉ハ互生シテ葉柄ヲ有シ、倒卵形乃至橢
圓形ニシテ鋭尖頭、底部ハ圓形又ハ廣楔形ヲ成シ、邊
縁ニ不齊ノ重鋸齒アリ、上面ハ脈間下面ハ脈上ニ葉柄
ト同ジク毛ヲ有ス。雌雄同株。三月新葉ニ先ンジテ開
花ス。雄花ノ葉莖總ハ數條アリテ小枝ヨリ長ク下垂シ
褐赤色ヲ呈シ多數ノ細花ヲ密着シ紐狀ヲ成ス。雄花ハ
苞鱗内ニ一箇アリテ八雄蕊ヲ有ス。雌花總ハ小ニシテ
卵形ヲ成シ無柄ニシテ小枝上ニ着キ芽鱗片之レヲ擁
シ上ニ鮮紅色ノ花柱ヲ束出ス。雌花ハ苞内ニ二箇ア
リテ各一子房二花柱アリ。堅果ハ卵形ニシテ尖リ、總
苞之レヲ包ミテ其底ニ在リ、總苞ハ無柄ニシテ小枝端
ニ一乃至五箇簇着シ卵圓形ニシテ前方ハ長嘴狀ノ筒
ト成リ多少弓曲シロ端分裂シ綠色厚質ニシテ外面
ニ剛毛ヲ密生ス。山人此果ヲ採リ食用トス。和名角榛ハ
嘴ノ如キ總苞ノ狀ニ基ツク、長榛モ亦同ジク其長キ總
苞形ニ由リテ云フ。

かばのき科



あさだ
Ostrya japonica Sarg.

(= *O. virginica* Willd. var. *japonica* Maxim.)
邦内諸州ノ山中ニ生ズル落葉喬木、幹ハ直聳シ
其大ナル者ハ高サ17m、徑60cm許ニ達ス。葉ハ
互生シ葉柄ハ粗毛アリ、卵形或ハ卵狀橢圓形
ニシテ長サ5-10cm、先端ハ鋭尖形、葉底ハ歪圓
形乃至銳形、邊緣不整ノ齒牙狀鋸齒ヲ匣ラシ、
下面ニハ橙赤色ノ腺毛ヲ交ヘシ軟毛ヲ密布ス。
雌雄同株。五月、葉未ダ舒ビズシテ開花ス。雄
花ノ葉莖總ハ無柄ニシテ前年枝ノ先端ニ懸垂シ
長サ3cm内外、圓紐狀ニシテ褐黃色、多數ノ細
花ヨリ成ル。雄花ハ密細毛ニ富メル腎臟形ノ苞
鱗内ニ在リテ多雄蕊アリ。雌花總ハ本年ノ新枝
端ニ生ジ短梗ヲ有シテ上向ス。雌花ハ多毛アル
苞鱗内ニ二箇アリテ各一子房二花柱アリ。果總ハ長橢
圓形ニシテ稍懸垂シ長サ4-5cm許アリ、增大シテ
鱗次セル苞鱗ハ卵狀橢圓形ニシテ基部ハ増大狀ヲ
成シ其内側ニ淡黑色ノ小堅果ヲ抱ク。和名あさ
だノ意不明ナリ。

かばのき科



いぬしで
一名 しろしで・そね
Carpinus Tschonoskii Maxim.
(= *C. yedoensis* Maxim.)

山地或ハ平地ニ生ズル落葉喬木、幹ハ直立シテ樹暗褐色ヲ
呈シ、其大ナル者ハ高サ14m、徑60cmニ達シ、新枝ニハ毛ヲ密
生ス。葉ハ二列ヲ成シテ互生シ葉柄ヲ有シ、卵形乃至橢圓形
ニシテ鋭尖頭、底部圓形又ハ鈍形、邊緣ニ不齊ノ重鋸齒アリ、
兩面長軟毛ヲ有シ、支脈ハ顯著ニシテ十乃至十五對アリ羽狀ヲ
成シテ斜ニ平行ス。雌雄同株。五月新葉ニ先テ開花ス。雄花
ノ葉莖總ハ小枝端ヨリ長ク下垂シ圓紐狀ニシテ褐黃色ヲ呈
シ、苞鱗ハ卵狀心臟形ニシテ鋭頭ナリ。雄花ハ每苞鱗内ニ一花
ヲ有シ數雄蕊アリテ花絲ハ二岐シ葯ハ先端ニ長鬚毛ヲ有ス。
雌花總ハ新枝ニ頂生シテ傾斜シ淡綠色ヲ呈ス。雌花ハ每苞鱗
内ニ二箇ヲ有シテ小苞ヲ具ヘ各一子房二花柱アリ。果總ハ長
サ4-8cm許アリ柄ヲ有シテ下垂シ葉狀ト成レル綠色苞ヲ稍疎
ニ着ク、苞ハ長サ2-3cm、斜披針形又ハ半卵形ヲ呈シ多少曲
リテ鐘形ヲ成シ其内側ニハ鋸齒ヲ有シ、基部ニ小耳垂アリ。小
堅果ハ廣卵形ニシテ鋭頭、長サ5mm許アリ。和名 犬しでノ犬
ハ其葉花總ニ基キテ云ヒシナラン乎、しでニ就テハあかし
でノ條下ヲ見ルベシ、白しでハ其芽并ニ新葉ニ白毛多クケレバ
云フ、そねノ意ハ不明ナリ。

あかして

一名 しでのき・こしで・そろのき・こそね
Carpinus laxiflora Blume.
(= *Distegocarpus laxiflora* Sieb. et Zucc.)

山地并ニ平地ニ生ズル落葉喬木、幹ハ直立シテ枝多ク葉繁シ、
其大ナル者ハ高サ14m、徑60cm許アリ。樹皮ハ平滑、小枝ハ
細長、新枝ハ初メ毛アルモ後略ボ無毛ト成ル。葉ハ小ニシテ
互生シ葉柄アリ、卵形乃至長橢圓形ニシテ鋭尖頭、底部概ネ
圓形ヲ成シ、邊緣ニ不齊ノ細鋸齒アリ、初メ毛ヲ有スルモ後
薄澤ト成リ下面脈上ニミモヲ殘留シ、葉質ハ薄シ、支脈
ハ七乃至十五對アリテ斜ニ平行シ羽狀ヲ成ス。雌雄同株。五月
新葉ニ先テ開花ス。雄花ノ葉莖總ハ小枝ヨリ下垂シ紅褐色
ヲ呈シ短キ圓紐狀ヲ成シ苞鱗ハ卵圓形ヲ呈ス。雌花ハ苞内
ニ一箇アリテ八雄蕊ヲ有シ花絲ハ兩岐ス。雌花總ハ有柄綠色
ニシテ疎ニ花ヲ着ケ上向ス。雌花ハ尖リタル苞鱗内ニ二箇ア
リテ小苞ヲ伴ヒ各一子房二花柱アリ。果總ハ長柄ヲ有シテ
小枝端ヨリ下垂シ長サ3-8cm許、堅口疎ニ苞ヲ着ク。苞ハ葉狀
ト成リテ綠色ヲ呈シ長サ1.2-2cm許、三裂シ、中裂片ハ披針形
ニシテ一側ニ粗齒アリ、側片ハ小サク其一片ハ小堅果ヲ抱ク。
小堅果ハ廣卵形ニシテ長サ3mm許アリ。和名赤しでハ此種新
しでのきハ木、しでハ木々其明解ヲ見ザレドモ是レ或ハ其
繁茂セル枝ヨリ盛ンニ多數垂下スル果總ノしだれる姿ニ觀テ
斯ク名ケシニ非ザル乎即チしだれハ縮マバしでト成ルナリ、
或ハ又其垂下セル果總ノ四手(木柄或ハ紙ヲ用ク)ニ似タレバ
云フトモ考ヘ得ベシ、小しでハ其葉小形ナルヨリ云フ、そろ
のきノそね其意不明、小そねノそねモ亦不詳ナリ。

くまして

一名 おほそね・いしそね・かたしで
Carpinus carpinoides Makino.
(= *Distegocarpus carpinoides* Sieb. et Zucc.;
D. *Carpinus* S. et Z.; C. *Carpinus* Sarg.;
C. *Distegocarpus* Koidz.; C. *japonica* Bl.)

山中ノ林樹ニ交ハリテ生ジ或ハ平地ニ見ル落葉喬木。幹ハ直
立シ其大ナル者ハ高サ14m、徑60cmニ達シ、新枝ニハ軟毛ヲ
布ク。葉ハ二列ヲ成シテ互生シ、葉柄ヲ有シ、長橢圓形又ハ
披針狀長橢圓形ニシテ鋭尖頭、底部多少心臟形ヲ成シテ左右
不齊、邊緣ニ重鋸齒ヲ有シ、幅2-4cm許、支脈ハ十六乃至二
十四對アリテ斜ニ平行シ羽狀ヲ成シテ葉縁ニ達シ顯著ナリ、
而シテ脈上ニ長毛ヲ布ク。雌雄同株。五月新葉ニ共ニ開花ス。
雄花ノ葉莖總ハ無柄ニシテ小枝ヨリ下垂シ紐狀ニシテ褐黃色
ヲ呈シ多數ノ尖リタル苞鱗ト細花トヨリ成ル。雄花ハ尖リタル
卵形ノ苞鱗内ニ一箇アリテ雄蕊多ク花絲ハ兩岐ス。雌花總
ハ新枝ニ頂生シ上向シテ綠色ヲ呈シ密ニ雌花ヲ着ク。雌花ハ
苞鱗内ニ二箇アリテ各一子房二花柱アリ。果總ハ大形ニシテ
長橢圓狀圓柱形ヲ成シ葉狀ト成レル苞鱗ヲ密生シ、苞鱗ハ斜
卵形ニシテ鋭頭、長サ1.5-2cm許、邊緣ニ粗齒アリ、小堅果ハ
卵形又ハ橢圓形ニシテ長サ3-5mm許アリ。和名熊しでハ樹勢
強壯ナルヨリ謂フ乎、大そねモそね即チいぬしでヨリ大ナル
故云ヒ、石そね并ニ堅しでハ共ニ其材堅クシテ炭ト作スニ
佳ナレバ云フト謂フ、而シテそねハ其意不明、しでハあかし
でノ條下ヲ見ルベシ。

かばのき科



かばのき科

