

第 2002 圖

かばのさき科



さはしば
Carpinus erosa Blume.
(= *C. cordata* Blume.)

中部北部ノ山地林中ニ生ズル落葉喬木ニシテ幹ハ直立シテ葉多ク、其大ナル者ハ高サ14m、徑60cm許ニ達シ、樹皮ハ淡緑灰色ヲ呈シ裂罅アリ、枝ハ褐色ヲ帯ビ平滑、新枝ハ初メ疎毛ヲ布ク。葉ハ二列式ニシテ互生シ葉柄ヲ有シ、卵形乃至橢圓形ニシテ鋭尖頭、心臟底ヲ成シ、邊緣ニ細小ナル重鋸齒ヲ有シ、長サ7-12cm、幅3-6cm許、支脈ハ概ネ十四乃至二十二對ニシテ斜ニ平行シ葉緣ニ達シ羽狀ヲ成シ、脈上ニ毛アリ。雌雄同株。五月新葉ト共ニ開花ス。雄花ノ葉莖薄ハ緑黄色ヲ呈シテ小枝ニ下垂シ密ニ細花ヲ着ク。雄花ハ卵狀長橢圓形ノ苞鱗内ニ一箇アリテ四乃至八雄蕊ヲ有シ花絲ハ兩岐ス。雌花總ハ柄ヲ有シテ小枝頂ノ新枝頂ヨリ下垂シ密ニ細花ヲ着テ綠色ヲ呈ス。雌花ハ小ナル苞鱗内ニ二箇アリテ大形ナル小苞ヲ伴ヒ四五淺裂セル萼ヲ有シ一子房ニ花柱アリ。果總ハ柄ヲ有シテ小枝端ニ下垂シ大ニシテ綠色ヲ呈シ宿存増大セル小苞ハ葉狀ニシテ卵形、鋭頭、邊緣ニ鋸齒アリ、長サ2cm許、基部ニ小堅果ヲ抱ク。小堅果ハ橢圓形ニシテ長サ4mm内外アリ。和名澤しばハ此種好シク山間ノ谿地ニ生ズレバ云フ。和名澤しばハ此種好シク山間ノ谿地ニ生ズレバ云フ。

第 2003 圖

くるみ科



おにくるみ
一名 くるみ
Juglans Sieboldiana Maxim.

河流ニ沿フタル山野地ニ多ク生ズル落葉喬木ニシテ又各地ニ栽植セララルルヲ見ル。幹ハ直立シテ擴張セル枝ヲ分チ大ナル者ハ高サ24m、徑1m許ニ達シ、小枝ハ粗大ニシテ新枝ニハ黄褐色ノ軟毛ヲ密生ス。葉ハ互生シテ有柄、奇數羽狀複葉ニシテ九乃至十五箇ノ小葉ヨリ成リ、上面星毛ヲ疎生シ下面ニ密生シ、小葉ハ卵形乃至長橢圓形ニシテ鋭尖頭、側生者ハ無柄ニシテ底部圓形又ハ心臟形ヲ成シ左右不齊、邊緣ニ細鋸齒アリ、頂生ノ片ハ小柄ヲ有ス。五月新葉ト共ニ開花シ雌雄同株ナリ。雄花ノ葉莖薄ハ前年枝ノ葉腋ヨリ長ク下垂シテ綠色ヲ呈シ、各苞鱗ニ雄花ヲ着ケ二小苞アリ。雌花ハ三四裂セル萼ト十數箇ノ雄蕊トアリ。雌花總ハ新枝頂ニ直立シ、五乃至十箇ノ花ヲ疎生シ、苞ハ筒狀ニ癒合シテ花ヲ包ム。雌花ハ其萼四裂シ、一子房、紅色ノ二花柱アリ。核果ハ略球形ニシテ徑3cm許、果面ニ絨毛アリ、核ハ極メテ硬ク溝皺アリ、種子ハ褐色薄質ノ種皮内ニ肥厚白色ノ子葉アリ。材ハ小銃ノ藥木ニ佳ク、種子ハ食用トス。和名鬼くるみハ核面平美ナル鬼くるみに對シ其核面凹凸アリテ醜クケレバ斯ク云フ、くるみハくるくるト轉ガル圓實ノ意、又ハ朝鮮ヨリ來リシ其實ノ意ト謂ハル。漢名山胡桃(誤用)

第 2004 圖

くるみ科



さはぐるみ
一名 かはぐるみ・ふちぐるみ
Pterocarya rhoifolia Sieb. et Zucc.

諸州深山ノ谿間濕潤地ニ生ズル落葉喬木。幹ハ聳立シテ樹皮ハ暗色ヲ帯ビ、大ナル者ハ高サ27m徑1m許ニ達ス。葉ハ粗大ナル枝端ニ集リテ互生シ、基部肥厚セル葉柄ヲ具ヘ、奇數羽狀複葉ニシテ小葉ハ卵形乃至披針狀長橢圓形ニシテ鋭尖頭ヲ成シ邊緣ニ細鋸齒ヲ有シ下面ニ小腺點アリテ特ニ脈腋ニ褐色ノ軟毛ヲ生ゼリ、側生小葉ハ五乃至九對アリ無柄ニシテ底部ハ左右不齊ノ圓形ヲ呈シ、頂生小葉ニハ小葉柄アリ。雌雄同株。五月開花シ淡黄綠色ノ葉莖花總ヲ下垂シ頗ル長シ。雄花總ハ極メテ短キ柄ヲ有シテ前年生枝端ノ葉腋ヨリ生ズ。雌花ハ一苞鱗ニ小苞ヲ伴ヒ、雄蕊ハ概ネ十アリテ三列ニ並ベリ。雌花總ハ新枝ニ頂生シテ柄アリ極メテ瘦長ニシテ疎ニ細花ヲ着ケ、每苞鱗内ニ一花アリテ二小苞ヲ有ス。雌花ハ四萼片、二花柱アリ。果總ハ著ク長ク下垂シ、果實ハ乾質ノ堅果ヲ成シ、二片ノ小苞ハ宿存増大シテ兩翼ヲ張レリ。和名澤しばハ山中溪流ノ陰濕地ニ生ズルヨリ云フ、かはぐるみハ山中溪流ノ邊ニ生ズルヲ以テ云フ乎、藤くるみハ其果總ふちノ花總ノ如ク下垂セルヨリ云フ。

のぐるみ

(必栗香・化木香・詹香・化香樹)
一名 のぶのき・どくぐるみ
Platycaarya strobilacea
Sieb. et Zucc.

(= *Petrophiloides strobilacea* Reid et Chandl.)
本邦西南溫暖諸州向陽ノ山地ニ生ズル落葉喬木。幹ハ直立シ大ナル者ハ高サ10m、徑60cmニ達ス。葉ハ有柄互生シ、奇數羽狀複葉ニシテ七乃至十九小葉ヨリ成リ、小葉ハ長橢圓狀披針形又ハ披針形ニシテ鋭尖頭邊緣ニ重鋸齒ヲ有シ裏面脈腋ニ褐毛アリ、側生小葉ハ無柄底部ハ左右不齊、頂生小葉ハ有柄ナリ。雌雄同株。六月嫩枝節ニ多數ノ葉莖花總ヲ着生シテ帶黄色ヲ呈シ、中央ノ花總ハ單ニ雌花ノミヨリ成ル乎又ハ下部ニ雌花ヲ着ケ、他ハ總ア雌花總ナリ。花ハ萼ヲ缺キ、雄花ハ苞鱗内ニ在リテ六乃至十雄蕊ヲ有シ、雌花ニハ二小苞・一子房・二花柱アリ。果總ハ橢圓形ニシテ上立シ鋭尖頭披針形ヲ成セル多數ノ硬質苞ヲ有シテ毬果ノ様ヲ呈シ濃褐色ニシテ落葉後モ尚枝上ニ殘レリ、苞内ニ小堅果ヲ抱キ、小苞ハ堅果ト合シテ翼狀ヲ成ス。果ニシテ採リ黄色染料トス。和名野くるみハ樹葉くるみニ似テ野山ニ生ズレバ云フ、のぶのきノ意不明、毒シムハ村童住々此枝葉ヲ搗碎シテ川ニ流シ魚ヲ毒シフルヨリ云フ。漢名 兜櫛樹(誤用)

第 2005 圖

くるみ科



やまもも (楊梅)

Myrica rubra Sieb. et Zucc.

我邦中部以南溫暖ノ山地ニ多ク生ズル常綠喬木ナレドモ又往々人家ニ栽植セララル。幹ハ直立シ多枝繁茂其大ナル者ハ高サ15m、徑1m内外ニ達ス。葉ハ互生シテ小枝ニ稠密ニ着キ倒卵狀長橢圓形又ハ倒披針形ニシテ鋭頭又ハ鈍頭、ほとばやまもも (var. *acuminata* C. DC.) ト稱スル者ハ葉頭更ニ尖レリ、下部ハ狹窄シテ楔形ヲ呈シ澁ニ短キ葉柄ト成ル、全邊ナレドモ稚樹枝上ノ葉ハ通常鋭鋸齒アリ、革質ニシテ裏面ニ小腺點ヲ疎布ス。四月葉腋ニ短キ葉莖花總ヲ出シテ花ヲ開キ、雌雄異株ナリ。雄花總ハ褐黄色ニシテ陽光ニ向フ部分往々紅色ヲ呈ス。雌花ハ苞鱗腋ニ着キ萼ニ三片ノ小苞ヲ有シ無萼ニシテ數本ノ雄蕊アリ。雌花總ハ每綠苞鱗内ニ一花ヲ有シテ二小苞アリ無萼一子房ニシテ花柱ハ二岐シ紅色ナリ。核果ハ球形ニシテ徑1-2cm、多數ノ多汁質突起ヲ有シテ核面ニ密植シ初メ綠色ナルモ夏日熟スレバ暗紅紫色ト成リ、稀ニしろもも (var. *alba* Makino) アリテ白色ヲ呈シ、核ハ堅硬ニシテ種子ヲ藏ス。主トシテ樹皮ヲ褐色染料ニ使用シしも皮ト云ヒ、又其甘酸味アル果實ヲ生食ス。和名山ももハ山地ニ生シテ實ノ生ル者故云フ、ももニハ種々ノ臆說アレドモ之レヲ實ナリトスル説可ナルヲ覺ユ、然シ按ズルニ圓形ノ實ナルベシ。

第 2006 圖

やまもも科



やちやなぎ

一名 えぢやまもも
Myrica Gale L.
var. *tomentosa* C. DC.

我邦北部ノ山野濕潤ノ地ニ生ズル落葉小灌木ニシテ高サ30-60cm、分枝シテ脂ヲ帯ビ香氣アリ。葉ハ小枝上ニ互生シテ短柄ヲ具ヘ、倒卵狀披針形、鈍頭、狹楔底ニシテ上半部ノ邊緣ニハ低鋸齒ヲ有シ、革質ニシテ兩面ハ枝條ト共ニ密毛ヲ布キ、長サ2.5-7cm許アリ。四月ノ候新葉ニ先シテ開花シ前年ノ葉腋ニ上向セル花總ヲ生ズ。雌雄異株ニシテ花總ハ共ニ長サ2cm内外ノ橢圓形ヲ呈ス。雄花ハ各一片ノ苞鱗内ニ位シ、雄蕊ハ六數内外アリテ苞内ニ擁セララル。雌花ハ苞内ニ一箇アリテ二片ノ小苞間ニ介在シ一子房アリ柱頭ハ二岐シテ不開シ紅色ナリ。果總ハ廣橢圓形ニ集合シ、小核果ハ細小ニシテ宿存セル苞内ニ在リ。和名ハ谷地柳ノ意、やちやなぎノ地ニシテ本種ノ生ズル處ヲ示シやなぎハ外觀ノ相似ニ由ル、蝦夷山ももハ北海道山ももノ意ニシテ本品やまもも屬ナレバ斯ク云ヘド食用的果實ヲ生ズルコト無シ。

第 2007 圖

やまもも科

