

第 2008 圖

やなぎ科



けしやうやなぎ

Chosenia bracteosa Nakai.

(=C. eucalyptoides Nakai; Salix macrolepis Turcz.) 本邦北部及信州上高地ニ生ズル落葉喬木ニシテ大ナルハ高サ15m、幹徑1mニ達ス。葉ハ有柄ニシテ互生シ、狭長楕圓形、長サ5cm内外、兩端銳形ヲ成シ多少粉白色ニシテ毛無ク質稍厚クシテ邊緣ニ微齒ヲ有ス。雌雄異株。初夏ノ候、新葉ト共ニ葉莢花穂ヲ短枝ニ着ケ長サ雌雄共ニ4cm内外、花時ニ下垂スルノ特徴アリ。花ハ一見他ノやなぎ類ニ似タリト雖モ花中ニ全ク腺體ヲ缺クヲ以テ風媒花ト成リ、柱頭ハ二深裂シ花柱トノ間ニ關節ヲ有シテ後落下スルノ殊態アリ。花終レバ果穂ハ傾上シ、顯著ナル柄ヲ有スル蒴果ハ穂軸上ニ疎在且ツ開出シ卵狀披針形ニシテ長サ6mm、開裂シテ柳絮ヲ吐クコト他ノやなぎニ同ジ。幼樹ハ枝葉共ニ厚キ白蠟質ヲ被リ白ク頗ル美觀ヲ呈スルヲ以テ化粧柳ノ和名ヲ得タリ。屬名ハ最初朝鮮ノ地ニノミ多ク見出サレシヲ以テ之レヲ紀念シ Chosenia ト謂ヘリ。

第 2009 圖

やなぎ科



おほばやなぎ

Salix Urbaniana Seemen.

(=S. cardiophylla Trautv. et Mey. var. Urbaniana Kudo; Toisusu Urbaniana Kimura.) 北地ノ河畔ニ多キ落葉喬木ニシテ高サ15m餘ニ達ス。葉ハ互生シテ葉柄ヲ有シ、楕圓形乃至長楕圓狀披針形ニシテ銳尖頭、底部概ニ鈍形ヲ成シ、邊緣ニ波狀細鋸齒アリ、長サ5-20cm、幅2-8cmニ達シ、下面初メ軟毛ヲ密生スルモ後殆下平滑ト成リ粉白ヲ帯ブ。雌雄異株。五六月ノ候黄綠色ノ葉莢花穂ヲ新枝ノ先端ニ着ケ、雄花穂ハ圓柱形ニシテ先端下垂シ、長サ7cm内外、每苞鱗一花ヲ着ケ、雄花ハ無萼、五雄蕊アリ、基部ニ三箇ノ蜜腺ヲ具フ。雌花穂ハ圓柱形ニシテ下垂シ、每苞鱗一花ヲ着ケ、苞ハ花後脱落シ、雌花亦無萼、子房ハ短柄アリテ軟毛密生シ基部ニ二箇ノ蜜腺ヲ有シ、花柱ハ二深裂シ柱頭ハ更ニ二岐ス。果穂ハ長大ト成リ、蒴果ハ二裂シ、種子ハ小形ニシテ白色ノ綿絮ヲ有ス。和名大葉柳ハ其葉大ナルヲ以テ云フ。

第 2010 圖

やなぎ科



あかめやなぎ

一名 まるばやなぎ

Salix glandulosa Seemen.

山野ニ生ズル落葉喬木。葉ハ廣楕圓形或ハ卵狀楕圓形、銳尖頭、稍鈍底ノ者多ク、長サ4-7cm、初メ毛アリテ紅褐色ヲ呈スレドモ後無毛平滑ト成ル。表面ハ綠色光澤アレド裏面ハ粉白色ニシテ光澤ナク、邊緣ニ細銳鋸齒ヲ刻ム。托葉ハ大形ニシテ半心臟形ヲ呈シテ鋸齒アリ、殊ニ新條ニ於テ顯著ナリト雖モ早落ス。雌雄異株。春日新葉舒ビテ後チ花ヲ開キ黄色ヲ呈ス。雄花穂ハ長サ5-7cm許ノ狭圓柱形ニシテ苞鱗ハ花軸ト共ニ白綿毛ヲ被フル。雄蕊五乃至六アリテ苞鱗ヨリ長シ。雌花穂ハ雄花穂ト略ボ同長。柱頭ハ二岐ス。苞鱗ハ綠色ニシテ小サク宿存シテ短毛ヲ布ク。蒴果ハ柄ヲ具ヘ、卵狀廣楕圓形ニシテ長サ3mm内外、無毛ナリ。和名ハ赤芽柳ノ意ニシテ嫩葉紅色ヲ帯ブルニ由ル、圓葉柳ハ他ノ狭葉ノ品ニ比スレバ其葉闊圓ナレバ云フ。

たちやなぎ

Salix triandra L.

var. discolor Anders.

(=S. nipponica Franch. et Sav.;

S. triandra L. var. nipponica Seemen;

S. amygdalina L. var. nipponica Schmed.)

平野ノ水邊ニ多ク生ズル落葉小喬木。葉ハ互生シテ葉柄ヲ有シ、披針形或ハ長楕圓狀披針形ニシテ銳尖頭、底部稍楔形ヲ成シ、邊緣ニ細鋸齒アリ、長サ3-12cm、幅1-4cm許、質稍厚ク無毛ニシテ裏面白色ヲ帯ブ。雌雄異株。四月ノ候、小形ノ葉ヲ着ケタル短キ新枝ノ頂ニ直立セル葉莢花穂ヲ出シ上向シテ長サ4cm内外アリ。雄花穂ニハ密ニ多數ノ黄色雄花ヲ着ケ、每花卵圓形ノ苞鱗ニ在リテ三雄蕊ト基部ニ二蜜腺トヲ有ス。雌花穂ハ淡綠色ヲ呈シ宿存性ノ苞鱗内ニ一雌花アリテ子房ハ短キ柄ヲ有シテ毛無ク基部腹面ニ二蜜腺アリ、花柱ハ深く兩岐シ柱頭ハ更ニ淺ク二岐セリ。蒴果ハ長サ3mm許アリテ熟スレバ二裂シ、種子ハ白色ノ綿絮ヲ伴フ。和名立柳ハ特ニ直上セル如ク感ズル樹狀ニ基キク云フ。

第 2011 圖

やなぎ科



かはやなぎ

一名 ねこやなぎ・ゑのころやなぎ・とうとうやなぎ・たにがはやなぎ

Salix gracilistyla Miq.

山間溪流ノ畔、平野河川ノ邊ニ多ク生ズルモ時ニ人家ニ栽植セル落葉灌木ニシテ多クハ叢生シ高サ0.5-2m許アリ。枝極多ク新枝ハ初メ絹毛ヲ布ク。葉ハ互生シテ葉柄ヲ有シ、長楕圓形又ハ披針狀長楕圓形ニシテ短銳尖頭、底部楔形ヲ成シ、邊緣ニ細鋸齒アリテ支脈多シ、初メ兩面絹毛ヲ布クモ後上面ハ無毛ト成リ、下面ハ灰白ヲ帯ビテ毛ヲ殘留ス。葉柄ハ往々秋時膨大シテ赤色ヲ呈シ來春花サクベキ嫩枝ヲ擁スルコトアリ、托葉ハ半月形ヲ呈ス。雌雄異株。春早ク葉ニ先チテ大ナル無柄ノ葉莢花穂ヲ出シテ上向シ絹毛ヲ密生ス。雄花ハ上半黑色ノ尖頭狹披針形苞鱗内ニ唯一箇ノ雄蕊ヲ有シ、基部腹面ニ一蜜腺アリ、葯ハ紅色ニシテ黄花粉ヲ吐出ス。雌花亦上半黑色ノ尖頭披針形苞鱗内ニ在リテ子房ハ絹毛ヲ密布シ基部腹面ニ一蜜腺アリ、花柱ハ絲狀ニシテ長サ2mm許、柱頭ハ極メテ短ク四岐ス。果穂ハ密ニ多數ノ蒴果ヲ着ケテ一方ニ傾キ、蒴果ハ絹毛ヲ密生シ熟スレバ二裂シ、白絮ニ由テ細微ノ種子ヲ四方ニ飛散セシム。和名川やなぎハ花邊ニ生ズルヨリ云フ、猫やなぎハ其花穂ヲ猫尾ニ擬セシナリ、ゑのころやなぎハ犬の子やなぎノ意ニテ是レ亦其花穂ヲ狗尾ニ比セシナリ、とうとうやなぎノとうとうハ狗ノ仔ニシテ兒女其嫩花穂ヲ採リテ手ニ唾ヲ附ケとうとう乳呑めト云ヒ其花穂ニ唾ヲ吸ハスヲ以テ云セ、箱川やなぎハ溪流ノ邊ニ多ク生ズレバ云フ。漢名 水楊(誤用)

第 2012 圖

やなぎ科



ながりばかはやなぎ

Salix Gilgiana Seemen.

(=S. gymnolepis Lev. et Vnt.)

田間水際ニ生ズル落葉大灌木乃至小喬木。高サ5mニ達ス。枝ハ立ツ。春葉ハ線狀長楕圓形ニシテ白絹毛ヲ被リ邊緣殆ニ鋸齒無ク、先端ハ鈍頭ノ者多シ。秋葉ハ長サ6-12cmニ達シ短柄アリテ互生シ、廣線狀長楕圓形或ハ狭長披針形、長漸尖頭鈍底、邊緣ニハ微齒ヲ具ヘ、無毛ニシテ表面ハ綠色滑澤、裏面ハ粉白ナリ。乾ケバ暗色ヲ呈ス。早春葉伸ビザル内ニ花序ヲ伸ブ。雌雄異株ニシテ直立シ長サ3-4cmノ細キ圓柱形ヲ成シ、倒卵圓形ノ苞ハ黑色ニシテ長毛ヲ生ジ、爲ニ花穂ハ初メ黒ク見ユ。雄蕊ハ一本。子房ハ卵形ヲ呈シテ苞ヨリ長ク、密ニ白色絨毛ヲ布キ、先端細ク長嘴ヲ成シテ無毛、柱頭二或ハ四岐ス。果穂ハ彎曲スル者多ク長サ5cm、絨毛アル蒴果相接シテ並ブ。此種ヲかはやなぎト呼ブハ非ナリ、故ニ今之レヲ訂正シ新稱ヲ附ス。漢名 水楊(誤用)

第 2013 圖

やなぎ科

