

こせう科



こせう (胡椒) Piper nigrum L.

印度地方原産ニシテ常緑ノ攀援藤本。莖ハ長ク他物ニ寄りテ蔓リ高サ5-6mニ達シ、節ハ高く下部ニハ氣根ヲ出ダス。葉ハ疎ニ互生シ有柄、卵狀廣楕圓形或ハ卵狀心臟形ニシテ長サ10-15cm、葉頭尖リ、葉底ハ狹形或ハ鈍形、全邊ニシテ數條ノ葉脈アリ、革質平滑ナリ。夏日、葉ト相對シテ長穗ヲ垂レ黄緑ノ碎花ヲ綴ル。花下ニ一苞アリ、花蓋片ナク、雄蕊ハ三箇、中央ニ圓キ子房アリ。熟シテ球形ノ赤キ漿果ト成リ乾ケバ黒色ニ變ズ。之レヲ香料トシ又藥用トス。即チ半バ熟セル者ヲ乾カシ外皮黒キ儘ニテ粉末トセルヲくろこせうト稱シ、熟セル者ノ外皮ヲ去リテ内皮ヲ種子ト共ニ碎粉セルヲしろこせうト稱ス。

第 2033 圖

はんげしゃう科



ごくだみ (葎)

一名 じふやく

Houttuynia cordata Thunb.

隨處ニ生ズル多年生草本。全株特異ノ惡臭アリ。地下ニハ白色圓柱形ニシテ柔軟ナル長キ根莖ヲ曳キ盛ニ分枝繁殖ス。莖ハ高サ15-35cm、直立分枝シ平滑無毛、多ク汚紫采アリ。葉ハ疎ニ互生シ、卵狀心臟形短鋭尖頭廣心臟底、長サ5cm内外、暗蒼綠色ニシテ全邊平滑、柔カシ。葉柄本ニハ托葉着ス。初夏梢上ニ花穗ヲ生ズ、花軸アリテ小ナル裸花ハ淡黄色ヲ呈シ穗狀ヲ成シテ集リ下ニ白色花瓣様ノ總苞片四箇十字形ニ配列シ一見一花ノ觀アリ。小花ハ花蓋片ヲ缺キ、三雄蕊ハ花絲長ク。子房ハ上位ニシテ三室ニ分レ、上部ニ三花柱細ク分立ス。果實ハ蒴、殘存セル花柱間ニ於テ開裂シ、淡褐色ノ細子ヲ吐ク。民間ニテ地下莖及葉ヲ藥用ニ供シ、用途多シ稱ス。和名どくだみハ毒痛みノ意ナラシク謂ハレ、又じふやくハ或ハ葎藥ノ字音ニ基クテ謂ヒ、或ハ之レヲ以テ馬ヲ飼フニ十種ノ藥ノ效能アレバ即チ十藥ト云フト謂ヘリ。

第 2034 圖

はんげしゃう科



はんげしゃう (三白草)

一名 かたしろぐさ

Saururus Loureiri Decne.

(=S. chinensis Baill.)


水邊ニ生ズル多年生草本。全草一種ノ臭氣アリ、根莖ハ白色ニシテ太ク泥中ヲ横行ス。莖ハ60-100cmニ達シ直立シ強靱ニシテ縱稜數條アリ。葉ハ柄アリテ互生シ、長卵形或ハ楕圓形ニシテ長サ8-15cm、先端尖リ葉底耳狀心臟形ヲ成シ、大ナル五脈アリテ淡綠色ヲ呈シ平滑ナリ。六七月頃梢葉二三ハ其表面白色ヲ呈シ、白葉ニ相對シテ穗狀様ノ總苞花序ヲ出ダシ多數ノ白色細花ヲ着ク。初メ下垂シ開クニ從テ直立ス。總苞ヲ缺ケドモ花下ニハ卵圓ノ一苞ヲ有ス。花ハ柄アリ、裸花ニシテ花蓋無ク、雄蕊六七、其中一雌蕊アリ。子房ハ四五ノ心皮ヨリ成ル。和名ハ半夏生ノ候ニ白色ノ梢葉ヲ生ズルノ謂フト謂ヒ、又葉ノ半面白ケレバ半化粧ノ意ナルト謂フ、又片白草ハ上記ノ如ク葉ノ半面白キ故ニ謂ハル。

かやらん

Sarcochilus japonicus Miq.

中部以南ノ山中岩石或ハ樹皮上ニ着生スル常緑多年生草本。莖ハ多數ノ葉鞘ニテ關節セルガ如クニ包マレ長サ5-10cm、灰色ノ扁平ニシテ波曲セル細長鬚根ヲ各處ヨリ發出シテ輕ク着生ス。葉ハ二列ニ生ジ水平ニシテ狹長楕圓形或ハ廣楕圓形、長サ2-3cm、先端尖リ、質厚クシテ暗綠色ヲ呈シ光澤ナク、且ツ表面縱溝アリ。晩春初夏ノ頃、中部邊ノ葉ト相對シテ細梗ヲ出スコト2-4cm、疎ニ小淡黄花ヲ四五箇ヅツ開ク。苞ハ短闊、花徑7mm内外、花蓋片ハ鐘形ヲ成シ、外花蓋片ハ長楕圓形ニシテ先端尖リ或ハ稍鈍頭、内花蓋片ハ更ニ細シ。唇瓣ハ短ク三裂シ中央裂片ハ殆ド無ク兩側ノ側裂片ハ兔耳ノ如クニ突出ス。蓋柱ハ短小。蒴果ハ長クシテ長サ3.5cmニ達ス。和名雁蘭ハ其葉ノ二列生并ニ形狀カヤノ葉ニ似タルヨリ名ケラル。

らん科



なごらん

Aerides japonicum

Lindenb. et Reichb. fil.

南方暖地ノ濕潤ナル樹上或ハ岩上ニ着生スル常緑多年生草本。莖ハ斜上シ、下部ヨリハ粗大ノ長キ氣根ヲ發出ス。葉ハ一株凡四五葉、兩列シ、長楕圓形ニシテ鈍頭ヲ有シ長サ10-15cm、表面滑澤ニシテ深緑色ヲ呈シ中脈ノミ凹ミ、質厚ケレドモ多少柔軟ナリ。夏日莖側ニ花莖ヲ垂レ出ダスコト6-12cm、四乃至十花ヲ總狀ニ着ク。花ハ徑1.5-2cm、淡緑采アル白色ニシテ花蓋片ハ斜メニ開キ長楕圓形ニシテ鈍頭。外花蓋片ノ内面基部ニハ横線三四ヲ飾ル。唇瓣ハ倒卵形ニシテ先端圓ク且ツ齒波曲シ、基脚ハ柄ト成リ、其下方ニハ囊狀ノ距アリテ其嘴ハ前方ヲ指ス。花ニ微香アリ。和名ハ沖繩ノ名護岳ニ生ズルト謂フニ基ク。

第 2036 圖

らん科



くもらん

Taeniophyllum aphyllum Makino.

我邦暖地諸州ノ樹皮ニ着生スル多年生ノ小無葉氣生蘭。根ハ總テ氣根ニシテ四方ニ射出シテ扁平ナル線形ヲ成シ、灰綠色ヲ呈シ、樹皮上ニ密着ス。莖ハ極メテ短ク、五六月頃1-2cmノ線狀莖ヲ出ダシ上部ニ乃至三花ヲ有スル短キ總狀花穗ヲ成シ、花軸短ク、花下ニ小形ノ苞アリ。花ハ小形ニシテ白綠色ヲ呈シ下位ノ子房ヲ有ス。花蓋五片ハ卵狀披針形ヲ呈シテ尖リ、肥厚シテ下部五ニ合着シテ正開セズ、内花蓋二片ハ外花蓋三片ヨリ短シ。唇瓣ハ花蓋内ニ入り舟形ニシテ上端ニハ内曲セル細片アリ、基部ニハ囊狀ノ距ヲ具フ。蓋柱ハ極メテ短シ。葯ニハ蓋片ヲ有シ、花粉塊ハ對フ成シテ四顆アリ。蒴果ハ長楕圓形ニシテ尖リ長サ3-6mm許アリ、一方開裂シテ鋸屑狀ノ種子ヲ出ス。和名ハ蜘蛛蘭ニシテ其氣根ヲ周圍ニ擴ゲタル狀宛モ脚ヲ張りシクモニ似タルバスク云フ。

第 2037 圖

らん科

