


第 2062 圖

ラン科



第 2063 圖

ラン科



第 2064 圖

ラン科



くもきりさう

一名 くもちりさう

Liparis Kumokiri Maek.

諸國ノ林中陰地ニ生ズル多年生草本。高サ 20-30cm、偽鱗莖ハ卵球形ヲ成シ緑色ニシテ多ク地
上ニ露出シ多クハ殘存セル枯葉柄ニ包マル。葉
ハ二片前年莖ノ側方ニ出デ兩方ヲ指シテ斜開
シ、椭圓形或ハ卵狀圓形ニシテ鈍頭、質稍厚ク
鮮綠色ヲ呈シ邊緣多クハ皺縮シ、底部ハ有翼
ノ柄ト成リテ相抱ケリ。六月ノ候、葉間ニ翼稜
アル綠萼ヲ抽キ上部ニ總狀花穗ヲ成シテ少數乃至
稍多數ノ淡綠色花(あをぐも) *forma viridescens Makino*)或ハ淡暗紫色花(くろぐも) *forma atropurpurascens Makino*)ヲ着ケ、花徑1cm許、
花下ノ苞ハ微細。外花蓋片ハ開出シ線狀披針形、
鈍頭。内花蓋片ハ更ニ細狹ニシテ背後ニ垂ル。
脣瓣ハ有爪、倒卵圓形、微凸頭、中部ヨリ強ク外
反シ之レ前方ヨリ望メバ倒三角形ノ脣瓣ノ四
周ニ五花蓋片ノ先端ヲ見ルベシ。蕊柱ハ前屈シ、
腹面上部ニ柱頭アリ。子房ハ下位、狹長。和名
ハ雲切草并ニ雲散草ノ意乎或ハ山上ニ在ルヨリ
謂フ乎、而シテ予未ダ之レガ解ヲ得ズ。

じかばちさう

Liparis Krameri Franch. et Sav.

諸國ノ山中陰地或ハ朽木上ニ苔ト共ニ生ズル多
年生草本ニシテ高サ 10-15cm。偽鱗莖ハ殆ド地
上ニ出デ卵圓形ニシテ綠色ヲ呈シ舊鱗片ニ擁セ
ラル。前年ノ偽鱗莖ノ側方ニ二葉相對シテ出デ
下ハ鱗片ニ包擁セラレ、廣椭圓形ニシテ下部ハ
狹窄シテ葉柄ト成ル。葉面ハ稍膜質、邊緣ハ皺縮
シ脈絡ハ鮮明ナリ。六七月ノ候、葉間ニ有翼稜アル
綠萼ヲ抽テ上部ニ總狀花序ヲ成シ花數十乃至
二十、花ハ普通品ハ暗紫條(*forma atronervata Makino*)ニシテ淡綠色品(あをじかばちさう
forma viridis Makino)アリ。花蓋片ハ甚だ瘦
狭、線形ニシテ尖リ、外花蓋上部ノ一片ヲ除キ
テ他ノ四片ハ脣瓣ノ背後ニ隠レ遙ニ脣瓣ヨリ長
シ。脣瓣ハ下部ニテ屈折シ、舷部ハ倒卵狀長椭
圓形、銳尖頭ナリ。子房ハ下位ニシテ狹長。和名
ハ似我蜂ノ意ニシテ其花形ヲ此蜂ニ擬シスク
呼ビシナリ。

すずむしさう

Liparis Makinoana Schltr.

山地ニ生ズル多年生草本ナレドモ往々觀賞ノ爲
メ愛植セリ。偽鱗莖ハ卵圓形ニシテ綠色ヲ呈シ
枯レタル舊鱗片及舊葉鞘ニテ包マル。葉ハ前年
ノ偽鱗莖ノ側方ニ出デテ二片對生シ、花時ニハ
未ダ充分ニ展開セズ、廣椭圓形、銳尖頭ニシテ
鈍底ヲ成シ下ハ葉柄ト成ル。夏日、葉間に縦稜
アル一綠萼ヲ抽クコト 20-30cm、上部ニ總狀花
序ヲ成シテ十數花ヲ着ケ。花ハ淡暗紫色ニシテ
同屬中最モ大ナリ。花蓋ハ脣瓣ヨリ僅ニ長ク、
其上片ハ線狀披針形、側片ハ瘦長ニシテ脣瓣ノ
背後ニ隠ル。脣瓣ハ闊大、暗紫色ヲ呈シ、中央ニ
一溝アルテ光澤ヲ有シ有爪、舷部ハ倒卵圓形ヲ
成シ、徑 15mm ニ達スルハ其殊徵ナリ。蕊柱ハ
基部急ニ膨起シ上部ハ前ニ弓曲セリ。子房ハ下
位、瘦長。和名ハ鈴蟲草ニシテ其脣瓣ノ形狀色
采すすむしノ翅翼ニ似タレバズク云フ。

ほざきいちえふらん

Microstylis monophyllos Lindl.

中部以北ノ高山喬木帶林中ニ生ズル多年生草
本。鱗莖ハ短鞘ヲ被フリ、殆ド地上ニ露出ス。
葉ハ根生シテ一片、稀ニ二片、葉柄ハ直立シテ葉
底ト共ニ花莖ヲ抱キ、爲ニ莖ノ中邊一葉アルガ
如シ。葉ハ廣椭圓形、或ハ圓形ニ近ク銳頭或ハ
鈍頭、全邊平滑ニシテ黃綠色ヲ呈シ軟質ナリ。
七八月ノ候 20-30cm の花莖ヲ抽キ、其上半ニ無
數ノ小淡黃綠色花ヲ穗狀ニ綴ル。花ハ微細ニシテ
徑 2mm 内外、花蓋ハ細クシテ尖リ、上下轉倒ス
ルヲ以テ卵形銳尖頭ノ脣瓣ハ上方ニ向フ。内花
蓋二片ト背部ノ外花蓋片トハ下向ス。距ハ無シ。
蕊柱ハ短柱狀ナリ。蒴ハ可ナリ大キク長サ 6mm
ニ達ス。和名ハ穗咲一葉蘭ノ意ニシテ穗咲ハ穗
ヲ成シテ開ケル花ニ基キシナリ。

第 2065 圖

ラン科



第 2066 圖

ラン科




しらん(白及)

Bletilla striata Reichb. fil.

中部ノ濕原或ハ崖上等ニ自生スル多年生草本。
又往々園養ス。鱗莖ハ大ナル扁壓ノ球形ニシテ
白色多肉ナリ。葉ハ莖ノ下部ニ五六葉互生シ柄
ハ鞘ト成リ互ニ重ナリ生ズ、長椭圓形ニシテ長
サ 20-30cm、兩端尖リ、背部ニ彎曲シ、多數ノ縱
襞アリテ膜質強靱ナリ。五六月頃、葉心ヨリ一莖
ヲ抽クコト 50cm 内外、其上部ニ紅紫色ノ美花六
七花ヲ總狀ニ疎着ス。花徑 3cm 内外、花蓋片ハ平
開シ、狭椭圓形ニシテ先端何レモ尖ル。脣瓣ハ淡
色ニシテ倒卵狀廣椭圓形ナレド三尖裂シ、側裂片
ハ蕊柱ヲ卷カントシ、中央裂片ニハ縱缺數條
ヲ飾リ邊緣小サク波紋ス。微紅色ノ花ヲ開ク者
アリ。鱗莖ヲ白及根ト稱シテ藥用トシ、又糊料ト
ナスベシ。和名ハ紫蘭ノ意ニシテ其花色ニ基ク。

第 2067 圖

ラン科



しょうきらん

一名 らんてんま

Yoania japonica Maxim.

諸州ノ深山陰地殊ニ能ク山地ニ生ゼルねまがりだけ
等ノ間ニ生ズル多年生無葉蘭。根莖ハ地中ヲ匍匐シ、
鱗片並ニ短毛アリテ淡黃褐色ヲ呈ス。莖ハ直立シ高サ
10-30cm、淡紅コト带ビシ乳白色、無毛ニシテ鱗片ヲ散
着ス。七月、莖頂ニ繖房様ヲ呈セル總狀花序ニ少數ノ花
ヲ疎着シテ開キ、長小梗アリ。花ハ徑 3cm、淡紅紫色
ヲ呈シ頗爾著ニシテ多肉質ヲ成シ微シク香氣アリ。
花蓋ハ殆ド平開シ、各片ハ多肉質ニシテ長椭圓形、鈍頭。
脣瓣ハ囊狀、前方ニ短厚ナル淡黃褐色ノ距
ヲ有シ、上面ハ扁平ニシテ紫點ヲ散布シ、開口部ニハ
長毛ヲ生ズ。蕊柱ハ脣瓣ヨリ短ク、下面ハ凹ミ、頂部
ハ銳尖頭ニシテ僧帽狀ノ薬アリ、其兩側各一ノ角状突
起ヲ具フ。子房ハ下位ニシテ圓柱形ヲ成シ其下ハ亦圓
柱形ノ長キ小梗ト成ル。屬名ハ蘭學者宇田川榕庵ニ因
ミテ Maximowicz 氏ノ名ケシ所ナリ。和名ハ鍾馗蘭
ノ意、惡鬼ヲ退治スト稱スル神ノ鍾馗ヲ何故此蘭ノ名
ト爲セシ乎予之レガ解セズ、蘭天麻ハ美ナル蘭花ノ咲
ク天麻ノ意ニシテ天麻ハおにのやがらナリ。