

第2122圖

しゃうが科



めうが (蘘荷)
Zingiber Mioga Rosc.
(= *Amomum Mioga Thunb.*)

山中山足ノ樹下陰地ニ自生アリト雖モ又人家ニ栽培セラルル多年生草本ニシテ高サ40-100cm許、特異ノ芳香アリ。根莖ハ多節多肉ニシテ地下ヲ横行シ淡黃色ニシテ白色ノ地下枝ヲ分チ鞘鱗アリ、根ハ粗ナル鱗状ヲ成ス。莖ハ一年生ニシテ稍斜ニ直上シ、上部ニ多數ノ葉ヲ互生シテ二列ヲ成ス。葉ハ長橢圓形披針形、長サ20-30cm=達シ、先端ハ長ク銳尖シ、底部ハ楔形ヲ成シ葉柄ト成リ下へ長キ葉鞘ト成リ、鮮綠色ヲ呈シ葉質ハ薄クシテ軟カリ。盛夏、根莖ヨリ鞘鱗ヲ有ス新莖ヲ頂ニ肥厚セラ一花穂ヲ地上ニ出シ、多數相層リタル紫脈紅緑色ノ葉ヲ有シ、苞間ヨリ大ナル淡黃色ノ花ヲ續出し、毎花一日ニシテ凋ム。莖ハ膜質ノ短筒形。花被管状部ハ細長ニシテ著シ萼上ニ超出ス。花被三片ハ披針形ニシテ尖リ其背面ハ稍闊シ。脣瓣ハ闊大ニシテ廣卵形ヲ成シ質薄クシテ底部ノ左右ニ小片アリ。雄蕊ハ一個、線形ニシテ脣瓣ニ對シテ立チ、黃色長葯隔ノ先端鉤曲シ薬ハ褐黃色ニシテ縱裂シ、狀狀白色ノ長花柱其間ヲ縱貫ス。子房ハ下位。時ニ蒴果ヲ結ビテ開裂シ、果皮ノ内面赤シ。種子ハ黑色ニシテ白色ノ假種皮ヲ被フ。花應片は嫩芽ヲ食用ニ供ス。古名ヲめがト稱へ今日ノ和名ハ其音ノ延ビシモノト謂ハル、按ズルニめがハ或ハ蘘荷ノ字音ノ轉訛セシモノ乎。

第2123圖

しゃうが科



しゃうが (薑)
一名 はじかみ 古名 クレのはじかみ
Zingiber officinale Rosc.
(= *Amomum Zingiber L.*)

熱帶あじあノ原産ナレドモ今ハ世界ニ廣ク栽培スル多年生草本ニシテ我邦へハ今ヨリ二千六百年以前ニ既ニ渡來シ今日ハ普通ノ園品ト成レリ。根莖ハ多肉ニシテ地中ニ横ハリ其状屈指ヲ竝ベタルガ如ク、淡黃色ニシテ辛味佳香アリ、各節ヨリ莖ヲ上方ニ直立並列ス。莖ハ高サ30-50cm許、草質ニシテ上部ニ葉ヲ二列ニ互生ス。葉ハ線状披針形ニシテ漸尖シ、長鞘ヲ有ス。我邦ニ在テハ普通花ヲ出メサドト雖モ暖地ニテハ春秋ノ候偶ニ根莖ヨリ高サ20cm内外ノ花莖ヲ出シ、頂ニ短厚ナル花被ヲ成シ、廣闊ナル線條脣ノレヲ包テ立ツコトアレドモ氣候不適ノ爲メ花ヲ出スニ至ラズシテ枯死ス。花ハ苞間ヨリ出デテ開ク。夢ハ短筒形、花冠鉤部ハ三裂シ、裂片ハ披針形紫黃色ニシテ尖レリ。脣瓣ハ倒卵形圓形、下部ノ兩側ニ各小裂片アリ、紫色ヲ呈シ淡黃色細點ヲ布ク。雄蕊ハ一個ニシテ挺出シ黃药ヲ有シ、淡紫色絲狀花柱之レヲ縱貫シ、柱頭ハ放射狀ヲ成ス。子房ハ下位。根莖ヲ食用及ビ藥用ニ供ス。おほしゃうが (var. *macrorhizomum Makino*) ハ根莖大ナリ、べにしゃうが (var. *rubens Makino*) ハ鱗片紅色ニシテ美ナリ。和名ハ生薑或ハ生姜ヨリ出デシ稱呼、はじかみハ元來山椒ノ古名ナレドモ同ジ辛味アルヲ以テ此種ヲ呼ブニ至レリ、くれのはじかみハ吳ノ山椒ノ意、吳ハ支那ヲ指シテ云ヒ、はじかみトハ開裂セシ實ヲ云フ。

第2124圖

しゃうが科



はなめうが
一名 やぶめうが (同名アリ)
Alpinia japonica Miq.

邦内暖地諸州ノ林下陰地ニ生ズル常綠多年生草本ニシテ高サ40-60cm許、生叢ス。根莖ハ分枝シ節ニ鱗狀葉アリ、嫩部ハ紅色ヲ呈ス。莖ハ二年生ニシテ斜上シ、二列ニ三四葉ヲ有シテ互生ス。葉ハ長橢圓形或ハ倒披針狀長橢圓形、長サ20-35cm許、上下銳尖シ、質厚カラズシテ強靭、表面暗綠色ニシテ無澤無毛、裏面ハ天藍絨ノ如ク密ニ散織毛ヲ布ク。五六月ノ候前年ノ葉中ヨリ纖毛アル一莖ヲ抽出シ梢ニ一總状花穗ヲ立テ紅條アル白花ヲ開キ花軸亦纖毛アリ。花ハ長サ25mm許、夢ハ筒狀、花冠ト共ニ外側絹毛ヲ被ル。花冠ハ鉢部長橢圓形ノ三裂片ト成リ背後ノ一片ハ突出セル雄蕊ヲ抱キテ立チ他ノ二片ハ前ニ下垂ス。脣瓣ハ卵形、缺刻波紋シ白質ニシテ紅線アリ、基部ノ二附飾片ハ鍼形ニシテ黃赤色。雄蕊ハ一。花柱一條アリテ胞間ヲ過グ。子房ハ下位。花後細毛アル廣橢圓形ノ實ヲ結ビ晚秋冬月ニ紅熟シ表面ニ細毛ヲ布キ内ニ白色ノ假種皮アル多子アリ。樂肆之レヲ伊豆鎧砂ト稱シ藥用トス、然レドモ真正ノ鎧砂ハ鎧砂蜜ニシテ *Amomum xanthoides* Wall. ナリ、又花草ニしゅくしょト呼ブ者ハ *Hedychium coronarium Koenig.* var. *chrysoleucum Baker.* ニシテはなしゅくしょト云品ナリ。和名花めうがハ花咲ケめうがノ意ニシテ花穂ヲ成シテ開ケバ云フ。漢名 山薑 (誤用)

第2125圖

しゃうが科



くまたけらん
Alpinia Kumatake Makino.

今大隅薩摩ノ南部并ニ薩南種子島ニ野生セルガ多分元來ハ支那ノ原產ナラン乎、多年生ノ草本ニシテ暖地ニ在テハ往々觀賞植物トシテ人家ニ培養ス。一株ニ叢生シ通常群コ成シ分枝スル多肉ノ根莖ヲ有シ、壯大ニシテ高サ1-2m許、葉綠ヲ除テハ無毛ナリ。葉ハ闊大ナル長橢圓形披針形、長サ40-60cm、兩端ニ長ク銳尖シ質強靭、多數ノ平行脈・斜ニ走リ葉緣ニ前方ニ向ヘル細毛ヲ具ヘ、下部ニハ短柄アリテ下ハ長柄ヲ成シ鞘頂ニ耳片アリ。七月、莖頂葉心ヨリ總状橢圓錐花序ヲ抽キ、紅采アル白花ヲ開ク。花ハ長サ3cm内外、各花初メ一苞ニテ包マル。萼ハ筒形白色、截頭缺刻線。花冠筒部ハ萼ヨリ稍短カク、舷部ハ三片ニ分裂シ白色、背片ハ長橢圓形、脣瓣ハ廣大ニシテ長サ3cm許、廣卵形ヲ呈シ白質黃量ニシテ紅斑紅脈ヲ節リ前緣皺曲シ、基部ノ二附飾片ハ線狀鍼形ナリ。雄蕊ハ一個ニシテ長ク前方ニ挺出シ萼間ニ細キ花柱ヲ挿ム。葉鞘ヲ乾シテ繩索ト作シ舟舶ヲ繫ギ用ウ。和名ハ熊竹蘭ノ意、蓋シ龍ハ其草狀ノ強壯ナルヲ表徵シ竹ハ其強直ナル葉狀ニ基キテ云フナラン。漢名高良薑 (誤用)

第2126圖

しゃうが科



きゃうわう (薑黃)
一名 はるうこん
Curcuma aromaticata Salisb.
(= *C. Zedoaria Roxb. non Rosc.*)

印度全州ニ野生セル多年生草本ニシテ暖地ニ生ジ、琉球ニハ早ク入リテ今自生ノ姿ヲ呈シ、我が内地ヘハ成川時代ニ渡リテ稀レニ見ル。根莖ハ粗ナル塊狀ヲ成シテ分岐シ内部ハ黃色ニシテ香氣アリ。全草質綠色ニシテ高サ1m内外ヲ算ス。葉ハ長橢圓形、長サ50cm内外、闊大ニシテ尾狀銳尖頭、下部ハ長柄ヲ有シテ下内外、闊大ニシテ尾狀銳尖頭、下部ハ長柄ヲ有シテ下ハ鞘ヲ成シ、裏面ニハ纖毛ヲ滿布ス。五六月ノ候、嫩葉ノ萌發ト共ニ別ニ其側方に高サ30cm内外花莖ヲ直立ス。花穗ハ大形ニシテ多數綠色白色ノ鱗狀苞葉重層シテ相擁シ、各片ノ上部反曲シ、頂部ノ者ハ紅色ヲ呈ス。花ハ二個ヅツ苞間に在リテ苞ヨリ短シ、萼ハ長サ1cm許、三齒アリ。花冠筒ハ萼ノ三倍長、上部ハ漏斗形、舷部ハ長橢圓形ノ三裂片ト成リ白色紅量アリ。雄蕊四個ハ總葉黄色ノ花瓣様ヲ呈シ、前方ノ一片ハ漏斗狀ノ大ナル脣瓣ト成リ先端ニ凹入アリ、其中央小片内面ニ一個ノ約半坐セシメ、獸角狀突起ヲ其兩側ニ垂れ、子房ハ下位。根莖ヲ探テ藥用ニ供ス。和名きゃうわうハ薑黃ノ音、春鬱金ハ春末初夏ニ花サケバ云フ。

第2127圖

しゃうが科



うこん (鬱金)
Curcuma longa L.
(= *Amomum Curcuma Jacq.*)

熱帶あじあノ原產ニシテ琉球臺灣ニハ自生シ又薩南ノ種子島ニモ自生ノ状ヲ呈シ、邦内暖地ニ時ニ培養セラル多年生草本。地下ニハ多肉ノ根莖アリテ橢圓形或ハ長橢圓形ノ枝ヲ分テ黃色ヲ呈ス。葉ハ四五片相集リ長柄ヲ以テ立チ、葉片ハ長橢圓形、長サ40cm内外、銳尖頭、底部ハ狹窄シ、綠色ニシテ斜走セル多クノ平行脈ヲ有シ、質稍厚クシテ表裏平滑無毛ナリ。秋時、葉間ヨリ高サ20cm内外ノ大ナル花穗ヲ抽テ直立シ花ヲ開ク。花穗ハ多數ノ闊大ナル綠色苞葉鱗次シ相層リ每苞ノ上部反曲シ頂部ノ花ヲ生ゼシテ白色微紅量アリ。花ハ淡黃色ニシテ苞間に三四個ヅツ在リ、萼ハ小形、花冠筒ハ長ク、舷部ハ短ク三裂シ、雄蕊ハ四個アレドモ總テ花瓣化シ且ツ下半部ハ合一シ、殊ニ最下ノ一片ハ脣瓣ト成リ倒卵形ニシテ黃色、唯其中央片ニノミ薺ヲ着ク。子房ハ下位。根莖ヲ探テ藥用トス、然レドモ真正ノ鎧砂ハ鎧砂蜜ニシテ *Amomum xanthoides* Wall. ナリ、又花草ニしゅくしょト呼ブ者ハ *Hedychium coronarium Koenig.* var. *chrysoleucum Baker.* ニシテはなしゅくしょト云品ナリ。和名うこんハ鬱金ノ吳音ヨリ來レリ。