


第 2212 圖

ゆ
り
科



第 2213 圖

ゆ
り
科



第 2214 圖

ゆ
り
科



あまな (老鴉瓣)

一名 むぎぐわん

Tulipa edulis Baker.

(= *Amana edulis Honda.*)

向陽ノ原野ニ生ズル多年生草本。鱗莖ハ卵圓形ニシテ長サ 1.5-2cm、表面ニ紫褐色ノ薄キ鱗形葉鞘ト淡褐色ノ絮狀纖維ト被ル。葉ハ二箇、根生シテ平開シ、廣線形ヲ成シ長サ 13-25cm、幅 4-6mm、扁平柔軟、淡霜綠色ヲ呈シ、先端ハ鋭形、基脚漸殺シテ相抱ク。四月、葉間ニ葉ヨリ短クシテ柔キ花莖ヲ抽クコト一、稀ニ二、中邊ニ長サ 3cm 内外ノ葉狀苞三片ヲ着ケ、頂ニ一白花ヲ開ク。花ハ廣鐘形、日ヲ受ケテ正開ス。花蓋六片ハ狹長橢圓狀披針形、漸尖頭狹脚ニシテ長サ 2.5-3cm、外面ニハ暗紫色ノ細條數本縦走ス。雄蕊六箇ハ花蓋片ノ半長、三箇ハ長ク三箇ハ短シ。雌蕊ハ一箇、雄蕊ヨリ短ク、子房ハ綠色、三稜、橢圓體ニシテ花柱一、柱頭ハ截形ナリ。蒴果ハ綠色、倒卵圓形ニシテ三脊アリ。夏ニ入レバ地上部ハ枯死ス。小兒其鱗莖ノ肉ヲ生食ス。和名あまなハ甘菜ノ意、其鱗莖ノ白肉苦味并ニ刺戟味無ケレバ云ヒ、麥慈姑ハ麥圍ニ生ズルト謂ハレテ此名アル乎或ハ其葉麥ノ如ケレバ謂フ乎。漢名 山慈姑(誤用)

ひろはあまな

一名 ひろはむぎぐわん

Tulipa latifolia Makino.

(= *Amana latifolia Honda.*)

田間ノ原野ニ生ズル多年生草本。あまなト屢々混生シ、相似タリト雖モ、葉廣闊ニシテ中心一白道ヲ有シ、雄蕊ハ雌蕊ヨリ短クシテ而モ長短ナキヲ以テ區別スベシ。鱗莖ハ卵圓形、あまなト同斷。春日二葉ヲ出ダス。葉ハ廣線形、長サ 30cm 内外、幅 1cm、時ニ 2cm フ超エ、概ネ地平ニ擴ガリ質軟クシテ表面ハ綠色、中脈ニ沿ヒテ白道アリ、下部ハ狹窄シ往々紅色ヲ呈ス。花ハ三月葉間ノ莖上ニ開ク。白色ニシテ廣鐘形、あまなニ比シテ少シク大、外面ニハ淡紫條ヲ飾ル。雄蕊ハ同高、雌蕊ハ之レヨリ高シ。蒴果ハ鈍三稜アル倒卵狀圓柱形ニシテ鈍頭、截底短柄、頂ニハ嘴狀ノ花柱ヲ殘存ス。稀少ナル種ナリ。

ちうりっふ

一名 うっこんかう・ぼたんゆり(新稱)

Tulipa Gesneriana L.

小あじあ原産ノ多年生草本ニシテ歐洲ヲ經テ輸入セラレ、觀賞品トシテ廣ク栽培ヲ見ル。園藝品種多シ。鱗莖ハ卵形。莖ハ圓柱形、直立シ單一ナリ。葉ハ二三、莖ノ下部ニ接シテ互生シ、廣披針形或ハ橢圓狀披針形ニシテ長サ 20-30cm、先端ハ尖リ葉底ハ輕ク莖ヲ抱キ、全體少シク内卷シ且ツ邊緣ニハ波曲アリ。表面ハ蒼綠色白霜ヲ帯ビ裏面ハ濃色ナリ。四五月頃、莖頂ニ上向シテ一大花ヲ開ク。花ハ廣鐘形、長サ 7cm 内外、花蓋片ハ平開セズ、闊大鈍頭ニシテ底部ハ凹面廣シ。原種ハ白色紅縁ナレド、黄・赤・白・紫等ノ諸色アリ。雄蕊六。雌蕊ハ長サ 2cm 内外、綠色ノ柱狀ヲ成ス。切花用トシテ盛ニ栽培セラレ。漢名 鬱金香(誤用)

ばいも (貝母)

一名 あみがさゆり

古名 ははくり

Fritillaria Thunbergii Miq.

支那原産ニシテ稀ニ園養スル多年生草本。鱗莖ハ白色ノ肥厚セル鱗片二箇、相倚リテ球形ヲ成ス。莖ハ直立シ高サ 50cm 内外、全草淡蒼綠色ヲ呈ス。葉ハ多數、無柄ニシテ莖上三四箇ヅツ稍不整ニ輪生様ヲ成シ、廣線形ニシテ先端尖リテ反卷シ、長サ 10cm 内外、上葉ニ至レバ先端鉤曲ス。三四月、梢部ノ葉腋ニ單生セル淡黃綠花ヲ懸垂ス。花ハ鐘形、長サ 2-3cm、花蓋片六箇ハ橢圓形ニシテ稍鈍頭、外面縁條ヲ有シ内面ニハ紫色ノ網狀紋ヲ飾ル。あみがさゆり(編笠百合)ノ名アル所以ナリ。雄蕊ハ六、花蓋片ヨリ短ク、花柱ハ細ク、柱頭ハ三岐ス。蒴果ハ短キ六角形ニシテ廣キ六箇ノ縱翼アリ。種子ハ扁平ノ圓キ翼ヲ具フ。球莖ヲ藥用ニ供ス。和名ハ漢名貝母ノ字音ニ基ク。

こばいも

一名 てんがいゆり

Fritillaria japonica Miq.

本州中部及四國ノ山中溪側ノ陰地ニ生ズル多年生草本。鱗莖ハ小形、白色ノ鱗片二箇ヨリ成ル。莖ハ細クシテ軟カク高サ 12-20cm、上部ニ二葉相對シ、更ニ花下ニ三葉輪生スルノミ。葉ハ何レモ無柄、披針形或ハ狹披針形、長サ 5cm 内外、漸尖頭狹底。梢葉ハ狹クシテ稍短シ。三四月頃梢頭ニ一花ヲ點頭ス、細キ短梗アリ。花蓋ハ稜角アル廣鐘形ヲ成シ、長サ 2cm、各片ハ灰白淡綠色ニシテ内面ハ紫紅色ノ小點ヲ滿布ス、橢圓形圓頭、下部中央ハ外部ニ膨出ス。雄蕊六、花蓋ヨリ短ク、内三箇ハ少シク長シ。花柱ハ稍太ク、先端三岐セリ。和名ハ小貝母ノ意ナリ。てんがいゆりハ天蓋百合ノ意ニシテ其花形ニ基ク、天蓋トハ曲リシ棒ノ先端ニ笠ヲ下ゲシ様ノ形チノモノナリ。

くろゆり

Fritillaria camtschatcensis

Ker-Gawl.

中部以北ノ高山ニ生ズル多年生草本。高サ凡ソ 20-30cm ナレドモ北地ノ林間ニ生ズル者ハ往々 50cm フ超ユ。鱗莖ハ白色ノ小球狀ヲ成セル肥厚鱗片ヲ集合ヨリ成ル。莖ハ直立シ、中部以上ニ四五葉ヲ輪生スルコト二三輪、上部ニハ更ニ二三葉互生ス。葉ハ披針形或ハ橢圓狀披針形、漸尖スレドモ先端ハ圓ク、鈍底ニシテ柄無シ、長サ 5-8cm、質厚クシテ表面ハ滑澤。七月頃莖梢一花ヲ稍點頭ス、惡臭アリ、長サ 3cm 内外。廣鐘形ヲ呈シテ平開セズ、花蓋片ハ菱狀橢圓形或ハ倒披針狀橢圓形、暗紫色、内面ニハ更ニ濃色ノ斑紋アリ。雄蕊、雌蕊共ニ潜在ス。和名黒百合ハ花色花容ニ基キシ名ナリ、然シゆリノ稱ヲ冒スト雖モ元來其屬ノ品ニハ非ズ。


第 2215 圖

ゆ
り
科



第 2216 圖

ゆ
り
科



第 2217 圖

ゆ
り
科

