

第220圖



やまぢのきく

*Aster altaicus Willd.*

山地ニ生ズル二年生草本。莖ハ高サ約40-60cm許、葉ト共ニ毛アリ。葉ハ互生シ、線形或ハ狭キ筈狀披針形ニシテ全邊ヲ成シ、下部ノ葉ニ多少鋸齒アリ。秋時、上部ニ瘦枝ヲ分チ、枝頭ニ頭狀花ヲ着ク。綠色總苞片ハ線形ニシテ鋭尖頭。花徑4cm許アリ、周邊ニ藍紫色ノ舌狀花ヲ繞ラシ、中央ニ黃色管狀花ヲ容ル。舌狀花・管狀花共ニ其果實ニ冠毛ヲ具フ。和名ハ山路の菊ノ意ナリ。漢名 鐵桿蒿(慣用)

第221圖



あれののきく

*Aster hispidus Thunb.*

海邊ノ地并ニ山地ニ生ズル二年生草本ナリ。莖ハ高サ30-60cm。葉ハ互生シ、細長ニシテ、下部ノ葉ニハ多少ノ鋸齒アリ。秋時、上部ニ枝ヲ分チ、枝端ニ頭狀花ヲ着ク。頭狀花ハ黃色ニシテ冠毛アル中心花ト周圍ニ殆ンド冠毛ナキ紫色ノ舌狀花トヲ有ス。草狀花形やまぢのきくニ酷似シ、外觀頗ル見分ケ難ケレドモ、本種ハ舌狀花ニ極メテ短縮セル冠毛アルヲ以テ認識スベシ。和名ハ荒野の菊ノ意ナリ。

第222圖



はまべのきく

一名 いそのきく

*Aster Asa-Grayi Makino.*

本邦西部ノ海岸ニ生ズル多年生草本。莖ハ通常平臥シ、長サ30cm餘ニ達ス。葉ハ互生シテ質厚ク、鈍頭倒披針形ヲ呈シ、全邊ニシテ下方ノ葉ハ多少鈍鋸齒ヲ有シ、縁毛ヲ具フ。秋時紫色ノ頭狀花ヲ枝端ニ開キ、やまぢのきく或ハあれののきくニ似テ可ナリ大形ナリ。各頭狀花ニハ一列ノ舌狀花ト多數ノ黃色中心花トヲ具フ。從來はまべのきくノ認識ヲ誤マリヲリシヲ以テ今之レヲ訂正ス。

だるまぎく

*Aster spathulifolius Maxim.*

九州並ニ中國西部ノ産ニシテ、海邊ニ生ズル多年生草本ナレドモ幹ハ木質ヲ呈ス。高サ約30-60cm許、密ニ枝ヲ分チ矮生狀ヲ呈ス。葉ハ互生シテ相重ナリ、筈狀倒卵形ヲ呈シ、下部ハ狹窄シテ葉柄ト成リ、葉頭ハ圓クシテ全邊或ハ多少鈍齒ヲ有シ、毛多シ。秋時、紫色ノ頭狀花ヲ枝頭ニ着ケ、花々相集リ、周邊ニ舌狀花、中心ニ黃色管狀花アリ。往々觀賞品トシテ栽培ス。和名ノ達磨菊ハ其矮生ノ草狀ニ基ヅク。

第223圖



うらぎく

一名 はましをん

*Aster Tripolium L.*

中部以西ノ海邊ノ濕地ニ生ズル滑澤ナル二年生草本。莖ハ太クシテ直立シ高サ1m内外ニ達ス。葉ハ質厚ク、軟ニシテ脚葉ハ大ナリ。莖葉ハ互生シ、長形ニシテ全邊ナリ。秋時梢ニ繖房狀ヲ成シテ枝ヲ分チ、枝上ニ多クノ頭狀花ヲ着ク。周圍ニ紫色舌狀花ヲ有シ、中部ニ黃色ノ管狀花ヲ具フ。總苞ハ鱗片稍廣クシテ尖リ、紫采アリ。果實ニ著シキ白色ノ冠毛ヲ具フ。漢名 金盞菜(誤用)

第224圖



ははきぎく

*Aster subulatus Michx.*

北米原産ノ越年生草本ニシテ明治末年頃ニ渡來シ、今ハ關東關西ノ荒地ニ生ジテ歸化植物ノ一ト成レリ。高サ1m以上ニ達シ、全株全ク平滑ニシテ蒼綠色ヲ呈ス。莖ハ直立シ、質強韌、圓柱形ヲ成シ、多數ノ狭披針形ノ葉ヲ互生ス。葉ハ漸尖頭、殆ンド柄ナク、表面光澤アリ。晩秋ニ入リテ莖頭枝ヲ分ツコト繁ク、各枝端ニ小頭狀花ヲ生ズ。頭狀花ハ徑1cmニ滿タズ、總苞ハ狹橢圓形ニシテ總苞片鱗次ス。舌狀花冠ハ淡紫白色ヲ呈シ細小ニシテ顯著ナラズ。冠毛ハ淡紅色ヲ呈ス。和名ハ多數ノ小頭狀花ヲ着クル莖梢ノ繁枝宛モ箒ノ如ケレバ云フ。

第225圖

