


第2338圖



第2339圖



しゅろちく(櫻竹・櫻欗竹)

一名 いぬしゅろちく
Rhapis humilis Blume.
 (=Chamaerops Sirotik Sieb.)

南支那ノ原産ニシテ舊ク徳川時代ニ琉球ヨリ渡來シ、今ハ諸處ノ庭園ニ觀賞植物トシテ栽植セラル。常綠灌木ニシテ叢生シ、短キ地下枝ヲ橫出シテ繁殖ス。稈ハ高サ3m内外ニ達シ、直立單一、圓柱形ニシテ節多ク徑1-2.5cm許。稈身ハ舊葉鞘ノ纖維ヲ以テ緊包シ若シ其稈ノ表面露出セバ綠色ヲ呈シ、稈頂ニ七八葉ヲ開出し、葉柄ハ細長ナレドモ強剛、半圓柱状ヲ成シ、葉面ハハ扇形ニ展開シ、十乃至十八片許ニ掌狀深裂シ、裂片ハ廣線形、漸尖頭ニシテ先端二三ノ裂鱗ヲ存し、縱變顯著ナラズシテ平坦、主要脈三四縱走シ薄キ革質ニシテ暗綠色或ハ鮮綠色ヲ呈シ滑澤、邊緣ニ微鋸齒アリ。雌雄異株。夏月往々葉腋ノ花序ヲ出ダシ、脚部ハ褐色強質ノ鞘苞アリ。花穗ハ穗状花序ヲ集メテ圓錐形ヲ成シ穂ニシテ多少垂垂ス。花ハ小ニシテ無柄、小球状ノ花蓋ハ淡黃色ヲ呈シ、外花蓋ハ短クシテ杯状三淺裂、内花蓋ハ倒卵形球形、三裂。雄蕊ハ六、子房ハ三。葉状葉ニシテ近ケレドモ裂片小形、中脈ヲ缺キ質薄ク且ツ邊緣ヲ有シ、乾ケバ横脈現ハルルヲ以テ區別シ得ベシ。和名ハ櫻欗竹ニシテ葉ハしゅろニ類シ程ハ竹ニ似タルニ由ル。いぬしゅろちくハ元來本種ノ名ニシテくわんのんちくノ一名ニ非ズ。本來しゅろちくノ名ハ此類ノ總名ナリシナリ。

くわんのんちく(筋頭)

一名 りうきうしゅろちく
Rhapis flabelliformis L' Her.
 (=Chamaerops Kwanwortsik Sieb.;
Rh. major Blume.)

南支那ノ原産ニシテ徳川時代ニ琉球ヨリ渡來シ、今ハ諸處ニ觀賞植物トシテ培養常綠灌木ニシテ叢生シ、短キ地下枝ヲ橫出シテ繁殖シ、高サ1-2m許。稈ハ直立シ、徑2cm内外、分枝ノ稈身ハ舊葉鞘ノ纖維ニ密包シ、若シ稈面露出セバ綠色ヲ呈ス。葉ハ稈頂ニ聚リテ四方ニ出デ、葉柄ハ細長ナレドモ強剛、葉面ト同長、基脚葉鞘部、兩端ニハ黒褐色ノ纖維アリテ抱擁ス。葉面ハ扇形扁狀ヲ呈シ四乃至八片ニ掌狀深裂シ、長サ15-25cm許。裂片ハ狹長椭圓形、幅3cm内外、縱變アリテ前方多ク膨起シ、先端ハ四五裂シ、剛質深綠滑澤、邊緣ニ銳齒アリ。雌雄異株。初夏ノ候往々開花ス。花序ハ長サ20-30cm、葉間ニ在リ、穎狀花序ハ疎ニ圓錐叢状成シ、花ハ無柄小形球狀、淡黃色ニシテ外花蓋ハ短クシテ杯状三淺裂、内花蓋ハ倒卵形球形三裂。雄蕊ハ六。子房ハ三。果實ハ廣橢圓狀球形、外面ニ反屈セル硬質鱗片多シ。本品之レヲしゅろちくニ比スレバ葉ノ裂片少數且ツ廣闊、先端ハ葉面膨起シ、質強剛ナルヲ以テ區別シ得ベシ。和名ハ觀音竹ノ意、元來此觀音竹ハ漢名ニ非ズ、是レハ蓋シ琉球ノ寺號觀音山ヨリ出デシ者ニシテ多分同寺ニ之レガ栽エアリシヨリ此稱ヲ生ゼシナラン。

いときんすげ

Carex hakkodensis Franch.


中部以北ノ高山帶ノ草原ニ生ズル多年生草本ニシテ稈及葉ヲ簇出シ、高サ15-40cm許、全草軟弱ナリ。根莖ハ匍匐屈曲ス。葉ハ廣線形、稈ヨリ短ク、2mm内外ノ幅ヲ有シ平滑ナリ。七八月、葉間ニ花穗ヲ出ダス。稈ハ立チ、細キ三稜柱ニシテ頂ニ近ク稜上粗糙シ、稍傾キテ頂ニ一穗ヲ着ク。穗ハ淡茶褐色ヲ呈シ多少ノ光澤アリ、上部ハ雄花穗、細ク且ツ短クシテ多クハ早クモ失ハル。雌花穗部ハ長橢圓形、長サ8cm内外算シ、長キ果實ヲ稍疎ニ着生ス。雌花穎ハ淡茶褐色、披針狀橢圓形ヲ成シ、先端ハ截形、下部ノ者ハ長芒ヲ具フ。果囊ハ斜開、極メテ長クシテ遙ニ穎ヲ抽キ、長披針形、長サ7mm内外、穎ト同色滑澤、上部ハ漸尖シ、基部ハ柄ヲ有ス。柱頭ハ三。和名ハ絲金薹ノ意ニシテ、絲ハ瘦稈絲ノ如ク纖細、金ハ黃色果穗ノ色彩ニ由ル。

しらこすげ


Carex rhizopoda Maxim.

野外ノ多湿地ニ生ズル多年生草本ニシテ高サ30-40cmアリ。根莖ハ粗ナル線形族生シテ稍斜上シ、此レヨリ稈并ニ葉ヲテ構造ス。葉ハ廣線形、幅4mm内外ニシテ稈澁ノ軟弱ナリ。五月ノ候、三稜形花穗ヲ呈シ、花穗ハ長サ2-3cm、圓柱狀ヲ呈シ、上部三ク且ノ一乃至四分ノハ雄花部ニシテ花軸圓形ノ淡黃褐色ヲ呈シ、下部ハ稍疎ニシテ花軸圓形着ケル雌花ヨリ成ル。穎ハ膜質、ハ長ク軸ニシテ綠背、且ツ芒アリ。果囊ハ綠色無毛ニシテ綠色無毛ニシテ開出シ、綠色白脈ヲ有ス。瘦果ハ倒卵形ニシテ三稜形ヲ成シ、三柱頭アリ。和名白子薹ハ最初武州白子ノ地ニ於テ採集セシヲ以テ此名ヲ得タリ。

第2341圖



第2342圖



はりすげ

Carex Onoei Franch. et Sav.

山地ノ濕原或ハ濕潤ノ林下ニ生ズル多年生草本ニシテ高サ15-30cm許、密ニ叢生ス。葉ハ狹線形、長サ花穗ニ及バズ、多クハ稍地平ニ擴ガル。稈ハ直立シテ細ク、稍三稜形ヲ有シ平滑ナリ。六七月ノ候、稈頂ニ一花穗ヲ立テ、上部ハ雄花穗ニシテ細ク且ツ短ク、果時ニハ其花多ク既ニ脱落シテ痕無ク、下部ハ雌花穗ニシテ長サ3-4mm許ノ稍球狀橢圓形ヲ形成ス。雌花穎ハ卵狀橢圓形、先端銳形ヲ成シ、茶褐色膜質、果時ニハ多クハ脫去ス。果囊ハ稍少數ニシテ平開シ下部ノ者ハ反屈シ、卵狀橢圓形ニシテ黃綠色ヲ呈シ、表面平滑、長サ2mm許、先端ハ急ニ尖リテ極短ノ嘴ヲ成シ、基部ハ圓ク、短柄アリ、熟スレバ頗ル脱落シ易シ。瘦果ハ三稜形、柱頭ハ三岐。和名ハ針薹ノ意ニシテ其稈針ノ如ク纖細真直ナレバ云フ。

まつばすげ

Carex biwensis Franch.

(=Carex rara Boott
 var. *biwensis* Kuek.)

原野ノ水濕地ニ生ズル多年生草本ニシテ根莖ハ短形、密ニ分岐シテ稈ヲ簇出シ、下方ニハ細鬚根ヲ出ダス。稈ハ直立シ、高サ15-30cmニシテ細ク、鈍三稜形ヲ成シ平滑ナリ。葉ハ各稈ノ下部ニ二三條ヲ生ジ、狹線形ニシテ稈ヨリ短ク、徑1mm餘ニ過ギズ。春日穎ニ茶褐色ノ短キ花穗ヲ直立シ、上半ハ雄花穗、線狀長橢圓形ニシテ長サ6-12mm許。下半ハ雌花穗ニシテ短圓柱形、長サ5-7mm許、徑3-3.5mm許。雌花穎ハ廣橢圓形ヲ呈シ、先端多クハ鈍形ニシテ往々銳形者ヲ混ジ、茶褐色ノ膜質ニシテ平滑ナリ。果囊ハ斜開シ、僅ニ穎ヨリ長ク、卵狀橢圓形ニシテ長サ1.5mm許、先端急ニ銳尖シテ短嘴ヲ形成シ末端四入シ、基部ハ圓ク表面ハ平滑ニシテ多少ノ隆起脈ヲ有ス。柱頭ハ三箇。和名松葉薹ハ其真直纖長ナル多數ノ稈ニ基キテ云フ。

第2343圖

