

第 2380 圖

かやつりぐさ科



をのへすげ

一名 れぶんすげ

Carex tenuiformis Lev. et Vnt.
(=C. koreana Kom.)

本州中部以北ノ高山ニ生ズル多年生草本ニシテ根莖ハ簇生シ、匍枝ヲ生ゼズ。葉ハ線形、幅3mm内外ニシテ草質ナリ。稈ハ葉ヨリ挺出シ、瘦細ニシテ往々一方ニ傾キ上部ニ二三穂ヲ着ク。雄花穂ハ稍線形ヲ呈シテ頂生シ、長サ1cm内外、淡赤褐色ヲ呈ス。雌花穂ハ絲狀ノ長梗アリテ、苞ハ梗ト同長或ハ短ク、穂長 1.5cm内外、果囊ハ疎生シ、穎片ハ橢圓形、赤褐色、先端稍尖リ短芒ヲ有ス。果囊ハ其長サ僅ニ穎片ニ超エテ稍直立シ、卵狀橢圓形ヲ成シテ長キ嘴狀部ノ先端ハ截形ナリ、表面ハ綠褐色ニシテ毛無シ。瘦果ハ三稜アル倒卵形ニシテ柱頭ハ三岐ス。和名ハ尾上藪ニシテ峰上(をのへ)ニ生ズルヨリ云フ、禮文すげハ北海道禮文島ニ生ズルヨリ云フ。

第 2381 圖

かやつりぐさ科



なきりすげ

Carex brunnea Thunb.

路傍或ハ疎林下ニ生ズル多年生草本。多數ノ稈ト葉トハ簇生シテ稍粗ナル大株ヲ成シ、匍枝無シ。稈本ニハ茶褐色ヲ呈セル葉ノ下部鞘ノ如クニ殘存ス。葉ハ線形、長サ30cmヲ超エ幅2.5mm許、直立シテ上半部ノミ彎曲下垂シ、暗綠色ヲ呈シ、兩面甚ダ糙澁シ質稍粗ナリ。九、十月ノ候葉間ニ瘦細ナル稈ヲ抽キ、疎ニ五六穂ヲ偏側的ニ着ク。花穂ハ狹橢圓形、長サ1.5cm内外、黄褐色ヲ呈シ、各其最上部ニ短キ雄花穂アリ、雌花穂ニハ粟粒狀ノ果實ヲ着ク。穎ハ卵形ニシテ銳頭、質薄ク多少絲背ヲ成シ顯著ナラズ。果囊ハ長サ穎ヲ抽キ稍壓扁セル卵球形ニシテ長サ2.5mm許、頂ハ長嘴ト成リ、又全面ニ粗毛ヲ散生セリ。柱頭ハ二。秋日果實ヲ着クル普通ノすげハ殆ド本種ナリト見テ太過無ク、あきかさすげモ亦秋ニ花穂ヲ生ズレドモ普通ノ處ニハ之レヲ見ズ。和名ハ蓋シ菜切藪ノ意乎、即チ其硬葉ヲ緊張シテ以テ軟菜ヲ切ルニ利用セシニアラザル乎尙考フベシ。

第 2382 圖

かやつりぐさ科



やはらすげ

Carex transversa Boott.

(=C. Brownii Tuck. var. transversa Kuek.)

各地ノ稍濕潤セル原野或ハ疎林下ニ生ズル多年生草本ニシテ高サ30-50cm許、簇生シ、匍枝ヲ生ゼズ。稈本ニハ短キ葉相集リテ紫褐色ヲ呈ス。葉ハ稍暗綠色、質軟クシテ幅3.5-5mmノ線形ヲ成シ、邊緣少シク糙澁ス。五月、三稜柱狀ノ稈ヲ直立シ、頂ニ五ニ近ク三四ノ花穂ヲ立ツ。雄花穂ハ頂生シ、淡黄褐色ノ線形ニシテ長サ15-25mm許、他ハ皆雌花穂ニシテ直立シ粗ナル短柱狀橢圓形ヲ成シ、長サ15-25mm許、初メ綠色、熟シテ暗色ト成リ、下者ニハ細梗ヲ具ヘ、又鞘アル葉狀苞ヲ伴フ。雌花穎ハ卵圓形、先端ハ極メテ長キ尾狀ヲ呈シテ尖ル。果囊ハ平開ニシテ卵形ヲ呈シ先端ハ銳尖シテ長嘴ト成リ、長サ凡5-6mm許、無毛ニシテ脈條明瞭ニ隆起セリ。柱頭ハ三。瘦果ハ淡黄色ノ三稜橢圓形ナリ。和名ハ柔ら藪ノ意ニシテ、全草柔軟ナルヨリ云フ。

じゅすすげ

Carex ischnostachya Steud.

(=C. Ringgoldiana Boott.)

山地ニ生ズル多年生草本ニシテ高サ50cm内外、密ニ簇生スレドモ匍枝ヲ生ゼズ。稈ハ脚部ニ紫褐色ヲ呈セル下葉ヲ有ス。葉ハ廣線形ニシテ幅6-8mm許、滑澤ニシテ暗綠色ヲ呈シ、質軟シ。六七月、葉間ニ細キ三稜稈ヲ抽キ四五ノ花穂ヲ直立シテ着ク。頂生者ハ汚黄色線形ノ雄花穂ニシテ其直下ノ一ニ雌花穂ヨリモ稍低キコト多シ。雌花穂ハ其穂體ヨリモ長大ナル葉狀苞ヲ伴ヒ、細梗アリテ葉鞘ニ包マレ、狹圓柱形ヲ成シ長サ3-4cm許、多少花疎ニシテ初メ綠色、熟シテ暗色ヲ呈ス。雌花穎ハ小形、卵形ヲ成シ淡黄色。果囊ハ卵狀披針形、斜ニ穂軸ニ着テ遙ニ穎ヨリ長ク、長サ4mm内外、縦脈顯著ニシテ無毛、先端ハ長嘴ト成リ、末端斜ニ二裂シ、其間ヨリ三柱頭僅ニ露ハル。和名ハ數珠藪ノ意ニシテ其果穂ニ基キタル稱ナリ、然シ假ニヤはらすげト本種ト其和名ヲ交換スレバ、最モ實狀ニ合致スルヲ覺ユ。

第 2383 圖

かやつりぐさ科



かさすげ

一名 みのすげ 古名 すげ(同名アリ)

Carex dispalata Boott.

沼澤水邊ノ地ニ生ズル多年生ノ大形草本。又往々水田ニ栽培セラル。稈ハ多數叢生シテ多クハ群落ヲ成シ高サ1m内外アリ。根莖ハ短形ナレドモ粗ナル匍枝泥中ヲ横走ス。稈ハ直立シ粗ナル鋭三稜柱ニシテ質粗澁、脚部ニハ紫染セル下葉ヲ伴フ。葉ハ根生シ并ニ稈ニ生シ、葉鞘内側ハ纖維網狀ヲ成シ、廣線形ニシテ5-8mm許ノ幅アリ、平滑ニシテ強靱ナリ。五六月、稈頂ニ長サ5-8cm許ノ廣線形汚紫褐色ノ雄花穂ヲ直立シ、其稍下方ニ五六ノ圓柱狀雌花穂ヲ斜出シテ着ク。雌花穂ハ其長キ者10cmヲ超エ、最下ノ者ハ顯著ナル葉狀苞ヲ伴ヒ、往々先端ニ雄花穂ヲ着クルコトアリ。雌花穎ハ卵狀披針形ニシテ銳尖シ、紫褐色、白縁、綠背。果囊ハ僅ニ穎ヨリ長ク卵狀披針形、銳尖頭無毛。柱頭三。葉ヲ乾シテ藪(すげがさ)等ヲ作ル、故ニ此和名アリ又古クハ數物ニモ製セシナラン、すげノ解ハかんすげノ條下ニ在リ。漢名 藪(慣用)・菅(誤用)

第 2384 圖

かやつりぐさ科



第 2385 圖

ひごくさ

Carex japonica Thunb.

(=C. Motoskei Miq.)

山野ノ林下等ニ多ク生ズル多年生草本ニシテ高サ20-35cm許アリ、稍叢生シテ直立ス。根莖ハ細長ニシテ地中ヲ横行シ其末端ニ新株ヲ作ル。葉ハ互生シ質軟弱ニシテ線形ヲ呈シ葉頭ハ漸次ニ銳尖ヲ成シ、上葉ハ稈ヨリ超出ス。初夏稈頂ニ淡綠色線形ノ雄花穂一箇直立シ長サ1.5-3cm許アリ、雄穂ノ下方ニ於テ短細柄ヲ有スル二三ノ雌花穂ヲ疎着シ長サ1-2cm許アリ。花柱ハ三岐シテ甚ダ長ク、花時ハ白色ヲ呈シ花穂ヲシテ特異ノ狀アラシム。果穂ハ纖維ナル果柄ヲ有シテ傾垂ス。果囊ハ遙ニ穎ヨリ超出シ、三稜狀卵形ニテ先端ハ二齒ヲ有スル長キ嘴ト成リ、長サ3-4mm許、黄綠色ヲ呈シ、密ニ穂軸上ニ着生ス。和名ハ蓋シ肥後草ノ意ナランモ何故之レヲ肥後ト謂フカ不明ナリ、或ハ初メ肥後ニテ採リシ故名ケシ乎。

かやつりぐさ科

