


第 2392 圖

かやつりぐさ科



じゃうらふすげ

Carex capricornis Meinsk.

原野ニ於ケル水邊ノ濕地ニ生ズル多年生草本ニシテ叢生シ綠色ナリ。稈ハ直立シ剛強ニシテ鋭三稜柱狀ヲ呈シ高サ30-60cm許アリ。葉ハ廣線形ニシテ尖リ幅1cm許ニ達シ、稈上ニ五生シ、上葉ハ花穂ヨリ上方ニ超出ス。初夏ノ候、稈頭ニ線狀圓柱形ニシテ長サ2cm許アル無柄ノ一雄花穂ヲ着ケ、其下部葉腋ヨリ相接近セル二乃至五箇ノ黄綠色橢圓形長サ2cm許ノ雌花穂ヲ着ケ穂柄ハ短シ。果囊ハ多數雌花穂ニ密生シ鉞形ヲ成シテ長ク穎ヨリ超出シ、長サ6mm許、先端ノ長嘴ハ長クシテ其末端ニ叉裂ヲ成シ裂片ハ背曲ス。瘦果ハ細小ニシテ三稜橢圓形ヲ成シ著シク囊苞ヨリ短ク、花柱ハ長ク先端短ク三岐セル柱頭ヲ成ス。和名ハ上蔦すげノ意ニシテ其高尚ニシテ顯著ナル姿ヲ呈セル果穂ニ對シテ命ゼシ稱ナリ。

第 2393 圖

かやつりぐさ科



みたけすげ

Carex Michauxiana Boeck.

(=C. rostrata Michx. non Stokes.) 高山地帯ノ濕地ニ生ズル多年生草本ニシテ直立シ叢生ス。稈ハ稍剛硬ニシテ直立シ鈍三稜ヲ成シテ少數ノ葉ヲ有シ高サ20-50cm許アリ、葉ハ稍廣キ線形ニシテ尖リ長カラズシテ稈ニ五生ス。夏季ニ於テ稈頂ニ無柄ナル小形ノ一雄花穂ヲ着ケテ直立シ長サ1cm許ニシテ淡褐色ヲ呈ス。其下方ニ在テ細柄ニヨリ直立セル三四箇ノ雌花穂相離レテ葉腋ニ着生ス。雌花穂ハ短クシテ淡綠色ヲ呈シ略ボ球狀ヲ成シテ束在シ四方ニ開出セル果囊ヲ有シテ特狀ヲ表ハス。果囊ハ遙ニ穎ヨリ超出シ著シク長大ニシテ長サ1.2cmニ達シ披針狀ニシテ略ボ三稜ヲ成シ、上部ハ嘴ト成リ嘴端ハ小サク二裂ス。瘦果ハ鈍三稜ノ倒卵形ヲ成シ、柱頭ハ三。和名ハ御嶽すげノ意ナリト雖モ此御嶽ハ何レノ山ヲ指ス乎不明ナリ、或ハ單ニ高嶺ニ生ズルすげノ意ナリ。

第 2394 圖

かやつりぐさ科



うますげ

Carex Idzuroei Franch. et Sav.

平野ノ溝邊ニ生ズル多年生草本ニシテ高サ20-40cm許アリ、地下ニ匍枝ヲ引テ繁殖ス。葉ハ稈ニ五生シ長クシテ廣線形ヲ呈シ鋭尖頭ヲ成シ上部ノ者ハ花穂ヨリ上方ニ超出ス。四五月ノ候、直立セル稈頂ニ長柄ヲ有セル長サ5cm許ノ細長一雄花穂ヲ直立シ淡綠色ヲ呈シ、其下方ニ五ニ相離レテ三四ノ雌花穂ヲ着生ス。雌花穂ハ長サ3cm許ニ達シ、極メテ短キ柄ヲ以テ直上シ、斜上シテ疎着セル淡綠色ノ雌花ヲ着ケ。果囊ハ9mm許アリテ穎ノ三倍長ニ達シ三稜狀狭卵形ニシテ縦脈ハ明瞭、先端ハ長嘴ヲ成シテ二岐ス。瘦果ハ囊苞ヨリハ著シク短クシテ三稜狀卵形ヲ成シ、花柱ハ勁クシテ柱頭ハ三。種名Idzuroeiハ男爵伊藤圭介博士ノ令息謙(ゆづる)氏ヲ記念セルモノナリ。和名 馬すげハ此草狀大形ナレバ先ニ予ノ斯ク名ケシモノナリ。

おにすげ

一名 みくりすげ

Carex Dickinsii Franch. et Sav.

溝側或ハ水濕地ノ草間等ニ生ズル多年生草本ニシテ叢生シ長キ地下匍枝ヲ發出シテ繁殖ス。稈ハ直立シ高サ20-40cm許アリ。葉ハ互生シ廣線形ヲ成シテ尖リ葉幅4-10mm許アリ、上部ノ葉ハ花穂ヨリ超出ス。初夏ノ候、稈頂ニ有柄ノ一雄花穂ヲ立テ長サ2.5cm許アリ、其直下ニ二三ノ相依リテ生ゼル雌花穂ヲ腋生シ長サ2cm許ノ球狀廣橢圓形ヲ成シ大ナル果囊密着シ黄綠色ヲ呈ス。果囊ハ廣卵形ニシテ長サ10mm許、上部ハ長嘴ヲ成シテ二淺裂ス。瘦果ハ三稜狀菱形ヲ成シ、花柱ハ長クシテ柱頭ハ三。和名鬼すげハ其果囊ノ粗大ナルニ基キシ稱、實粟すげハ其果穂宛モみくりノ果穂ニ似タルヨリ云フ。

第 2395 圖

かやつりぐさ科



おになるこすげ

Carex vesicaria L.

原野ノ濕地ニ生ズル多年生草本ニシテ往々群ヲ成シテ繁茂シ全體瘦長ニシテ稈ノ高サ40-50cm許アリテ直立ス。葉ハ細長ニシテ線形ヲ成シ葉幅凡ソ3-5mmアリテ略ボ稈ト同長、梢葉ハ遙ニ花穂ヨリ超出ス。初夏ノ候、稈頂ニ長柄ヲ有スル一ノ雄花穂ヲ直立シ淡綠色ニシテ狭圓柱狀ヲ成シ長サ4cm許アリ、其下方ニ五ニ相接近セル二三ノ雌花穂ヲ腋生シ、果穂ト成レバ粗大ナル圓柱形ヲ呈シ往々長サ5cm許ニ達シ黄綠色ニシテ短柄アリ、穂ノ上半ハ時ニ雄花穂ヲ成スコトアリ。果囊ハ圓錐狀卵形ニシテ穂軸ニ密生シ長サ7mm許、先端ハ稍短キ嘴ト成リ二裂ス。瘦果ハ短柄ヲ具ヘテ三稜卵形ヲ成シ、花柱ハ長ク、三柱頭ハ短シ。和名ハ鬼鳴子すげニシテ此種ノ草狀并ニ果穂ハ優ニ鳴子すげヨリ壯大ナルヲ以テ斯ク云フ。

第 2396 圖

かやつりぐさ科



第 2397 圖

かやつりぐさ科



くはくぐ

一名 しほくぐ・はまくぐ
Carex scabrifolia Steud.

(=C. Pierotii Miq.; C. Yabei Lev. et Van.) 海ニ瀕スル淡鹹水相半バスル泥處ニ群生スル多年生草本ニシテ長ク泥中ニ根莖ヲ引テ繁殖シ、全體細長ナレドモ質強剛ナリ。葉ハ狭長ニシテ線形ヲ成シ長サ70cmニ達シ遙ニ稈ヨリ超出ス。初夏細長ナル稈ヲ抽テ直立シ、稈頂ニ長サ2cm許アル一ノ有柄雄花穂ヲ抽テ立チ、其下方ニ離在セル二三ノ雌花穂ヲ着ケ穂長2cm許アリテ穂軸ニ稍密ニ排ベル略多數ノ雌花アリ。果囊ハ長サ6mmニ達シテ白色膜質ノ穎ヨリ長ク、生時黄綠色ヲ呈シ、長橢圓形ニシテ先端ニ淺裂スル短嘴ヲ有ス。瘦果ハ長橢圓形ニシテ花柱頂ニ三岐セル柱頭ヲ有ス。夏秋ニ其葉ヲ刈リくぐ繩ト稱スル小繩ヲ製シ弘ク民間ニ使用セラレ。和名くぐハ古ヨリノ名稱ニシテ其意義ハ不明ナリ、今日植物界ニ於テくぐト呼ブMariscus Sieberianus Nees. ハ本來其品ニ非ラズ、予ハ新ニ之レヲいぬくぐト稱ス。漢名 磚子苗(誤用)