


第 2404 圖

かやつりぐさ科



ひともとすすき


一名 ししきりがや

Cladium Mariscus R. Br.
(=Schoenus Mariscus L.)

中部以南ノ海岸ニ生ズル強剛壯大ノ多年生草本ニシテ高サ2mニ達ス。稈ハ簇生直立シテ圓柱形、硬質平滑ニシテ莖生葉ヲ有ス。根生葉ハ幅1cm許アリ長キ廣線形ヲ成シ上部漸次ニ狹窄シテ細ク尖リ下部ハ跨狀ヲ成シテ莖ト同高、是レ亦強靱、邊緣及中脈ノ背面ハ鈎刺アルヲ以テ甚ダ糙澁ヲ極ム。秋日稈上葉腋ニ密集セル複繖房花穂ヲ着クルコト五六、花軸ハ數回分岐ス。小穂ハ濃褐色ヲ呈シ廣橢圓形ニシテ長サ2-3mm、穎ハ六七、何レモ卵狀橢圓形鈍頭ヲ成ス。雄蕊ハ二箇、花柱ハ三箇アリ。瘦果ハ廣橢圓體ニシテ先端急ニ凸端ヲ成シ、濃褐色ニシテ平滑ナリ。和名一本すすきハ一株ヨリ多數ノ葉出ヅル故云フ、猪切がやハ其葉強靱ニシテ小刺アリ極メテ糙澁スルヨリぬのししヲ切ルト云フ意ニテ斯ク云フ。

第 2405 圖

かやつりぐさ科



ねびきぐさ

一名 あんべらゐ・ひらすげ

Cladium glomeratum R. Br.
(=C. japonicum Steud.)

暖地ノ向陽濕潤ノ處ニ生ズル強直線色ノ多年生草本ナリ。高サ60-90cm、強壯ニシテ鱗片ヲ被レル長匍枝ヲ泥中ニ横走セシメ繁殖ス。葉ハ細長ニシテ多クハ根生シテ二列生ヲ成シ、上半部圓柱形又ハ稍三稜形ヲ呈シ平滑ナリ、脚葉ハ長サ45cm餘ニ達ス。夏秋ノ候、節アル稈ヲ直立シ、稈梢ノ苞間ニ通常數箇有柄ノ赤褐色繖形穗ヲ生ズ。小穂ハ二乃至六アリテ略ホ頭狀ニ團集シ各一花ヲ容レ圓狀卵形ヲ呈ス。穎ハ狹長ニシテ尖ル。雄蕊ハ三。花柱ハ上部長ク三岐ス。瘦果ハ長橢圓狀卵形ニシテ小皺アリ、嘴ハ短クシテ黒色ヲ呈ス。和名あんべらゐハ從來ヨリノ名ナリト雖モ其形狀全ク相異ナルあんべら (Lepironia mucronata Rich.) ト混同スルヲ以テ今之レヲ異名トシ此ニハ根引き草ヲ採用ス、株ヲ引ケバ長キ横走匍枝出ヅレバ斯ク云フナラン、扁すげハ其葉稍平扁ナレバ云フ。

第 2406 圖

かやつりぐさ科



のぐさ

一名 ひげぐさ

Schoenus apogon Roem. et Schult.
(=Chaetospora japonica Franch. et Sav.)

近海ノ地ニ在リテ向陽ノ濕地原野ニ生ズル硬質ノ一年生草本ニシテ密ニ相集リテ叢生シ、葉ハ細長ニシテ先端針狀ヲ成シ稈ヨリモ短シ。葉間ヨリ瘦細ニシテ有稜且ツ剛硬ナル多數ノ稈ヲ抽キ高サ15-20cm許アリテ稈上ニ二三ノ小形葉ヲ互生シ、其葉ノ下部ハ鞘ヲ成シテ稈ヲ包ミ暗赤色ヲ呈ス。初夏ノ候稈頂并ニ上部葉腋ニ小梗ヲ出シ、紫褐色ノ小花穂二乃至六箇簇團ス。小穂ハ長サ5-6mmアリテ披針形ヲ呈シ扁平ニシテ二花ヲ含ミ、穎ハ二列生ヲ成シ、下部ノ三片ハ卵形ニシテ花無ク、上部ノ者ハ倒卵狀披針形ニシテ花ヲ擁セリ。雄蕊ハ三。花柱ハ長クシテ中部ヨリ三裂ス。瘦果ハ鋭角三稜狀廣倒卵形ヲ成シ、子房下鬚ハ六條アリテ其長サ瘦果ニ倍シ暗赤色ニシテ小刺アリ。和名ハ野草ニシテ野ニ在ル雜草ノ意ナリ、鬚草ハ其草狀ニ基ク。

はたがや


Bulbostylis barbata Kunth.

(=Scirpus barbatus Rottb.)

海邊向陽ノ砂上或ハ近海地ノ向陽團地等ニ多キ一年生草本ニシテ一株ヨリ多數ノ葉并ニ稈ヲ叢生ス。葉ハ根生シ綠色狭線形ニシテ稈ヨリ短ク、下部擴大シテ淡褐色膜狀ヲ呈ス。稈ハ瘦細ニシテ多數直立シテ出ヅ基部ニ葉ヲ有シ高サ12-18cm許アリ。秋ニ至テ稈頂ニ各一ノ花穂ヲ着ケテ淡褐色ノ小穂密集シ頭狀ヲ成ス。總苞葉ハ針形ニシテ大小不同、長サ2cmニ達スル者アリ。小穂ハ長橢圓狀披針形ニシテ長サ6mm許アリ、穎ハ舟狀卵形ヲ成シ縁毛ヲ具ヘ先端鋭尖ニシテ綠色ヲ呈シ背反ス。雄蕊ハ一。花柱ハ三岐ス。子房下鬚ハ無シ。瘦果ハ三稜ニシテ圓狀卵形ヲ成シ、果頂ノ嘴ハ黒褐色ニシテ瘤狀ヲ呈ス。和名畑がやハ畑地ニ生ズル故云フ。

第 2407 圖

かやつりぐさ科



いとてんつき


Bulbostylis capillaris Kunth

var. capitata Makino.

向陽ノ芝地等ニ生ズル一年生草本ニシテ叢生シ、根ハ鬚狀。葉ハ總テ根生シ細線形ニシテ稈ヨリ短ク、下部葉縁ニ毛アリ。秋時、多數ノ絲狀稈ヲ葉間ニ抽キ高サ凡20cm内外、稈頂ニ多數ノ茶褐色小穂ヲ頭狀ニ集メ、時ニ更ニ其中ヨリ短柄アル小頭狀花穂ヲ出スコトアリ。總苞葉ハ數箇アリ長短不同ニシテ長サ1.5cmニ達スル者アリ。小穂ハ長サ3-6mm許、長橢圓形。穎ハ廣卵形鈍頭ニシテ紫褐色ヲ成シ中脈ハ綠色ヲ呈ス。瘦果ハ淡黄色、三稜、倒卵形ニシテ子房下鬚無シ。花柱ハ三岐シ其基部ハ瘦果頂ニ殘存シテ小瘤狀ヲ成ス。和名絲點突ハ其葉其稈絲狀ヲ成スヲ以テ云フ、點突ハ此類ノ草名ナリ。

第 2408 圖

かやつりぐさ科



いとはなびてんつき

Bulbostylis capillaris Kunth

var. trifida Clarke.

向陽ノ芝地或ハ山地等ニ生ズル一年生草本ニシテ叢生シ、根ハ鬚狀。葉ハ根生シ絲狀ニシテ極メテ細ク基部稍擴ガリテ淡褐色ヲ呈シ、毛縁ヲ成ス。夏秋ノ候、葉間ヨリ纖細ナル稈ヲ多數ニ抽出シテ高サ15-25cm許アリ、梢上ニ繖形ヲ成シテ數箇ノ花梗ヲ分チ、再三分岐シテ各小梗上ニ茶褐色小穂ヲ單生ス。小穂ハ狹卵形ニシテ長サ4mm許、穎ハ茶褐色卵形ニシテ鈍頭ヲ成シ中脈ハ綠色ヲ呈シ、穎内ニ三稜狀倒卵形黄白色ノ瘦果ヲ藏シ子房下鬚無シ。花柱ハ細クシテ先端三岐シ、其基部ハ殘存シテ瘦果頂ニ瘤狀體ヲ成ス。和名ハ絲火花點突ノ意ニシテ絲ハ其葉并ニ稈狀ニ基キ火花ハ其果穂分岐ノ狀ニ由ル、點突ハ此類ノ草名ナリ。

第 2409 圖

かやつりぐさ科

