

第 2428 圖

かやつりぐさ科



くろぐわゐ 古名くわゐ

Eleocharis plantaginea R. Br.

(=Scirpus plantagineus Retz.)

群ヲ成シテ池沼沼澤ノ水中ニ生ズル多年生草本ニシテ泥中ニ鬚根ハ徑7-18mm許ノ塊莖ヲ有ス。塊莖ハ泥中匍枝ノ末端ニ生ジテ圓ク、前方ニ嘴アリ、栗殻色ヲ呈シ且同色ノ廣鱗片ヲ被リ肉ハ白色ニシテ食フベシ、秋ニ生ジ次年ハ之レヨリ新稈ヲ出シテ株ト成ル。稈ハ叢生シテ直立シ綠色ニシテ質軟弱、初出ノ者ハ瘦細、次デ出ル者ハ圓柱形ニシテ平滑、皮薄ク種隔多シ、高サ40-70cm許アリ。葉ハ變形シテ總テ膜質ノ筒狀鞘ヲ成シ稈ノ下部ヲ密包シ、口縁ハ斜截形ヲ呈ス。秋月稈頂ニ淡綠色ヲ呈セル線狀圓柱形ノ小穂ヲ單生シ、直立シテ長サ3cm許アリ。穎ハ多數アリテ覆瓦様ニ列シ、白線縁背ニシテ橢圓形ヲ成シ宿存ス。二雄蕊アリ。瘦果ハ六本ノ子房下鬚ヲ伴ヒ、淡緑白色廣倒卵形ニシテ表面平滑、小網紋アリ、花柱ハ二三岐ス。此一變種ニシテくろぐわゐ一名おほくろぐわゐ (var. tuberosa Makino) = E. tuberosa Roem. et Schult.) アリテ塊莖大ナリ、之レヲ烏芋一名筋薺一名馬蹄ト云フ。和名ハ黒ぐわゐニシテ其黒褐色ヲ呈セル塊莖ニ基キテ云ヒ且慈姑ノ古名白くわゐニ對シテ云フ、古名くわゐノハ燈心草ノ意ニシテ其稈形ニ基ケルナランモ其くわノ意ハ分明ナラズ。

第 2429 圖

かやつりぐさ科




かんがねる (水毛花)

Scirpus mucronatus L.

諸州ノ濕沍泥地或ハ沼澤地ニ生ズル大形ノ多年生草本ニシテ根ハ鬚狀ナリ。稈ハ多數叢生シテ直立シ、綠色ニシテ銳三稜形ヲ成シ、長サ60-80cm許アリ。葉ハ變形シテ葉片無ク稈ノ下部ニ鞘狀ヲ成シ、口縁斜截形ヲ呈ス。夏月、稈頂ニ綠色ノ數小穂ヲ簇着シ、稈狀ノ一線苞ヲ直立シ長サ4-7cm許アリテ先端尖レリ。小穂ハ無柄ニシテ長サ1.3cm許アリ狭卵形ニシテ緑褐色ナリ。穎ハ覆瓦様ニ排列シ廣卵形鈍頭ニシテ淡綠色褐色縁ヲ有ス。瘦果ハ六本ノ子房下鬚ヲ伴ヒ、扁三稜狀廣倒卵形ニシテ黃白色ヲ呈シ、花柱ハ三岐ス。和名ハ蓋シ寒枯ルニシテ冬月尙其枯稈ノ殘存スルヨリ云フナラン。

第 2430 圖

かやつりぐさ科



さんかくる

一名 さぎのしりさし

Scirpus triquetus L.

(=S. Pollichii Gren. et Godr.)

var. coriacea Franch. et Sav.)

近海ノ泥濕地或ハ原野ノ濕地ニ生ズル多年生草本ニシテ泥中ニ匍枝ヲ引キ往々群ヲ成シテ繁茂セリ。稈ハ少數叢生シ、直立シテ鈍三稜形ヲ成シ平滑綠色、高サ50-90cm許アリ。葉ハ變形シテ鞘ト成リ稈本ヲ包擁セリ。夏秋ノ間、稈頂ニ長短不同ノ數小穂ヲ出シ、梗端ニ茶褐色橢圓狀又ハ長橢圓形ノ小穂ニ乃至五箇許ヲ聚着シ總長1-1.5cm許アリ。花穂側ニ略ボ花穂ト同長ナル一本ノ直立苞ヲ伴ヒ三稜ニシテ尖リ綠色ヲ呈ス。穎ハ覆瓦様ニ排列シ卵形、鈍頭、褐色ニシテ背線縁色ヲ帶ブ。瘦果ハ穎内ニ位シテ三乃至六本ノ子房下鬚ヲ伴ヒ、廣倒卵形ニシテ一方平面一方凸面ニ壓扁シ、淡褐色ヲ呈シ、花柱ハ二岐ス。内地ニテハ敢テ其利用ヲ開カズト雖モ臺灣ニテハ之レヲ用キテ所謂大甲蔗ノ製カス、故ニたいかふゐノ別名アリ。又臺灣ニテ蔗草ノ名アリ。和名ハ三角ゐニシテ其稈狀ニ基テ云ヒ、薔草ノ尻刺シハ其名ノ示スガ如ク其繁茂セル處ニ下リタルさぎノ尻ヲ刺スノ意ナリ。漢名 蘆草 (?)

ほたるる

Scirpus erectus Poir.

(=S. juncoides Roxb.;

S. Hotarui Ohwi.)

小溝或ハ下濕ノ地ニ生ズル一年生草本ニシテ叢生シ高サ40-50cm許アリテ鬚根ヲ有ス。稈ハ細長綠色ニシテ略ボ圓柱狀ヲ成シ、葉ハ鞘狀ヲ成シテ稈ノ下部ヲ包擁シ其口縁ハ截形ヲ呈ス。夏秋ノ間、稈頂ニ無柄ノ數小穂ヲ簇生シ、稈ニ連リテ穂側ニ細長ニシテ尖レル5-9cm長ノ一線苞ヲ直立スルニヨリ花穂ハ宛モ側生スルノ觀アリ。小穂ハ綠褐色、廣卵形、鈍頭ニシテ長サ6-9mm許。穎ハ覆瓦様ニ列シ圓形、淡褐色、背線縁色ニシテ微凸頭アリ。瘦果ハ略ボ瘦果ト同長ナル六本ノ子房下鬚ヲ伴ヒ、黒色ヲ呈シ扁平ニシテ兩凸面ヲ成シ廣倒卵形ニシテ表面細皺アリ、花柱ハ二或ハ三岐ス。和名 螢ゐハ何故斯ク云フ乎予ニハ不明ナリ、或ハ螢籠ニ此草ヲ入ルル事アル乎是レ亦詳ナラズ。

ふとゐ

一名 おほゐ・たゐゐ・まるすげ

Scirpus lacustris L.

var. Tabernaemontani Trautv.

(=S. Tabernaemontani Gmel.)

池沼中ニ大群ヲ成シテ生ズル多年生草本ナレドモ又住々庭池ニ栽植シテ觀賞スルコトアリ。根莖ハ粗大ニシテ長ク泥中ヲ横行シ節ヨリ鬚根ヲ叢出ス。稈ハ長大ニシテ高サ1.5-2m許アリ、圓柱形平滑ニシテ綠色ヲ呈シ質堅カラズ、中ニ白穢アリ。葉ハ褐色鞘狀ヲ成シ又ハ鱗片狀ニシテ先端尖ル。夏秋ノ間穂頂ニ繖形ヲ成シテ長短不同ノ花梗數本ヲ分チ長サ4-7cm許アリ、各梗更ニ分枝シテ無柄或ハ有柄ノ黃褐色小穂ヲ着ケ、梗ハ通常繖開スルカ或ハ一方ニ傾ケリ、穂本ニ一短線苞アリテ長サ1-4cm許アリ。各小穂ハ橢圓形ニシテ長サ8mm許。穎ハ橢圓形褐色縁ニシテ背部綠色ヲ呈シ微凸尖アリ。瘦果ハ五乃至六本ノ子房下鬚ヲ伴ヒ、倒卵形ニシテ壓扁シ一方平面一方凸面ヲ呈シ表面ハ平滑ニシテ黒熟シ、花柱ハ二岐ス。園藝品ニシテふとゐ (forma zebrina Makino) アリ、稈ニ綠白兩色交互生ス。本種ノ母品ハ花柱三岐シおほゐとゐト稱シ我邦北地或ハ中部地ノ高處ニ見ル、形狀ふとゐト異ナラズ。和名ハ太ゐニシテ草狀大ナルヨリ云フ、又大ゐモ同意味ナリ、唐ハ唐ノ品ト誤認セシ名、圓すげハ其稈圓ケレバ云フ。漢名 莞 (誤用)、水葱 (誤用)、水葱ハ蓋シEleocharis 即チはりゐ屬ノ一種ニシテ或ハぬまはりゐ乎。

うきやがら (荊三稜)


一名 やがら

Scirpus maritimus L.

池澤ノ水中ニ生ズル大形ノ多年生草本ニシテ高サ1-1.5m許アリ、泥中ニ根莖ヲ引キ長ク横行シテ疎ニ分枝シ、末端ニ兩頭尖レル塊莖ヲ成シテ後チ黒色ヲ呈シ質頗ル堅硬ナリ。稈ハ粗大ニシテ直立シ三稜形ニシテ光澤アリ、綠色ニシテ質堅カラズ。葉ハ稈上ニ互生シ線形ニシテ尖リ、幅廣キ者時ニ1cmヲ超エ、下部ハ筒狀鞘ヲ成シテ稈ヲ包ミ口縁ハ斜截セリ。夏時、稈頂ニ葉狀ヲ成シテ長ク開出スル總苞葉中ニ花梗數本ヲ繖形ニ生ジ、各無柄或ハ有柄ノ小穂一乃至四箇ヲ着ケ、小穂ハ長サ1-2cmアリテ長橢圓形ヲ成シ濃褐色ヲ呈ス。穎ハ膜質ニシテ長橢圓形ヲ成シ背線縁色ニシテ先端小芒ニシテ突出ス。瘦果ハ三乃至六本ノ子房下鬚ヲ伴ヒ、鈍角三稜狀倒卵形ヲ成シ帶褐色ニシテ、花柱ハ三岐ス。和名ハ浮矢幹ノ意、矢幹ハ其稈ヲ指シ冬枯レバ輕シテ水ニ浮ブ故斯ク云フ。

第 2431 圖

かやつりぐさ科



第 2432 圖

かやつりぐさ科



第 2433 圖

かやつりぐさ科

