

第2434圖

かやつりぐさ科



第2435圖

かやつりぐさ科



第2436圖

かやつりぐさ科



812

まつかさすすき

Scirpus Mitsukurianus Makino.

向陽ノ草原湿地ニ他草ト相交ハリテ生ズルナル多年生草本ニシテ稀疊ニ叢生シ直立シテ高サ1m内外アリ。葉ハ稈ニ互生シ、狹長ニシテ廣線形ヲ成シ先端漸殺シテ尖リ長サ30-60cm幅6-10mm許アリ、綠色平滑ニシテ質硬ク葉緣ハ糙澁シ、葉本ハ筒状鞘ヲ成シテ稈ヲ包擁ス。稈ハ聳立シ平滑綠色ニシテ鈍三稜形ヲ成シ、秋ニ至テ梢葉腋ヨリ花梗ヲ抽キ、梗端ニ在ル小形葉狀ノ總苞數片ノ中點ヨリ更ニ出梗シテ一回分梗シ其小梗頂ニ長圓形褐色小穗ヲ十數箇宛頭狀ニ簇聚シ其徑1.5cm許アリテ小穗ハ長サ5mm許アリ。穎ハ小形ニシテ赤褐色ヲ呈シ線狀披針形ニシテ短銳尖頭ヲ成シ背線綠色ナリ。瘦果ハ極メテ長ク且屈曲セラ六本ノ子房下鬚ヲ伴ヒ、小形ニシテ狹倒卵形ヲ成シ稍壓扁セラレ先端嘴部成シ黃白色ヲ呈シ、花柱ハ三岐ス。種名ハ記念ノ爲メ著者ノ箕作佳吉博士ニ捧げシモノナリ。和名松毬すすきハ其園集セル各花穗ノ狀ニ基シナリ。

こまつかさすすき

Scirpus fiurenoides Maxim.

向陽ノ平地或ハ山足地ノ濕處ニ他草ト相交リテ生ズル多年生草本ニシテ稈ハ叢生シテ直立シ瘦長ナル三稜状圓柱形ニシテ高サ60-70cm許アリ、平滑綠色ニシテ質硬シ。葉ハ稈ニ互生シ狹長ナル線形ニシテ先端漸次ニ狹ク尖リ質剛クシテ邊緣糙澁シ、下部ハ筒状鞘ヲ成シテ稈ヲ包メリ。秋ニ至テ稈梢ノ葉腋ニ短梗ヲ出シテ一回又ハ二回分岐シ、其梗端ニ小穗相集リテ頭狀球形ヲ成シ徑1cm内外アリ。小穗ハ長サ4mm許、長橢圓形、生時暗綠色ヲ呈シ乾ヶバ濃褐色ニ變ズ。總苞葉ハ小形葉狀ヲ成シ狹線形ニシテ下部ハ擴張ス。穎ハ廣披針形、銳頭、綠褐色。瘦果ハ六本ノ長キ子房下鬚ヲ伴ヒ、扁平倒卵形黃白色ニシテ先端嘴ヲ成シ、まつかさすすきノ者ヨリ一倍半以上大形ナリ、花柱ハ三岐ス。和名ハ小松毬すすきニシテ姉妹品ナルまつかさすすきヨリ小形ナレバ斯ク云フ。

あぶらがや

一名 なきり・かにがや

Scirpus cyperinus Kunth var. *concolor* Makino.(=*S. concolor* Maxim.;
S. Wichurai Boeck. var. *concolor* Ohwi.)

山原山足等ノ濕地ニ生ズル大形ノ多年生草本ニシテ叢生シ、往々巨株ヲ成シ、下ニ鬚根ヲ叢出ス。葉ハ稈ニ互生シ長大ナル線形ニシテ漸次ニ尖リ長サ40-60cm、幅1cm許アリ、質稍硬ク綠色ニシテ表面光澤アリ、下部ハ長鞘ヲ成シテ稈ヲ包メリ。稈ハ高ク直立シ直眞、鈍三稜形ヲ成シ光澤アリテ黃綠色ヲ呈ス。秋ニ至テ稈梢ノ葉腋ニ細長ナル長短不同ノ瘦梗ヲ出シ、各更ニ數箇分岐シテ小梗頂ニ二乃至三ノ小穗ヲ集めケテ頭狀ヲ成シ、小穗ハ卵狀長橢圓形鈍頭ニシテ茶褐色ヲ呈シ長サ0-9mm許アリ。穎ハ小形ニシテ長橢圓形ヲ成シ先端尖リ暗褐色ヲ呈ス。瘦果ハ長クシテ屈曲セラ六本ノ子房下鬚ヲ伴ヒ、扁平三稜ヲ成セル長橢圓形ニシテ先端短嘴ヲ成シ黃白色ニシテ、花柱ハ三岐ス。此一品ニニあぶらすすき (*forma kuriawensis* Makino = *S. cyperinus* Kunth var. *kuriawensis* Makino = *S. kuriawensis* Makino) アリ、全草稍小形、花絲稍疊ニシテ開繖スルコト少シ、小穗ハ密集シ略ボ半球形ノ頭狀ヲ呈ス。又しであぶらがや (*forma cylindricus* Makino) アリ、小穗長クシテ簇集ス。和名油がやハ花穗油色ヲ帶ビ且油臭アレバ斯ク云フ、なきりハ或葉切り乎其緊張サセシ葉ヲ以テ菜蔬ヲ切ルニ非ズ乎、蟹がやハ多分小兒其葉ヲ以テ蟹ヲ釣ルニ用ウルヨリ云フ乎。漢名刪草(誤用)


あいばさう

Scirpus cyperinus Kunth var. *Wichurai* Makino.(=*S. Wichurai* Boeck.; *S. Eriophorum* Michx. var. *nipponicus* Franch. et Sav.)

諸國山足山間等ノ濕地ニ生ズル壯大ナル多年生草本ニシテ高サ1m以上ニ達シ株ヲ成シテニ鬚根ヲ叢出ス。稈ハ高ク聳立シ強硬ニシテ鈍三稜柱形ヲ成シ綠色ニシテ滑澤ナリ。葉ハ根生シ并ニ稈ニ互生シ廣線形ニシテ未長ク尖リ幅1cm内外ヲ算シ、質剛勁ニシテ綠色片ヲ呈シ表面滑澤ナレド葉緣ハ糙澁シ、稈上ニハ三四片ノ葉アリテ下部ハ長鞘ヲ成シ稈ヲ包メリ。秋日稈頂ニ大ナル花穂ヲ出シ黃褐色ヲ呈シテ一方ニ靡キ傾キ、小穗ノ長サ4-5mm許アリ、穎狀あぶらがやニ酷似スレドハモ小穂ハ何レモ單立シテ廣橢圓體ヲ成シ、側方ノ長柄アルヲ以テ區別シ得ベシ。瘦果ハ廣橢圓形ニシテ壓扁セラレ平滑ナリ。野外ニ往々本品トあぶらがやト之ノ仲間品アリテ小梗上ニ有柄無柄ノ小穗ヲ混生ス、之レヲあひあぶらがやト云フ蓋シ元來ハあぶらがやモ含メテ呼ブ名ナラン。

第2437圖

かやつりぐさ科



第2438圖

かやつりぐさ科

*Scirpus cyperinus* Kunth var. *Eriophorum* O. Kuntze.(=*S. Eriophorum* Michx.; *S. Wichurai* Boeck. var. *borealis* Ohwi.)

向陽ノ山原或ハ山麓ノ濕地等ニ生ズル大形ノ多年生草本ニシテ株ヲ成シ下ニ鬚根ヲ叢出ス。葉ハ基部ノ者根生シ稈上ノ者ハ互生シ長大ニシテ廣線形ヲ成シ末漸次ニ尖リ硬質滑澤ニシテ綠色ヲ呈シ葉緣ハ糙澁シ、稈上ノ葉ハ其下部長柄成長シテ稈ヲ包メリ。稈ハ高ク直聳シ頂端ニ苞葉ト大ナル花穂ヲ有シ花穗ハ多數ノ小穗ヲ着ケテ往々一方ニ靡ケリ、概形あぶらがやニ酷似シ、然レド月其小穗ノ赤褐色ヲ呈スルモノ亦相同ジ、ドモ小穗ハ長サ3mm許ノ小球形(あぶらがやニ在テハ長サ6-9mm許)ニシテ且通常二乃至四箇(あぶらがやハ二乃至三箇)簇生ス。瘦果等あぶらがやト相同ジ。和名蝦夷油がやハ初メノ北海道產品ニ對シ命名セラレシシヨリテえぞ名アレドモ、今ハ更ニ本州・四國并ニ九州ニモ亦產スルコトヲ知ルニ至レリ。

第2439圖

かやつりぐさ科



わたすげ

一名 すすめのけやリ・まゆはきぐさ・かやな
Eriophorum gracile Koch.

我邦中部以北ノ山原向陽濕地ニ生ズル多年生草本ニシテ疊ニ叢生シ往々群生シテ繁茂シ、根ハ鬚根状ナリ。葉ハ少數ニシテ短く頗る細長ニシテ溝ヲ成シ三稜形ニシテ先端鈍頭、稈上ノ葉ハ下部長キ鞘ヲ成シテ稈ノ下部ヲ包メリ。稈ハ細長綠色ニシテ直立シ三稜柱形ヲ成シ高サ35-50cm許アリ。七月稈梢ニ繖形ヲ成シ長短不同ノ二三枝ヲ分チ數箇ノ小穗ヲ着ケ開花時ニハ梗伸ビテ點頭ス。總苞葉ハ二二片アリテ長サ2-3cm許、葉狀ニシテ下部擴大セリ。小穗ハ長サ1cm許ニシテ橢圓形ヲ成ス。穎ハ廣卵形鈍頭ニシテ灰黑色ヲ呈シ、穎内ニ三雄蕊アリテ葯ハ穎外ニ超出ス。瘦果ハ鈍三稜状灰綠色ヲ呈シ、柱頭ハ三岐ス。子房下部ハ多數アリ花後伸長シテ3cm=達シ、穎ハ綿す後半宿存シテ恰モ白色ノ綿絮ノ如シ。和名ハ綿上げノ意ニシテ其果穎ノ白毛ニ基キシ稱ナリ、此名ハ明治十三年發行ノ博物館列品目錄ニ出で、雀の毛槍井二肩刷毛ノ名ハ明治十三年發行ノ小石川植物園草木目錄ニ出で、かやなハ其葉かや(芒)ノ如ケレバ云フ乎、ハ菜乎。

813