

第 2440 圖

かやつりぐさ科



さぎすげ

一名 わせわたすげ

Eriophorum vaginatum L.

我邦中部以北ノ山原向陽濕地ニ生ズル多年生草本ニシテ多株相依リ群ヲ成シテ繁茂シ、根莖短ク、下ニ鬚根ヲ出セリ。葉ハ短ク、絲線形三稜ニシテ叢出シ、上部一二ノ莖葉ハ稍膨大セル鞘ヲ成シテ互生ス。稈ハ叢生シ葉ヨリ上ニ超出シテ直立シ下部圓柱形上部三角形ニシテ綠色ヲ呈シ高サ30-40cm許アリ。七月、稈頭ニ小形花ヲ密集セル一穂ヲ頂生シ、穂下ノ苞葉ハ鱗狀ニシテ廣披針形ヲ成シ白膜縁ニシテ長サ6mm許アリ。小穂ハ直立シ卵狀橢圓形ニシテ多花ヲ有シ長サ1.5cm許。穎ハ廣卵形ニシテ長鋭尖頭ヲ有シ薄膜質ニシテ濁黒綠色ヲ呈ス。瘦果ハ扁平ナル三稜狀倒卵形ヲ成シ鈍頭ニシテ黄白色ヲ呈シ、花柱ハ三岐ス。子房下鬚ハ多數ニシテ白色絹毛狀ヲ成シ花後長ク延ビテ2cm許ニ達シ、擴リテ白綿球狀ヲ成シ頗ル美ナリ。和名鶯すげハ其果穂ヲ白鶯ニ擬セシナリ、此名ハ明治廿八年發行ノ松村任三博士著『改正増補植物名彙』ニ出ヅ、わせたすげハわたすげヨリハ果穂早く熟スルヨリ云ヒ是レ亦上ノ書ニ出ヅル所ナリ。

第 2441 圖

かやつりぐさ科



いぬくぐ

一名 くぐ (誤用、且同名アリ)

Mariscus Sieberianus Nees
var. *subcomposita* Clarke.

諸州ノ向陽草地ニ生ズル綠色ノ多年生草本ニシテ根莖ハ稍肥厚シ、下ニ鬚根ヲ出シ、高サ30-50cmアリ。稈ハ一二根莖ヨリ生ジテ直立シ三稜柱形ヲ成シ、下部ニ稈ヨリ短キ三四片ノ葉ヲ疎ニ互生ス。葉ハ廣線形ニシテ中脈ヨリ左右ニ折レテ溝ヲ成シ淡綠色ニシテ質軟カナリ。總苞ハ綠色葉狀ニシテ花穂蓋ヨリ遙ニ超出シ六七片アリテ長短不同ナリ。繖形花叢ハ夏秋ノ候ニ出テ、單繖形ヲ成セル十箇内外ノ繖花ヨリ成リ中ニハ柄ヲ有スル者アリテ長短一様ナラズ、繖花ハ圓柱形ニシテ開出セル多數ノ小穂ヲ密ニ着生シ長サ2-3cm許アリテ綠色ヲ呈シ後褐色ヲ帶フ。小穂ハ長サ3-4mmアリテ線狀圓柱形ヲ成シ一花ヨリ成リ、熟スレバ果實ト共ニ繖花ハ中軸ヨリ脱落シ去ルノ性アリ。瘦果ハ狹長橢圓形ヲ成ス。和名ハ現時之レヲくぐト稱スレドモくぐノ正名ハ本種ニ非ズ、故ニ今犬くぐト新稱ヲ下セリ、くぐノ意ハ不明ナリ。漢名 磚子苗 (誤用)、磚子苗ハ *Fimbristylis* 即チてんつき屬ノ一種ナリ。

第 2442 圖

かやつりぐさ科



ひめくぐ (水蜈蚣)

Kyllingia brevifolia Rottb.

普通ニ諸州ノ野外向陽ノ濕地ニ通常他草ト伍シテ生ズル多年生草本ニシテ叢生シ、帶紫色根莖ヲ周圍ニ發出シテ繁殖シ、鬚根ヲ下シ全草ニ一種ノ香アリ。葉ハ質軟クシテ狹線形ヲ成シ末ハ漸次ニ尖リ下部ハ淡紫色ヲ帶ビ鞘ヲ成ス。稈ハ葉中ニ出ダテ直立シ瘦長ナル三稜柱形ニシテ綠色ヲ呈シ高サ10-25cm許アリ。總苞葉ハ三片許アリ葉形ニシテ穂下ニ接シテ出ダ長クシテ開出シ往々反向ス。夏秋ノ間、稈頭ニ綠色球狀直徑7-12mm許ノ花穂ヲ單生シ多數ノ小穂ヲ集メ着ク。小穂ハ長橢圓形ニシテ長サ2.5mm許アリ。穎ハ軸上ニ二列ニ排ビ、舟狀ヲ成セル卵形ニシテ背線綠色ヲ呈シ先端尖レリ。瘦果ハ褐色ヲ呈シ稍扁平ニシテ倒卵形ヲ成シ先端ニ小凸尖アリ、花柱ハ二岐ス。和名姫くぐハ草狀全體小形ナルヨリひめト云ヘリ。

かやつりぐさ

一名 ますくさ (同名アリ)

Cyperus microiria Steud.
(= *C. japonicus* Makino.)

通常圃中ノ廢地等ニ生ズル一年生草本ニシテ叢生シ鬚根ハ叢生シ紫色ヲ呈シ、全草ニ一種ノ香アリ。葉ハ多クハ根生シ細長ナル線形ニシテ末漸次ニ尖リ質堅カラズ。稈ハ葉中ヨリ直立シテ通常一株ニ數條出ダ鈍三稜柱形ニシテ平滑綠色、高サ30-40cm許アリ。七八月ノ候、稈頭ニ葉狀ヲ成セル總苞葉三乃至五片ヲ開出シ頗ル長シ、其中央ヨリ繖梗四乃至九條ヲ出シ乃至六許ノ繖花序ヲ着ク。繖花序ハ稍頭狀ニ集リテ多數ノ小穂ヲ排列ス。小穂ハ褐色線形ニシテ二十花内外ヨリ二列ニ着ケ長サ1-1.5cm許アリ。穎ハ舟狀、橢圓形、褐色、背線ハ綠色ニシテ先端短小凸尖ヲ成ス。瘦果ハ黒褐色ニシテ三稜ヲ呈シ長橢圓狀倒卵形ヲ成シ、花柱ハ小形ニシテ三岐ス。和名ハ蚊帳釣草ノ意、小兒互ニ其稈ノ端ヨリ裂ケバ四條ニ分レテ四角ト成ル、之レヲ蚊帳釣草ト擬シテ戲レ遊ブ故斯ク云フ、耕草ノ意モ同ジク之レヲ四條ニ裂キ以テ四角ナル柄ノ形ヲ象トリ遊ブ。植物學界ニテハ本種ヲかやつりぐさと特稱スレドモ世間ニテハこごめがやつりモ亦斯ク謂フ。

第 2443 圖

かやつりぐさ科



こごめがやつり

一名 かやつりぐさ (同名アリ)

Cyperus Iria L.

普通ニ向陽ノ圃地或ハ原野ノ濕地ニ生ズル一年生草本ニシテ叢生シ紫色ノ鬚根ヲ叢出シ、全草ニ一種ノ香氣アリ、草狀かやつりぐさニ酷似シ其姉妹品タリ。葉ハ質軟ニシテ長ク、狹線形ニシテ末長ク尖リ、下ノ鞘ヲ成シテ稈ノ下部ヲ包圍セリ。夏秋ノ間高サ20-40cm許ノ稈葉中ヨリ抽キ通常一株ニ數條アリテ直立シ鈍三稜柱形ヲ成シ平滑綠色ナリ。稈頭ニ長キ葉狀ノ總苞葉三片許ヲ出シテ開出シ、其中央ヨリ四乃至十ノ繖梗ヲ出シ三乃至七ノ花穂ヲ着ク、下部ノ者ハ時ニ更ニ花穂ヲ分岐ス。花穂軸上ニハ長橢圓狀線形ヲ成セル小穂ヲ少數或ハ多數ニ着ケ、小穂ハ長サ0.5-1cm許アリテ淡黄色ヲ呈シ二列ニ排ベル二十内外ノ花ヲ有ス。穎ハ倒卵形褐色ニシテ背線綠色先端鈍圓頭ヲ成シ殆ト尖點無シ。瘦果ハ三稜ニシテ狹倒卵形黑色ヲ呈シ、花柱ハ三岐ス。此一品ニこごめがやつり (*forma paniciformis* Makino = var. *paniciformis* Clarke. = *C. paniciformis* Franch. et Sav.) アリ、小穂ニハ通常二乃至四花ヲ有ス、然レドモ往々其花穂ノ狀母種ト連絡シ其中間ニ境界無キヲ見ル。和名ハ小米蚊帳釣ニシテ其花小形ナルヲ以テ云フ、本品モ亦俗ニ蚊帳釣草ト謂フ。

第 2444 圖

かやつりぐさ科



うしくぐ

Cyperus truncatus Turcz.

山地或ハ田畔或ハ野外ノ濕地ニ生ズル一年生草本ニシテ疎ニ叢生シ往々群ヲ成シテ繁茂シ粗大ニシテ直立シ高サ30-60cm許アリ。葉ハ多ク根生シテ堅カラズ、廣線形ニシテ末長ク尖リ葉縁縫澁シ時ニ幅1cmニ達スルコトアリ。秋月、粗大ニシテ綠色三稜形ヲ成セル稈ヲ葉中ヨリ抽キ、頂端ニ三乃至六片ノ長キ葉狀總苞葉ヲ具ヘ、其苞葉心ヨリ繖形ヲ成シテ長短不同ノ數梗ヲ抽キ、其梗端ニ多數ノ小穂ヲ簇着シテ橢圓形ヲ成シ時ニ更ニ花穂ヲ分岐ス。小穂ハ線形、白褐色又ハ褐色ニシテ十四五花ヲ二列ニ生ズ。穎ハ廣橢圓形鈍頭ニシテ線背白膜縁ヲ成ス。瘦果ハ灰白色ヲ呈シ三稜ニシテ狹倒卵狀長橢圓形ヲ成シ花柱ハ三岐シ時ニ二岐ス。和名ハ牛くぐニシテ其果穂紫黑色ナルヲ以テ謂フ乎、或ハ全草粗大ナルヲ以テ謂フ乎、著者ニハ今其意不明ナリ。

第 2445 圖

かやつりぐさ科

